

№ 190

„РОДИНА“, Дек.

ПОЛНЫЙ РУССКИЙ
иллюстрированный
СЛОВАРЬ-ТРАВНИКЪ
II
ЦВѢТНИКЪ

СОСТАВЛЕННЫЙ



по новѣйшимъ ботаническимъ и медицинскимъ сочиненіямъ

врач. Е. Н. Зальсовой и О. В. Петровею

Томъ III

Н—С

съ 90 рисунками въ краскахъ и 64 иллюстраціями.



С.-Петербургъ.

Книжный складъ «Родины», Литовская ул., соб. д., 23-й пикетъ
1900.

№ 196
221-126 ПОЛНЫЙ РУССКИЙ 1922
1898 иллюстрированный 1600

СЛОВАРЬ-ТРАВНИКЪ И ЦВѢТНИКЪ

с 582*

СОСТАВЛЕННЫЙ

по новѣйшимъ ботаническимъ и медицинскимъ сочиненіямъ

врач. Е. Н. Залѣсовой и О. В. Петровской

Томъ III

Н—С

съ 90 рисунками въ краскахъ и 64 иллюстраціями.



С.-Петербургъ.

Книжный складъ «Родины», Лиговская ул., соб. д., № 114.

1900.


Договорено цензурою, С.-Петербургъ, 27 ноября 1900 г.



552600

Графическое заведение «Родины» (А. А. Каспари).
Лиговская ул., собств. домъ, № 114.

Ср 104455



/8

Отъ издателя.

Предпринявъ новое капитальное изданіе „Полный русскій иллюстрированный Словарь-Травникъ и Цвѣтникъ“, мы выпустили въ 1898 г. первый томъ этого изданія, который содержитъ въ себѣ описанія растений на буквы А—Ж, съ указаніемъ способовъ ихъ употребленія въ домашнемъ обиходѣ и медицинѣ (всего 368 страницъ) и снабженъ 92 раскрашенными рисунками и 145-ю иллюстраціями, и въ 1899 году—второй томъ, содержащій описаніе растений на буквы Ж—Н (всего 320 страницъ—отъ стр. 369—688) и снабженный 44 раскрашенными рисунками и 129-ю иллюстраціями. Нашъ „Словарь-Травникъ и Цвѣтникъ“ имѣетъ своей цѣлью служить настольнымъ руководствомъ для сельскихъ хозяевъ, аптекарей, врачей, фельдшеровъ и вообще для каждой русской семьи, указывая имъ на способы пользованія растительнымъ царствомъ, какъ въ домашнемъ обиходѣ, такъ въ особенности и въ области домашней медицины, гдѣ растенія могутъ принести неоцѣнимую пользу при излеченіи различныхъ болѣзней, такъ какъ служатъ средствомъ для изготовленія массы лечебныхъ средствъ. Въ основу нашего изданія „Словарь-Травникъ и Цвѣтникъ“, заключающаго въ себѣ какъ научныя, такъ и всѣ мѣстныя (по губерніямъ и областямъ) названія растений, положены строго-провѣренныя наукою и опытомъ свѣдѣнія; поэтому понятно, что на составленіе его потребовался огромный трудъ со стороны приглашенныхъ нами опытныхъ сотрудниковъ, ввиду чего не представилось возможнымъ выпустить все изданіе въ теченіе **одного-двухъ лѣтъ**.

Слѣдующая программъ, подробно изложенной въ первомъ томѣ нашего изданія „Полный русскій иллюстрированный Словарь-Травникъ и Цвѣтникъ“, мы нынѣ выпускаемъ

третій томъ его въ полной увѣренности, что онъ встрѣтитъ такой-же лестный пріемъ и оцѣнку со стороны читателей, какіе пріобрѣли первые два тома. Предлагаемый вниманію читателей третій томъ изданія „Словарь-Травникъ и Цвѣтникъ“ содержитъ въ себѣ описанія растений на буквы Н—С, отъ стр. 689-й до стр. 944-й, и снабженъ 16-ю таблицами раскрашенныхъ рисунковъ (табл. XXV—XL, фиг. 137—227) и 64-ю иллюстраціями (рис. 195—258).

Въ будущемъ 1901-мъ году выйдетъ четвертый **послѣдній** томъ нашего „Словаря-Травника“, къ которому будетъ приложенъ подробный алфавитный списокъ всѣхъ болѣзней, упоминаемыхъ въ нашей книгѣ, причемъ за названіемъ болѣзней будутъ указаны тѣ страницы „Словаря-Травника“, гдѣ каждый легко можетъ найти средство, добываемое изъ того или иного растенія и дающее исцѣленіе или облегченіе болѣзни.



Негубицъ, см. Язвенникъ обыкновенный (*Anthyllis Vulneraria* L.).

Неувяда, см. Мелколепестникъ ѣдкій (*Erigeron acris* L.).

Неувядаемый цвѣтъ, см. Амарантъ (*Amaranthus caudatus* L.).

Неумирающій цвѣтъ, см. Кермекъ татарскій (*Statice tatarica* L.).

Нефорощи, } см. Полынь полевая (*Artemisia campestris* L.).

Нефорощъ, } см. Полынь полевая (*Artemisia campestris* L.).

Нехворощъ, см. Полынь полевая (*Artemisia campestris* L.).

Нехворощъ, см. Чернобыльникъ обыкновенный (*Artemisia vulgaris* L.).

Нехворощъ, см. Звѣздчатка большая (*Stellaria Holostea* L.).

Нехворощъ непахучая, см. Полынь полевая (*Artemisia campestris* L.).

Нехворощъ суха, см. Вербена лекарственная (*Verbena officinalis* L.).

Нехворощъ черная, см. Полынь полевая (*Artemisia campestris* L.).

Нехворощъ черная, см. Полынь бѣлая (*Artemisia maritima* L.).

Нечестная трава, см. Кошачьи лапки (*Antennaria dioica* Gärtn.).

Нечипай зелье, } см. Переступень бѣлый (*Bryonia alba* L.).

Нечипай зилла, } см. Переступень бѣлый (*Bryonia alba* L.).

Нечога, см. Звѣздчатка злачная (*Stellaria graminea* L.).

Нечуевика, см. Кошачьи лапки (*Antennaria dioica* Gärtn.).

Нечуй-вѣтеръ, см. Метлица полевая (*Agrostis Spica Ventii* L.).

Нечуй-вѣтеръ, см. Кошачьи лапки (*Antennaria dioica* Gärtn.).

Нечуй-вѣтеръ, см. Ястребинка волосистая (*Hieracium Pilosella* L.).

Нечуй-вѣтеръ, см. Запникъ клубненосный (*Phlomis tuberosa* L.).

Нечуй-вѣтеръ, см. Лапчатка серебристая (*Potentilla argentea* L.).

Нечуй-вѣтеръ, см. Ястребинка волосистая (*Hieracium Pilosella* L.).

Нива, см. Рожь обыкновенная (*Secale cereale* L.).

Нивникъ, см. Тимофеевка (*Phleum pratense* L.).

Нивнякъ, } см. Поповникъ обыкновенный (*Chrysanthemum Leucanthemum* L.).

Нивяникъ, } см. Поповникъ обыкновенный (*Chrysanthemum Leucanthemum* L.).

Нивянка, см. Нивянка восьмилепестная (*Dryas octopetala* L.).

Нивянка восьмилепестная (*Dryas octopetala* L.). Нивянка, Куропаточья трава (Херс.), Устели - камень. Низенькая, выш. всего $\frac{3}{4}$ — $1\frac{1}{2}$ вершка, травка, образующая густыя дерновинки, многолѣтняя, изъ семейства «розоцвѣтныхъ» (*Rosaceae* Hook et Benth.), произрастающая на сѣверѣ и на горахъ Европы, встрѣчающаяся на крайнемъ сѣверѣ Европейской Россіи, въ Сибири и въ альпійской области Кавказскихъ горъ. Листья овальные, по краямъ съ крупными, ровными, овальными зубцами, сверху зеленые, голые, блестящіе, снизу покрытые снѣжно-бѣлыми волосками. Цвѣты довольно крупные, бѣлые. Чашечка двой-

ная, лепестковъ 8. Плодь—сложная сѣмянкa; плодики несутъ по длинному перистому столбику. Цвѣтетъ лѣтомъ.

Низмянка, см. Низмянка маленькая (*Centunculus minimus* L.).

Низмянка маленькая (*Centunculus minimus* L.). Сотенникъ (Собол.). Маленькая однолѣтняя вѣтвистая совершенно голая травка изъ семейства «первоцвѣтныхъ» (*Primulaceae* Vent.), съ простымъ прямостоящимъ или простерто-вѣтвистымъ стеблемъ, вып. въ $1\frac{1}{2}$ рѣже $1\frac{1}{2}$ вершка, распространенная въ средней Европѣ, изрѣдка встрѣчающаяся въ средней и западной Россіи. Листья очередные, яйцевидные, острые, короткочерешковые. Бѣлые или розовые мелкіе цвѣты, большею частью сидячіе, пазушные, короче листьевъ. Чашечка глубоко-4-храздѣльная, вѣнчикъ мелкій, чашеобразный, съ вздутою почти шаровидною трубкою и 4-храздѣльнымъ отгибомъ; тычинки съ короткими нитями, прикрѣпленныя къ основанію вѣнчика. Завязь верхняя, одногнѣздная, съ свободнымъ центральнымъ сѣмяносомемъ. Столбикъ простой, съ головчатымъ рыльцемъ. Плодь—шаровидная коробочка, раскрывающаяся поперекъ. Цвѣтетъ лѣтомъ. Растетъ на поляхъ и на влажныхъ мѣстахъ. (Рис. 193.)

Низодубная трава, см. Дубровникъ обыкновенный (*Teucrium chamaedrys* L.).

Николай, см. Синеголовникъ равнинный (*Eryngium campestre* L.).

Николаева трава, см. Кудрявецъ (*Chenopodium Botrys* L.).

Николаевская трава, см. Синюха обыкновенная (*Polemonium coeruleum* L.).

Николаекъ трава, см. Синеголовникъ равнинный (*Eryngium campestre* L.).

Николайки, см. Синеголовникъ равнин. (*Eryngium campestre* L.).

Николайки, см. Первоцвѣтъ лекарственный (*Primula officinalis* Jacq.).

Николайчики, см. Синеголовникъ равнинный (*Eryngium campestre* L.).

Никольская трава, см. Синюха обыкновенная (*Polemonium coeruleum* L.).

Ниселозъ, см. Ива ползучая (*Salix repens* L.).

Нимица, см. Бѣлена черная (*Hyosciamus niger* L.).

Нимица, см. Дурманъ вонючій (*Datura stramonium* L.).

Нимыца, см. Бѣлена черная (*Hyosciamus niger* L.).

Нітникъ, см. Солнечникъ обыкновенный (*Helianthemum vulgare* Gärtn.).

Нидалоза, см. Иванъ-чай (*Epilobium angustifolium* L.).

Нога волчья, см. Зюзникъ европейскій (*Lycopus europaeus* L.).

Нога козья трава, см. Сныть обыкновенная (*Aegopodium Podagraria* L.).

Нога курячья трава, см. Портулакъ огородный (*Portulaca oleracea* L.).

Нога пѣтушья ядовитая, см. Лютикъ ядовитый (*Ranunculus sceleratus* L.).

Ноги комаровы, см. Васильки рогаые (*Delphinium Consolida* L.).

Ногорѣзъ, см. Тѣлорѣзъ сабуровидный (*Stratiotes aloides* L.).

Ноготки (*Calendula officinalis* L.). Фармацевтическое название *Calendula s. Caltha sativa, s. Populago* (*Herba et Flores*). Ноготокъ аптечный, Нагѣдки (Малор.), Нагодки, Нагѣтки, Нокотки, Наугодки, Нагодка, Крокосъ польный (Минск.). Однолѣтнее травянистое железисто-опушенное растение изъ семейства «сложноцвѣтныхъ» (*Compositae* Adans.), выш. $4\frac{1}{2}$ —11 вершк., съ своеобразнымъ непріятнымъ запахомъ, родомъ изъ южной Европы. Листья спирально-расположенные, пушистые, рѣдко-зубчатые; нижніе—черешковые, обратно-яйцевидные, остальные—сидячіе, продолговатые или ланцетные. Оранжевые цвѣты въ одиночныхъ корзинкахъ, снабженныхъ приплюснуто-полусферической оберткой изъ 1—2 рядовъ почти одинаковыхъ, линейныхъ, заостренныхъ листочковъ. Цвѣтоложе голое и плоское, краевые женскіе цвѣтки, расположенные въ 2—3 ряда, язычковые, плодущіе; срединные цвѣты трубчатые, обоеполовые, бесплодные. Тычинокъ 5; пыльники ихъ съ придатками; завязь нижняя одногнѣзная, односѣмянная; столбикъ женскихъ цвѣтовъ двуплостный, мужскихъ—нераздѣльный. Плодъ—сѣмянки, большею частью лодочкообразной формы, внутреннія—кольцеобразныя; всѣ сѣмянки безъ хохолка. Цвѣтетъ лѣтомъ. Разводится всюду въ садахъ въ многочисленныхъ сортахъ разнаго цвѣта. (Табл. XXXII, фиг. 180.)

МЕДИЦИННОЕ УПОТРЕБЛЕНІЕ. Прежніе врачи охотно назначали отъ головокруженій, перемежающихся лихорадокъ, отъ золотухи и нѣкоторыхъ глазныхъ болѣзней. Цвѣты ноготковъ очень хвалили противъ заразы и злокачественныхъ горячекъ. Въ настоящее время врачами ноготки совсѣмъ не назначаются.

Въ народной medicinѣ ноготки употребляются снаружи для прикладыванія къ бородавкамъ и мозолямъ.

Цвѣты ноготковъ употребляются вмѣсто шафрана для окрашиванія различныхъ матерій въ желтый цвѣтъ. Крестьяне иногда подкрашиваютъ ими масло.

Въ гомеопатіи ноготки употребляются въ тѣхъ-же случаяхъ, какъ и арника, и, кромѣ того, для полосканія рта, чтобы уничтожить дурной запахъ; на стаканъ теплой воды берутъ 20—30 капель; также ноготки идутъ для спринцеванія отъ бѣлей; на кружку берутъ 1—2 чайныхъ ложки настойки ноготковъ. Изъ растенія въ гомеопатической аптекѣ готовятъ мазь отъ ожоговъ и застарѣлыхъ ранъ и пластырь, по виду похожій на пластырь изъ арники и употребляющійся такъ-же, какъ послѣдній, для заглѣпленія свѣжихъ ссадинъ и порѣзовъ.

Ноготки болотные, см. Калужница болотн. (*Caltha palustris* L.).

Ноготки полевые, см. Пупавка красильная (*Anthemis tinctoria* L.).

Нототная трава, см. Ястребинка волосистая (*Hieracium Pilosella* L.).

Ноготный цвѣтъ, см. Калужница болотная (*Caltha palustris* L.)

- Ноготокъ**, см. Горичвѣтъ весенній (*Adonis vernalis* L.).
- Ноготокъ аптечный**, см. Ноготки (*Calendula officinalis* L.).
- Ноготокъ бычій**, см. Пулавка красильная (*Anthemis tinctoria* L.).
- Ногтикъ**, см. Маточникъ (*Dracoscephalum moldavica* L.).
- Ногтовая трава**, см. Травянка лекарственная (*Dianthus deltoides* L.).
- Ногтоѣдная трава**, см. Вороній глазъ (*Paris quadrifolia* L.).
- Ногтоѣдная трава**, см. Грушанка круглолистная (*Pirola rotundifolia* L.).
- Ногтоѣдникъ**, см. Хатьма тюрингенская (*Lavatera thuringiaca* L.).
- Ножки кукушкины**, см. Башмачки желтые (*Cypripedium Calceolus* L.).
- Ножки заячьи**, см. Клеверъ пашенный, или кошачій (*Trifolium arvense* L.).
- Ноздря лазоревая** } см. Стародубка (*Gentiana Amarella* L.).
- Ноздрякъ-трава** }
- Норица**, см. Норичникъ узловатый (*Scrophularia nodosa* L.).
- Норичная трава**, см. Стародубка (*Gentiana Amarella* L.).
- Норичная трава**, см. Деревей (*Ptarmica cartilaginea* Dc.).
- Норичная трава**, см. Пижма (*Tanacetum vulgare* L.).
- Норичникъ**, см. Норичникъ водяной (*Scrophularia aquatica* L.).
- Норичникъ**, см. Норичникъ узловатый (*Scrophularia nodosa* L.).
- Норичникъ**, см. Ласточникъ обыкновенный (*Vincetoxicum officinale* L.).
- Норичникъ водяной** (*Scrophularia aquatica* L.). Фармацевтическое названіе: *Betonica aquatica* s. *Scrophularia aquatica*. Буквица водяная, Голова собачья, Голова песья, Кирпичникъ, Зубный корень, Матшникъ (Могила), Норичникъ, Ранникъ (Малор.), Свинуха (Курск.). Многолѣтнее травянистое растеніе изъ семейства «норичниковыхъ» (*Scrophulariaceae* R. Br.), распространенное въ Средней Европѣ, въ средней и южной Россіи. Стебель выш. 14—28½ вершк. крылато-4-хгранный, съ яйцевидно-продолговатыми, при основаніи округлыми, или немного только сердцевидными, пальчатыми или городчато-пальчатыми, туповатыми листьями. Зеленовато-красно-бурые мелкіе цвѣты расположены рыхлой продолговатой метелкой. Чашечка 5-тираздѣльная, съ округлыми, широко-перепончато-округлыми долями; вѣнчикъ шаровидно-кувшинчатый, съ почти 2-губымъ, 5-тилопастнымъ отгибомъ, верхнія лопасти его крупнѣе нижнихъ; тычинокъ 4, двусильныхъ (2 длиннѣе остальныхъ 2-хъ), вмѣсто 5-ой верхней тычинки подъ верхнею губою находится выемчато-двулопастный железистый стаминодій, т. е., железистая чешуйка. Завязь верхняя 2-хгнѣздная, съ однимъ столбикомъ. Плодъ—округло-яйцевидная, вдвое превышающая чашечку двустворчатая коробочка, съ овальными перекръ-морщинистыми сѣменами. Цвѣтетъ лѣтомъ. Растетъ на сырыхъ мѣстахъ, по болотамъ, по берегамъ рѣкъ и канавамъ.
- МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНІЕ** извѣстно только въ народѣ.

Листья прикладываютъ къ золотушнымъ ранамъ, а настой корней употребляютъ въ водкѣ отъ лихорадки.

Норичникъ узловатый (*Scrophularia nodosa* L.). Фармацевтическое назв.: *Scrophularia fetida*, s. *vulgaris* (*Radix et Herba*). Горлянка (Влад.), Гризъ, Грызная трава (т. е., грыжная, Курск.), Завалець (Кондр., Двиг.), Завилецъ, Зелье черное (Бесс.), Заберъ (Бѣлор.), Крестовикъ (Кал.), Крестовникъ (Тамб.), Килька (Костр.), Кукулярія (Укр., Кален., Малор.), Ломенусъ (вѣр., Ломоносъ, Волын.), Междуперсица, Норичникъ, Норица (Вятск.) и изм. Норышникъ, Норичникъ (Сл. Ал.), Подлесникъ, Подтынникъ, Пидтинникъ (Малор.), Петровъ-крестъ (Ворон.), Песочная (Нижег.), Ранникъ (Полт.), Скулатникъ (Орл.), Семисильникъ (Полт.), Смодъ (Волк., Малор.), Сороконедужникъ (Костр.), Старовина (Сл.-П., Могил., Кіев.), Тонколистникъ, Широколистница (Екат.), Шора (Вятск.), Чильчакъ, Фіонъ (Орл.), Галочьи ягоды (Влад.), Голова песья или собачья, Зобный корень, Зобная трава, Свиныхъ, Свиная трава (съ чешск.), Тредовникъ, Жабрей (Ниж.), Шалфей полевой (Минск.). Многолѣтнее травянистое растеніе изъ семейства «норичниковыхъ» (*Scrophulariaceae* R. Br.), распространенное почти по всей Европѣ и по всей Россіи, съ мясистымъ клубнеобразно-утолщеннымъ корневищемъ. Стебель выш. отъ 14—28½ вершк. остро-4-хгранный, безкрылый. Листья яйцевидно-продолговатые, супротивные, по краямъ съ двойными пило-видными зубуринами. Зеленовато-бурые мелкіе цвѣты расположены рыхлой продолговатой метелкой. Чашечка 5-тираздѣльная, съ яйцевидно-округлыми, широко-бѣловато-перепончато-окаймленными долями. Вѣтчикъ шаровидно-кувшинчатый, съ верхней 2-лопастной и нижней 3-хлопастной губами; верхнія лопасти крупнѣе нижнихъ. Тычинокъ 4, двусильныхъ (2 короче 2-хъ остальныхъ); вмѣсто 5-ой верхней тычинки подъ верхней губой находится железистый спереди округлый стаминодій (железистая чешуйка). Завязь верхняя двугнѣздная, съ однимъ столбикомъ. Плодъ—шаровидно-яйцевидная, остроконечная, двустворчатая коробочка, съ овальными поперекъ-морщинистыми сѣменами. Цвѣтетъ лѣтомъ. Растетъ на лугахъ, по берегамъ рѣкъ, между кустарниками и въ сырыхъ лѣсахъ.

МЕДИЦИННОЕ УПОТРЕБЛЕНІЕ. Въ прежнее время корень и трава растенія употреблялись врачами отъ золотухи, зоба и для разбитія опухолей и затвердѣній, теперь оно совсѣмъ оставлено врачами и извѣстно только въ народной медицинѣ. Листья растенія и порошокъ изъ нихъ прикладываются на раны и нарывы. Въ Нижегородской губерніи пьютъ отваръ травы отъ грыжи и истерическихъ припадковъ, называемыхъ порчею, отъ укушеній бѣшеными животными и отъ водобоязни. Для приготовления отвара берутъ одну чайную ложку травы, заливаютъ фунтомъ воды, кипятятъ, процеживаютъ и пьютъ чашками. Снаружи отваръ служитъ для обмыванія; изъ свѣжихъ листьевъ дѣлаютъ припарки, а сухіе прикладываютъ на раны. Свѣжій сокъ растенія варится въ сывороткѣ и дается чахоточнымъ больнымъ; 3—4 столовыхъ

ложки сока варять съ двумя фунтами сыворотки въ теченіе $\frac{1}{2}$ часа, процеживаютъ и даютъ по чайной чашкѣ 2—3 раза въ день.

Норышная трава, см. Стародубка (*Gentiana Amarella* L.).

Норышная трава } см. Золототысячникъ обыкновенный (*Ery-*
Норышникъ } *thraea Centaurium* L.).

Носовая, см. Кошачьи лапки (*Antennaria dioica* Gärtn.).

Носокъ, см. Алстникъ цикутный (*Erodium cicutarium* L.).

Носокъ голубиный, см. Герань луговая (*Geranium pratense* L.).

Носокъ чибесиный, см. Горошекъ мышиный (*Vicia Cracca* L.).

Носики комаровы, см. Васильки рогатые (*Delphinium Conso-*
lida L.).

Ночная доба } см. Фиалка ночная обыкновенная (*Nespe-*
Ночная красавица } *ris matronalis* L.).

Ночная красавица (*Mirabilis Jalapa* L.). Однолѣтнее, одно изъ любимыхъ садовыхъ, растеніе, родомъ изъ южной Америки, не-
сущее на одномъ и томъ-же стеблѣ желтые, красные и желто-
вато-пестрые цвѣты, развертывающіе свой вѣтчикъ только
послѣ полудня.

МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНІЕ. Растеніе имѣетъ слабительное
свойство, отчего и называется «ложною ялапою». Въ медицинѣ
оно не употребляется, разводится въ садахъ.

Ночная красавица, см. Фиалка ночн. (*Platanthera bifolia* Rich.).

Ночная красота, см. Ночная красавица (*Mirabilis Jalapa* L.).

Ночная тѣнь, см. Чечевичная ягода (*Phytolacca decandra* L.).

Ночные духи, см. Фиалка ночная (*Platanthera bifolia* Rich.).

Нудушки, см. Башмачки желтые (*Cypripedium Calceolus* L.).

Нѣмица, см. Вѣлена черная (*Hyosclamus niger* L.).

Нѣмица лѣсная, см. Ленъ дикій (*Linaria vulgaris* Mill.).

Нѣмка, см. Брюква (*Brassica Napus* L.).

Нѣтникъ, см. Солнечникъ обыкновенный (*Helianthemum vulgare*
Gärtn.).

Нюнка } см. Ежеголовка вѣтвистая (*Sparganium ramosum* L.).
Нюнька }

Нюнька, см. Манникъ обыкновенный (*Glyceria fluitans* R. Br.).

Нюньки, см. Калужница болотная (*Caltha palustris* L.).

Нюхтинъ, см. Золототысячникъ обыкновенный (*Erythraea Cen-*
taurium L.).

Няжега, см. Гречижа-спырышъ, или Гречижа птичья (*Polygonum*
aviculare L.).

О.

Обвивальница заборная, см. Вьюнокъ заборный (*Convolvulus*
sepium L.).

Обгрызокъ чертъ вѣ, см. Скабіоза желтая (*Scabiosa succisa* L.).

Обезьянное дерево, см. Баобабъ (*Adonsonia digitata* L.).

Облапа } см. Копытенъ европейскій (*Asarum euro-*
Облапа ванная } *paum* L.).

- Облѣпиха**, см. Облѣпиха обыкновенная (*Hipporrhaë rhamnoides* L.).
- Облѣпиха обыкновенная** (*Hipporrhaë rhamnoides* L.). Восковица (Алт.), Дереза (Ставр.), Ивотернъ, Млечникъ, Облѣпиха (Сиб.), Плоховникъ (Укр.), Ракита (Даль), Ракитникъ (на Оби), Терновникъ (Бйск., Ставр.), Терповникъ песочный (Даль), Тернъ таловый, Щецъ (Укр.). Колючій вѣтвистый кустарникъ выш. отъ 1½ арш. до 1 саж., изъ семейства «лоховыхъ» (*Elaeagnaceae*), распространенный въ средней Европѣ, встрѣчающійся на Кавказѣ, въ Сибири и Туркестанѣ. Листья линейно-ланцетные, цѣльнокрайніе, сверху зеленые, снизу серебристо-бѣлые. Цвѣты двудомные, очень мелкіе, желтоватые. Плоды золотисто-желтые, на вкусъ кисловатые. Цвѣтеть рано весною. Растетъ на песчаныхъ и болѣе или менѣе влажныхъ мѣстахъ. Плоды идутъ на варенье и наливки. Разводится въ садахъ. (Рис. 195.)
- Обморокъ** } см. Букашникъ горный (*Jasione montana* L.).
- Обморочникъ** }
- Образки**, см. Румянка лекарственная (*Anchusa officinalis* L.).
- Оразки**, см. Аройникъ пятнистый (*Arum maculatum* L.).
- Образки**, см. Бѣлокрыльникъ болотный (*Calla palustris* L.).
- Обручная трава**, см. Камышъ озерной (*Scirpus lacustris* L.).
- Обыкновенный цвѣтъ**, см. Пупырникъ обыкновенный (*Torilis Anthriscus* Gärtn.).
- Оверьянъ**, см. Валеріана лекарственная (*Valeriana officinalis* L.).
- Овесъ**, см. Овесъ обыкновенный (*Avena sativa* L.).
- Овесъ**, см. Колоснякъ песчаный (*Elymus arenarius* L.).
- Овесъ венгерскій, или однобочный** (*Avena orientalis* L.). Одногривый овесъ. Считается нѣкоторыми ботаниками только разновидностью овса обыкновеннаго (описаніе см. ниже: «Овесъ обыкновенный»), отъ котораго отличается сжатой однобочною метелкой. Разводится такъ-же, какъ овесъ обыкновенный. (Таб. XXXII, фиг. 177.)
- Овесъ водяной**, см. Рисъ канадскій (*Zizania aquatica* L.).
- Овесъ дикій**, см. Овесъ живой (*Avena fatua* L.).
- Овесъ живой** (*Avena fatua* L.). Вѣсютъ (Мал.). Овесъ приторный, Овесъ дикій. Однолѣтняя трава изъ семейства «злаковыхъ» (*Gramineae* Juss.), распространенное въ Европѣ, въ средней и южной Россіи. Стебель выш. 14—22½ верш. Вѣтви метелки раскинуты во все стороны. Колоски обыкновенно 3-цвѣтные, повилике; у всѣхъ цвѣтковь (иногда за исключеніемъ верхняго) наружная пленка несетъ на спинкѣ длинную колючатую ость, при основаніи скрученную и усаженную до середины длинными щетинистыми волосами. Околоцвѣтникъ состоитъ изъ 2-хъ пленокъ; тычинокъ 3; завязь одногнѣздная, одноосѣмянная, обыкновенно наверху мохнатая, съ 2-мя столбиками. Плодъ—веретенообразное, съ узкою бороздкою внутри, плотно окруженное кожистою пленкою зерно. Цвѣтеть лѣтомъ, встрѣчается, какъ сорная трава, на поляхъ и между посѣвами. (Рис. 196.)
- Овесъ заячій**, см. Костеръ ржаной (*Bromus secalinus* L.).
- Овесъ луговой** (*Avena pratensis* L.). Многолѣтняя трава изъ

семейства «злаковыхъ» (*Gramineae* Juss.), образующая густыя дерновинки, распространенная въ средней Европѣ и изрѣдка встрѣчающаяся въ западной, юго-западной Россіи и въ Прибалтійскомъ краѣ. Листья узко-линейные, въ почкосложеніи обыкновенно сложенные вдоль, по краямъ, вмѣстѣ съ влагалищами остро-широковатые; метелка узкая, кистеобразная, прямо-стоящая; вѣточки ея толстыя, короткія, утолщенные подѣ колосками, нижнія по три пучками и несутъ по 1—2 колоска; колоски 3—5-цвѣтковые; колосковые чешуи серебристо-бѣлыя, въ срединѣ съ зеленою красновато-окаймленною полоскою, нижняя, наружная, створка обыкновенно съ тремя жилками. Цвѣточные чешуи съ 7-ю жилками и съ колючатою остію на спинкѣ. Околоцвѣтникъ состоитъ изъ 2—3 маленькихъ нѣжныхъ пленокъ; тычинокъ 3; завязь одногнѣздная, односѣмянная, наверху мохнатая. Плодъ—желобчатое зерно. Цвѣтетъ въ началѣ лѣта. Растетъ на сухихъ лугахъ и холмахъ. Причисляется къ числу хорошихъ кормовыхъ травъ.

Овесъ луговой, см. Манникъ высочій (*Glyceria spectabilis* M. et K.).

Овесъ обыкновенный (*Avena sativa* L.). Зернетъ (Сиб.). Разновидности: Рыхлякъ, Рыхликъ, Галакъ, Канаръ. Однолѣтнее травянистое растеніе, изъ семейства «злаковыхъ» (*Gramineae* Juss.), вып. 18—22½ вершк. Метелка развѣсистая, съ вѣтвями, раскинутыми во всѣ стороны. Листья въ почкосложеніи свернутые, язычекъ листьевъ короткій. Колоски 2—3-цвѣтковые, повислые; ось колоска голая или подѣ нижнимъ цвѣткомъ пушистая. Колосковые чешуи (2 нижнія чешуи при колоскѣ) длиннѣе цвѣточныхъ (2-хъ пленокъ, наружной и внутренней, при каждомъ цвѣткѣ), туповато-зубчатыхъ; нижній цвѣтокъ обыкновенно снабженъ остію, скрученную при основаніи и выступающею изъ спинки наружной пленки. Околоцвѣтникъ состоитъ изъ 2-хъ маленькихъ нѣжныхъ двулопастныхъ пленокъ. Тычинокъ 3; завязь одногнѣздная, односѣмянная, наверху пушистая, съ 2-мя столбиками. Плодъ—веретенообразное зерно, изнутри снабженное узкою бороздкою. Цвѣтетъ лѣтомъ. Разводится на поляхъ въ многочисленныхъ сортахъ, происшедшихъ путемъ многолѣтней культуры. Овесъ идетъ въ пищу людямъ (изъ него получаютъ муку, крупу, толокно) и на кормъ лошадямъ. (Таб. XXXII, фиг. 179.)

МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНІЕ. Отваръ овсяной крупы служитъ хорошимъ обволакивающимъ средствомъ для раздраженныхъ слизистыхъ оболочекъ и въ то-же время отличнымъ питательнымъ веществомъ и потому употребляется во многихъ болѣзняхъ. Слабымъ больнымъ и маленькимъ дѣтямъ изъ овсянки варятъ супы на бульонѣ и молокоѣ. Также даютъ овсянку ввидѣ кашицы тоже на молокоѣ. Существуютъ различныя виды овсяной крупы; въ настоящее время особенно въ большомъ употребленіи крупа, такъ называемая «Геркулесъ»; она хорошо разваривается, можетъ быть протерта сквозь рѣшето, отчего получается густая кашница безъ

комочковъ и крупинокъ, что въ особенности хорошо для маленькихъ дѣтей, которые не охотно ѣдятъ кашу съ крупю. Очень часто случается, что дѣти не могутъ переносить чистое молоко: казеннѣ его свертывается у нихъ въ желудкѣ въ большіе комья, которые выходятъ не переваренными съ испражнениями или же съ рвотою; если при этомъ ребенка крѣпятъ, ему полезно разводить молоко овсянымъ отваромъ. Для этого берутъ горсть овсяной крупы, заливаютъ ее стаканомъ воды, кипятятъ, процеживаютъ и, смотря по возрасту ребенка, смѣшиваютъ отваръ съ молокомъ пополамъ, или берутъ на одну часть отвара 2 части молока. Молоко должно быть раньше прокипячено; смѣшивается оно съ отваромъ передъ тѣмъ, какъ давать ребенку, и снова кипятится. При искусственномъ вскармливаніи дѣтей овсянымъ отваромъ пользуются съ первыхъ дней жизни ребенка, имъ разводятъ молоко вмѣсто воды, при прикармливаніи имъ также разводятъ молоко. При склонности дѣтей къ поносамъ молоко разводятъ жженнымъ отваромъ. Кромѣ внутренняго употребленія, овсяный отваръ служитъ для полосканія горла, обмываній кожи отъ сыпей, овсяная мука употребляется для приготовленія припарокъ, точно такъ-же, какъ и сухой овесъ. Изъ овсяной муки дѣлаютъ припарки, какъ изъ толченнаго льнянаго сѣмени, сухой-же овесъ насыщается на противень, согрѣвается въ печкѣ, всыпается въ мѣшокъ и накладывается на больное мѣсто; такіа сухія припарки хорошо помогаютъ при боляхъ въ животѣ отъ прохожденія камней въ желчномъ пузырьѣ, отъ болей въ животѣ, сопровождающихся поносомъ, и также при нѣкоторыхъ женскихъ болѣзняхъ, въ особенности при болѣзненныхъ менструаціяхъ.

Въ ветеринарной медицинѣ овесъ служитъ обыкновенно пищу лошадей. Отваръ овса дается имъ внутрь при разстройствѣ желудочно-кишечнаго канала, также изъ него лошадямъ въ этихъ случаяхъ ставятъ клистиры. Собакамъ въ молодомъ возрастѣ обыкновенно даютъ овсяный супъ для ѣды. При продолжительномъ разстройствѣ кишечника хорошо помогаетъ поджаренный овесъ. Овесъ одногривый, см. Овесъ венгерскій (*Avena orientalis* L.). Овесъ песочный, см. Колоснякъ песчаный (*Elymus arenarius* L.).

Овесъ приторбый, см. Овесъ живой (*Avena fatua* L.). Овесецъ, см. Дрема кукушкинъ цвѣтъ (*Lychnis viscaria* L.). Овесецъ, см. Костерь ржаной (*Bromus secalinus* L.). Овечки полевые, см. Цминъ (*Helichrysum arenarium* DC.). Овечья смерть, см. Ковыль волосистый (*Stipa capillata* L.). Овечья трава, см. Сонъ трава (*Anemone patens* L.). Овечья трава, см. Овсяница овечья (*Festuca ovina* L.). Овечья трава, см. Дубровка (*Veronica chamaedrys* L.). Овощъ гишпанскій, см. Шпинатъ огородный (*Spinacia oleracea* Mill.).

Овсюгъ, см. Овесъ живой (*Avena fatua* L.). Овсюгъ, см. Костерь ржаной (*Bromus secalinus* L.). Овсюгъ, см. Овсяница овечья (*Festuca ovina* L.).

Овсяница, см. Овсяница овечья (*Festuca ovina* L.).

Овсяница, см. Овсяница высокая (*Festuca elatior* L.).

Овсяница высокая (*Festuca elatior* L.). Метла, Митлиця (Малор.), Вожець (Арх.), Костеря (Новг.), Манна луговая, Мурогъ (Могил.), Овсягъ, Овсянникъ, Овсяница, Райграссъ французскій, Тонконожка (Вор.). Многолѣтняя трава изъ семейства «злаковыхъ» (*Gramineae* Juss.), распространенная почти по всей Европѣ и весьма обыкновенная въ Россіи. Стебель выш. 7—22½ вершк., при основаніи приподнимающійся, гладкій. Всѣ листья плоскіе, линейные, зеленые. Метелка однобокая, во время цвѣтенія раскидистая; нижнія вѣтви ея сидятъ на главной оси попарно, причемъ короткая вѣтвь несетъ 1—2 колоска, а длинная 3—4 или большее число колосковъ. Колоски линейные, многоцвѣтковые, блѣдно-зеленые или красноватые. Створки, или колосовыя чешуйки, короче цвѣточныхъ чешуй, изъ которыхъ наружныя—округленныя безъ остей, рѣже съ короткою остью. Околоцвѣтникъ состоитъ изъ сросшихся между собою при основаніи двуллопастныхъ мелкихъ пленокъ. Тычинокъ 3; завязь одногнѣздная, односѣмянная, голая, съ 2-мя столбиками. Плодъ—обратно-яйцевидное зерно съ желобкомъ на внутренней сторонѣ, сросшееся съ цвѣточными чешуями. Цвѣтетъ лѣтомъ. Растетъ на лугахъ и между кустарниками. Относится къ лучшимъ кормовымъ злакамъ. (Та бл. XXXII, фиг. 181.)

Овсяница красная (*Festuca rubra* L.). Смочка (Черп.) Пречистыя ручки (Черп.). Многолѣтняя трава изъ семейства «злаковыхъ» (*Gramineae* Juss.), распространенная во всей Европѣ и Россіи, образующая негустой дернъ и снабженная ползучими подземными побѣгами. Стебель цилиндрическій, при основаніи приподнимающійся, гладкій. Листья съ замкнутыми коротко-пушистыми влагалищами, прикорневые—щетинообразные, стеблевые-же—плоскіе, послѣ цвѣтенія съ завернутыми краями; язычекъ листьевъ съ двумя боковыми ушками. Метелка во время цвѣтенія раскидистая, потомъ сжатая, негустая; нижніе ея вѣтви сидятъ обыкновенно по 2—3. Колоски съ 4—6 (рѣдко съ 10) цвѣтками, зеленоватые, красноватые, буроватые или слегка фіолетовые. Наружная цвѣточная чешуя узко-ланцетная, съ малозамѣтными жилками, снабжена небольшою остью. Околоцвѣтникъ состоитъ изъ сросшихся между собою при основаніи маленькихъ двуллопастныхъ пленокъ. Тычинокъ 3; завязь одногнѣздная, односѣмянная, на верхушкѣ голая, съ 2-мя столбиками. Плодъ—продолговатое зерно, съ бороздкою съ внутренней стороны, сросшееся съ цвѣточными чешуями. Цвѣтетъ въ началѣ лѣта. Растетъ на песчаныхъ лугахъ, въ лѣсахъ и между кустарниками.

Овсяница овечья, волосянка (*Festuca ovina* L.). Манникъ (Вор., Могил.), Манна овечья, Овечья трава, Овсяница, Типецъ (Екат., Дон. и др.), Шипецъ (Малор.), Типчакъ (на Дону), Тонконогъ, Тонконігъ (Малор.), Щетка, Щетина (Олон.). Многолѣтняя трава изъ семейства «злаковыхъ» (*Gramineae* Juss.), выш. 7—

14 вершк., распространенная почти во всей Европѣ и во всей Россіи, образующая густыя дерновины. Корневище ея выпускаетъ пучки прикорневыхъ листьевъ и тонкіе наверху 4-хгранные стебли, на которыхъ сидятъ всего по 1—2 стеблевыхъ листа. Всѣ листья щетинообразные, съ короткимъ язычкомъ и 2-мя ушками, обхватывающими стебель. Метелка почти однобокая, сжатая, только во время цвѣтенія раскидистая; вѣтви ея короткія, направлены вверхъ и выходятъ изъ главной оси по 1—2. Колоски 4—6-ти (рѣже 8—9) цвѣтковые, зеленые или слегка фіолетовые, съ острыми почти линейными чешуями. Цвѣточныя чешуи линейно-ланцетныя, острые, съ неясными жилками, наружныя съ короткою остью или безъ нея. Околоцвѣтникъ состоитъ изъ сросшихся при основаніи между собою маленькіхъ пленокъ. Тычинокъ 3; завязь одногнѣздная, односѣмянная, на верхушкѣ голая. Плодь—продолговатое зерно съ бороздкою съ внутренней стороны. Цвѣтетъ въ началѣ лѣта. Растетъ на сухихъ лугахъ, въ лѣсахъ, степяхъ, преимущественно на сухой песчаной почвѣ. Въ песчаныхъ мѣстностяхъ доставляетъ овцамъ хорошее пастбище.

Овсянишникъ, см. Овсяница высокая (*Festuca elatior* L.).

Овсянншникъ, см. Шиповникъ (*Rosa canina* L.).

Овсянка, см. Костеръ ржаной (*Bromus secalinus* L.).

Овсянка, см. Травянка лекарственная (*Dianthus deltoides* L.).

Овсянка, см. Шпажникъ черепчатый (*Gladiolus imbricatus* L.).

Овсянка, см. Кудри царскія (*Lilium Martagon* L.).

Овсянникъ, см. Ежа сборная (*Dactylis glomerata* L.).

Овсяные коренья (*Tragopogon porrifolius* L.). Сальсифисъ. Фармацевтическое названіе: *Tragopogon Artif* (*Radix*). Двудѣтное голое травянистое растение изъ семейства «сложноцвѣтныхъ» (*Compositae* Adans.), родомъ изъ южной Европы, съ линейными, при основаніи стеблеобъемлющими и пѣлынокрайними листьями и прямостоящимъ стеблемъ, несущимъ одиночную корзинку желтыхъ цвѣтовъ. Плодь—цилиндрической формы сѣмянки съ хохолкомъ изъ перистыхъ волосковъ. Корень употребляется въ пищу, растение нерѣдко разводится, какъ овощъ въ огородахъ и въ садахъ.

Огиросникъ, см. Сабельникъ болотный (*Comarum palustre* L.).

Огирчакъ, см. Короставникъ полевой (*Scabiosa arvensis* L.).

Огірокъ, см. Огурецъ огородный (*Cucumis sativus* L.).

Огірочна трава, см. Огуречная трава (*Borrago officinalis* L.).

Огірочна трава, см. Клеверъ пашенный, или кошачій (*Trifolium arvense* L.).

Огірочникъ, см. Огуречная трава (*Borrago officinalis* L.).

Огірошникъ, см. Медунца (*Spiraea ulmaria* L.).

Огірошникъ, см. Клеверъ пашенный, или кошачій (*Trifolium arvense* L.).

Огненица, см. Зубная трава (*Anacyclus Pyrethrum* DC.).

Огневка, см. Суменица лѣсная (*Gnaphalium silvaticum* L.).

Огневка, см. Щавель домашній (*Rumex domesticus* L.).

- Огневка**, см. Щавель курчавый (*Rumex crispus* L.).
- Огнецвѣтъ**, см. Сабельникъ болотный (*Comarum palustre* L.).
- Огнецвѣтъ**, см. Иванъ да Марья (*Melanopyrum nemorosum* L.).
- Огникъ**, см. Колючникъ обыкновенный (*Carlina vulgaris* L.).
- Огникъ**, см. Наголоватокъ красный (*Jurinea cyanoides* Rich.).
- Огонекъ**, см. Смола (*Lychnis Viscaria* L.).
- Огонь-крапива**, см. Крапива жгучая или мелкая (*Urtica urens* L.).
- Огонь летучій**, см. Сушеница болотная (*Gnaphalium uliginosum* L.).
- Огонь мышинный**, см. Вьюнокъ заборный (*Convolvulus sepium* L.).
- Огонь-трава**, см. Звѣздчатка злачная (*Stellaria graminea* L.).
- Огорошникъ**, см. Кровохлебка лекарственная (*Sanguisorba officinalis* L.).
- Огорошникъ**, см. Медунца (*Spiraea ulmaria* L.).
- Огурецъ**, см. Огурецъ огородный (*Cucumis sativus* L.).
- Огурецъ армянскій**, см. Яичное дерево (*Solanum ovigerum* L.).
- Огурецъ бѣшеный** (*Momordica Elaterium* L., sin. *Ecballium Elaterium* Rich.). Фармацевтическое названіе: *Cucumis asinulus* s. *Ecballium*, s. *Momordica* (Fructus.). Огурецъ лѣсной, или ослиный, Огурцы собачьи, Огурчики скаунчики, Огурчики бѣдовые, Дерябка. Однолѣтнее травянистое растеніе изъ семейства «тыквенныхъ» (*Cucurbitaceae* Juss.), распространенное въ южной Европѣ, въ Крыму, на Кавказѣ, у Чернаго моря близъ Одессы. Стебель короткий, жесткошершавый, усиковъ нѣтъ. Листья сердцевидные, немного-лопастные, городчато-зубчатые, снизу сѣроволочные, морщинистые. Цвѣтки однодомные: мужскіе—въ кистяхъ, женскіе—одиночныя на цвѣтоножкахъ. Чашечка и вѣнчикъ—5-тираздѣльные; вѣнчикъ блѣдно-желтый; изъ 5 тычинокъ 4—попарно-сросшихся, 5-ая свободна. Завязь нижняя 3-хгнѣздная, съ короткимъ столбикомъ, съ 3-раздѣльнымъ рыльцемъ, доли котораго отогнуты. Плодъ сочный, мясистый, зеленый, величиною въ сливу, колюче-щетинистый, отдѣляющійся отъ цвѣтоножки и раскрывающійся при основаніи отверстіемъ, изъ котораго выбрасывается содержимое. Цвѣтетъ лѣтомъ.
- Огурецъ огородный** (*Cucumis sativus* L.). Огурецъ (Вел. Росс.), Огірокъ, Огурецъ, Гірокъ, Гирки, Гурки, Гурокъ, Угірокъ (Малор.), Гурки (Бѣлор.), Агурокъ. Однодомное однолѣтнее шершаво-волосистое травянистое растеніе изъ семейства «тыквенныхъ» (*Cucurbitaceae* Juss.), родомъ изъ Азіи. Стебель лежачій или лазящій, съ простыми усиками; листья сердцевидные 5-тиугольно-лопастные, съ острыми неравнолѣтно-зубчатыми лопастями. Желтые цвѣты на короткихъ цвѣтоножкахъ, однодомные; мужскіе—пучками въ углахъ листьевъ, женскіе—одиночныя. Чашечка 5-тилопастная; вѣнчикъ 5-тираздѣльный, съ острыми долями. Изъ 5 тычинокъ 4 попарно-сросшихся, 5-ая свободная. Столбикъ короткий, съ 3-мя тупыми рыльцами. Завязь нижняя 3-хгнѣздная. Плодъ мясистый, сочный, продолговатый, бородавчатый, съ 3-мя полными и 3-мя неполными перегородками. Сѣмена продолговатая, сплюснутая, желтая. Цвѣтетъ съ мая

до сентября, разводится всюду, какъ овощъ, во многихъ сортахъ. (Таб. XXXIII, ф и г. 182 и 183.)

МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНІЕ. Въ домашней медицинѣ огурцы имѣютъ обширное примѣненіе. Особенно они славятся, какъ цѣлебное средство отъ кашля и чахотки. Въ медицинѣ употребленіе огурцовъ извѣстно со временъ Гиппократа; врачами огурцы въ настоящее время не прописываются.

Огуречныя сѣмена могутъ служить подобно дыннымъ и тыквеннымъ для приготовления эмульси, или оршада, который представляетъ очень пріятное прохладительное питье, въ особенности полезное больнымъ, страдающимъ болями при мочеиспусканіи. Свѣжіе огурцы, вареные и сырые, полезны для цынготныхъ больныхъ.

Огуречный сокъ рекомендуется для леченія чахотки легкихъ. Огуречнаго сока заразъ дается отъ 2-хъ до 4-хъ столовыхъ ложекъ; такой пріемъ повторяютъ два раза въ день; для вкуса его смѣшиваютъ съ сахаромъ или медомъ. Зимой вмѣсто свѣжаго сока больнымъ даютъ огуречный рассолъ. Огуречный рассолъ извѣстенъ, какъ слабительное и мочегонное средство. Спльно пьющіе водку пьютъ огуречный рассолъ съ похмеля; также его даютъ отъ угара.

Свѣжіе толченныя огурцы прикладываютъ на кожу отъ сыпи. Русскія крестьянки-знахарки слѣдующимъ образомъ лечатъ отъ водянки: онѣ кладутъ больного на полоть въ банѣ и обкладываютъ его солеными половинками огурцовъ, покрываютъ простыней и оставляютъ потѣть около часа; такое потѣніе онѣ повторяютъ еще черезъ нѣсколько дней. Такой способъ леченія слишкомъ рискованъ. Не всѣ виды водянки могутъ быть имъ лечимы, поэтому не слѣдуетъ приступать къ нему, не посоветовавшись съ врачомъ. Свѣжіе огурцы собираются осенью и заготавливаются на зиму, ихъ солятъ. Маленькіе огурцы, извѣстные подъ именемъ корнишоновъ, заливаютъ въ эмалированной посудѣ уксусомъ съ солью. Существующіе въ продажѣ корнишоны иногда имѣютъ слишкомъ яркій зеленый цвѣтъ, который зависитъ отъ окрашиванія мѣдью, растворившеюся въ уксусѣ, если корнишоны варили или настанвали въ мѣдной посудѣ.

Огуречнымъ сокомъ крестьянскія женщины моютъ себѣ лицо отъ загара и дѣлаютъ слѣдующую безвредную смѣсь, которою можно обтирать себѣ лицо отъ прыщей: свѣжій огуречный сокъ смѣшиваютъ съ порошкомъ толченыхъ сѣмянъ и съ обовою или рисовою мукою, высушиваютъ на солнцѣ и получившеюся смѣсью обтираютъ лицо.

Зелень огуречная вмѣстѣ съ капустнымъ и морковнымъ листомъ распаривается крестьянами съ отрубями, такъ какъ составляетъ отличный кормъ для рогатаго скота и свиней.

Огурецъ ослиный, или лѣсной, см. Огурецъ бѣшеный (*Momordica Elaterium* L.).

Огуречная трава (*Borrago officinalis* L.). Фармацевтическое названіе: *Borrago*, *Buglossum latifolium*, s. *Lingua bovis* (Herba).

Борага, Борачо (Стар. рук.), Бурача (Влад., Ниж.), Бурачникъ, Колочка (Вятск.), Огуречникъ, Огуречна трава (Малор.), Огуречный духъ (Вятск.), Огуречные душики, Огуречникъ (въ разн. губ.), Огуречника (Вят.), Угуречникъ (Малор.), Моховикъ (Ниж.), Маслиная капля (Мог.). Жестковолосая однолѣтняя трава съ огуречнымъ запахомъ изъ семейства «бурачниковыхъ» (*Boraginaceae* Juss.), родомъ изъ средиземно-морской области, встрѣчающаяся въ средней полосѣ Россіи, въ юго-западномъ краѣ и на Кавказѣ. Стебель выш. 7—12 вершк., съ растопыренными вѣтвями. Нижніе листья яйцевидно-продолговатые, суженные въ черешокъ, верхніе—продолговатые, сидячіе, стеблеобъемлющіе; голубые поникающіе цвѣты довольно крупныя, на длинныхъ цвѣтоножкахъ. Чашечка глубоко-5-тираздѣльная; вѣнчикъ колесовидный глубоко-5-тираздѣльный, съ яйцевидно-заостренными долями; зѣвъ его замкнутъ 5 короткими выемчатыми чешуйками. Тычинокъ 5, съ пыльниками, кончающимися остроконечіемъ и сходящимися конусомъ, возвышающимся надъ основаніемъ вѣнчика. Завязь верхняя, 4-хлѣздная, 4-хлопастная; столбикъ съ 2-храздѣльнымъ рыльцемъ. Плодъ сухой, распадающійся при созрѣваніи на 4 продолговатыхъ морщинистыхъ, вдоль крупно-бугорчатыхъ, при основаніи выдолбленныхъ орѣшка. Цвѣтетъ въ іюнѣ и въ іюль. Въ началѣ состояніи попадаетъ часто на огородахъ, на сорныхъ или безплодныхъ мѣстахъ. Молодые листья травы употребляются, какъ салатъ. Прѣжде растение употреблялось въ медицину, теперь оставлено. Въ свѣжемъ состояніи оно имѣетъ огуречный запахъ, богато селитрою и любимо пчелами. (Табл. XXXII. фиг. 178.)

Огуречная трава, см. Окопникъ лекарственный (*Symphytum officinale* L.).

Огуречникъ, см. Огуречная трава (*Borrago officinalis* L.).

Огуречникъ, см. Касатикъ водяной (*Iris pseudacorus* L.).

Огуречникъ благовонный, см. Медунца (*Spiraea ulmaria* L.).

Огуречникъ }
Огуречные душики } см. Огуречная трава (*Borrago officinalis* L.).
Огуречный духъ }

Огурешникъ, см. Земляные орѣшки (*Spiraea Filipendula* L.).

Огурешникъ, см. Сонъ (*Anemone Pulsatilla* L.).

Огурешникъ степной, см. Ленъ дикий (*Linaria vulgaris* Mill.).

Огурцы бѣшеные, см. Дурманъ воиочій (*Datura Stramonium* L.).

Огурцы земляные, см. Касатикъ водяной (*Iris pseudacorus* L.).

Огурцы пьяные, см. Дурманъ воиочій (*Datura Stramonium* L.).

Огурцы есбачьи, см. Огурецъ бѣшеный (*Momordica Elaterium* L.).

Огурчики бѣдовые } см. Огурецъ бѣшенный (*Momordica*
Огурчики ек. кунчики } *Elaterium* L.).

Одаленъ, см. Башмачки желтые (*Cypripedium Calceolus* L.).

Одалень }
Одалень бѣленькій } см. Лилія водяная (*Nymphaea alba* L.).

Оделянъ } см. Валеріана лекарственная (*Valeriana officina-*
Одеянъ } *lis* L.).

Одкасникъ, см. Колючникъ обыкновен. (*Carlina vulgaris* L.).

Однодерникъ, см. Оркишъ (*Triticum monococcum* L.).

Однозернянка, см. Оркишъ (*Triticum monococcum* L.).

Однолистъ, см. Бѣлозоръ болотный (*Parnassia palustris* L.).

Однолистникъ, см. Майникъ двулист. (*Majanthemum bifolium* L.).

Одномѣсячная трава, см. Селезеночникъ очереднолистный
(*Chrysosplenium alternifolium* L.).

Одномѣсячникъ, см. Сонъ трава (*Anemone patens* L.).

Одномѣсячникъ луговой } см. Вѣтреннцатѣлистая (*Anemone*
Одномѣсячникъ лѣсной } *pemorosa* L.).

Одномѣсячный цвѣтъ, см. Сонъ (*Anemone Pulsatilla* L.).

Одноосторожникъ, см. Мать и мачиха (*Tussilago Farfara* L.).

Одолень, см. Вехъ ядовитый (*Cicuta virosa* L.).

Одолень, см. Эспарсетъ кормовой (*Onobrychis sativa* Lam.).

Одолень, см. Кувшинка желтая (*Nuphar luteum* Smith.).

Одолень боровой, см. Сонъ (*Anemone Pulsatilla* L.).

Одолѣй, см. Молочай высокій (*Euphorbia procera* M. et B.).

Одолѣй водяной, см. Щавель водяной (*Rumex aquaticus* L.).

Одуванчикъ, см. Одуванчикъ лекарственный (*Taraxacum Dens*
Leonis Desf.).

Одуванчиваки, } см. Одуванчикъ лекарственный (*Taraxacum*
Одуванчикъ, } *Dens Leonis* Desf.).

Одуванчикъ лекарственный (*Taraxacum Dens Leonis* Desf.,
sin. Leontodon Taraxacum L.). Бабка (Малор.), Куйбабка (Сл. Ц.),
Баранки (Умань.), Грядунца (Костр. Галич.), Дойникъ (Влад.),
Подойникъ (Дв.), Подойница (Вятск.). Подойнички (Кал.), Подо-
янка (Кот. Стн.), Жидовка (Мог.), Зубникъ (Кал., Мог.), Зубной
корень (Вятск.), Зубная трава (Вятск.), Зубъ лѣвниный, или
зубецъ, Камчадалка, Ключки (Курск.), Кульбаба (Малор., Тавр.,
Екат. и друг.), Молочай (Иск., Нижегород.), Молочая (Влад.), Моло-
чайникъ простой, Молочайникъ (Арх., Волог., Двин.), Молоканка,
Молокоѣдъ, Одуванчикъ (Моск. и друг.), Одуванчикъ (Ниж.),
Одуванчиваки, Одуванчики (Твер.), Одуилышъ, Дуанъ (Тамб.),
Пустодуй, Подорожникъ (Полтав.), Подорожникъ желтоцвѣтный,
Придорожъ, Полая трава (Вол. Пот.), Попова (Стар. Рук.), Попки
(Стар. Рук.), Поповникъ (Кондр.), Попъ (близъ Калуги), Попово
гуменце (Кондр.), Попова скупья, Попова ильня (Твер., Вятск.,
Пул.), Плывивецъ (Подол.), Плешаки, Пухлянка, Пуховка трава
(Кал.), Пушица круглая (Ниж.), Пушки (Вят., Лал.), Пушникъ
(Даль), Тюролокъ (Вятск.), Хасимъ, Хасимова трава, и ошиб.
Халимъ. Цикорій, Цикорія, Цикорія. Цикорія (Моск., Екат. и др.),
Цикорея (Баз.), Цикорія дикая (Смол.), Цихоръ дикій (Твер.,
Вят.), Цикорія желтая (Тамб.), Цихорій полевой, Цикорій рус-
скій и ошиб. Викорія (Яросл.). Цвѣточникъ, Шалочка—дунуть
пѣшка. Многолѣтнее травянистое растение изъ семейства
«сложноцвѣтныхъ» (*Compositae* Adans), весьма обыкновенное
въ Европѣ и въ Россіи. Корневище вертикальное, толстое;



листья, верхняя часть цвѣточнаго стебля и основаніе обертки обыкновенно слегка паутинистые. Листья, собранные прикорневою розеткою, ланцетные, суженные къ основанію, перисто-раздѣльные или надрѣзанные, рѣже крупно-зубчатые или пильнокрайніе. Полая цвѣточная стрѣлка несетъ всего одну крупную золотисто-желтую корзинку, снабженную цилиндрической или колокольчатой оберткой, состоящей изъ наружныхъ линейно-ланцетныхъ, отвороченныхъ листочковъ и внутреннихъ, почти одинаковыхъ, вверхъ стоящихъ, расположенныхъ въ одинъ и послѣ созрѣванія сѣмянокъ отвороченныхъ. Цвѣтоложе голое. Всѣ цвѣты язычковые. Тычинокъ 5; листки ихъ сжаты въ трубочку, черезъ которую проходитъ столбикъ съ 2-храздѣльнымъ рыльцемъ. Завязь нижняя, одногнѣздная, односѣмянная. Плодъ—сѣмянки съ длиннымъ тонкимъ носикомъ, несущимъ хохолокъ. Цвѣтетъ весною. Растетъ на лугахъ, поляхъ, около дорогъ и въ рощахъ. Молодые листья употребляются въ пищу, какъ салатъ. (Табл. XXXIII, фиг. 185.).

МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНІЕ. Одуванчику древними врачами приписывалось свойство очищать кровь и устранять запоры. Въ настоящее время врачами экстрактъ и корень одуванчика прописываются только, какъ средство для составленія пилульной массы, хотя нѣкоторые врачи рекомендуютъ жидкій экстрактъ одуванчика при геморроидальныхъ разстройствахъ по чайной ложкѣ 2 раза въ день. Какъ горькое вещество, одуванчикъ вообще полезенъ при плохомъ пищевареніи, въ особенности при диспепсисѣ, а также при болѣзняхъ печени. Болѣзни печени сопровождаются катаррами дыхательныхъ путей и нерѣдко кровохарканіями. Улучшая кровообращеніе въ брюшной полости, одуванчикъ помогать и отъ кровохарканія, почему ему было ошибочно приписано свойство вылечивать легочныя кровотеченія отъ чахотки.

Въ народной медицинѣ употребленіе одуванчика очень распространено. Въ Калужской губерніи его пьютъ ввидѣ декокта отъ каменной болѣзни, въ Псковской вмѣсто слабительнаго, въ Екатеринославской—отъ боли въ животѣ, въ Вологодской губ. крестьянскія повитухи даютъ его при мучительныхъ родахъ. Въ Таврической губерніи траву одуванчика курятъ, какъ табакъ, отъ кашля.

Свѣже выжатый сокъ одуванчика употребляется для весенняго леченія соками растений; свѣжіе листья его идутъ въ салатъ, а корни составляютъ суррогатъ кофе.

Одуванчики, см. Одуванчикъ лекарственный (*Taraxacum Dens Leonis* Desf.).

Одуванчики, см. Сушеница лѣсная (*Gnaphalium silvaticum* L.).

Одуй-плѣшь, см. Одуванчикъ лекарственный (*Taraxacum Dens Leonis* Desf.).

Одурникъ, см. Белладонна (*Atropa Belladonna* L.).

Одурь, см. Азалея желтая (*Azalea pontica* L.).

Одурь, см. Чернокорень обыкновенный (*Synoglossum officinale* L.).

- Одурь болотная, см. Багульник болотный (*Ledum palustre* L.).
 Одурь кавказская, см. Азалея желтая (*Azalea pontica* L.).
 Одурь сонная, см. Белладонна (*Atropa Belladonna* L.).
 Одурь сонная, см. Вишня жидовская (*Physalis Alkekengi* L.).
 Одурь-трава, см. Дурманъ вонючій (*Datura Stramonium* L.).
 Одышная трава, см. Букашникъ горный (*Jasione montana* L.).
 Одышная трава, см. Короставникъ полевой (*Scabiosa arvensis* L.).
 Одышная трава, см. Скабіоза желтая (*Scabiosa succisa* L.).
 Одхасникъ, см. Купена лекарственная (*Convallaria Polygonatum* L.).
 Одхасникъ, см. Валеріана лекарственная (*Valeriana officinalis* L.).
 Одхасникъ, см. Дубровка (*Veronica Chamaedrys* L.).
 Ожевникъ, см. Сабельникъ болотный (*Comarum palustre* L.).
 Ожига, см. Колосокъ пахучій (*Anthoxanthum odoratum* L.).
 Ожика волосистая (*Luzula pilosa* Willd.). Тёсная трава (Гродн.), Пласка (Гродн.), Пыринъ (Могил.), Сороковежная (Костр.), Язычки (Могил.), Ячменникъ (Могил.). Многолѣтнее травянистое растеніе изъ семейства «ситниковыхъ» (*Juncaceae* Bartl.), образующее дерновины, распространенное во всей Европѣ и Россіи. Стебель прямостоящій, выш. $3\frac{1}{2}$ —7 вершковъ. Листья плоскіе, широко-линейные, по краямъ съ длинными бѣловатыми волосками. Каждая вѣточка зонтикообразной метелки неситъ только по одному цвѣтку. Цвѣтоножки послѣ цвѣтенія поникшія. Околоцвѣтникъ 6-тилистный, съ ланцетовидными, заостренными бурыми, по краямъ бѣловатыми, листочками. Тычинокъ 6; столбикъ съ 3-мя нитевидными рыльцами. Коробочка одногнздная, раскрывающаяся 3-мя створками и съ 3-мя семенами. Цвѣтетъ рано весною. Растетъ между кустарниками и въ лѣсахъ. (Рис. 197.)
 Ожика полезая (*Luzula campestris* Dc.). Болотная трава (Волын.), Булавочникъ (Волог.), Ожика, Ситникъ, Кукушкины слезки (Сл. ц.). Многолѣтнее травянистое растеніе выш. $2\frac{1}{2}$ —14 вершк., изъ семейства «ситниковыхъ» (*Juncaceae* Bartl.), распространенное почти во всей Россіи и въ Европѣ. Походить на предыдущій видъ (см. описаніе выше: «Ожика волосистая»), но каждое соцвѣтіе неситъ по 6—8 цвѣтковъ, собранныхъ яйцевидною головкою. Цвѣтетъ весною. Растетъ на лугахъ и холмахъ.
 Ожина, см. Ежевика (*Rubus fruticosus* L.).
 Ожина, см. Куманика (*Rubus caesius* L.).
 Ожинка трава, см. Дубровникъ обыкновенный (*Teucrium Chamaedrys* L.).
 Ожинникъ, см. Гравилатъ водяной (*Geum rivale* L.).
 Ожинникъ, см. Куманика (*Rubus caesius* L.).
 Ожинникъ } см. Ежевика (*Rubus fruticosus* L.).
 Ожына }
 Озимница, см. Иппеница обыкновенная (*Triticum vulgare* L.).
 Озрага, см. Ежа сборная (*Dactylis glomerata* L.).

- Окладникъ**, см. Яснотка пестрая (*Lamium maculatum* L.).
Окладникъ, см. Чина черная (*Orobis niger* L.).
Окладникъ, см. Вероника лекарственная (*Veronica officinalis* L.).
Око воловьё, см. Пушавка красильная (*Anthemis tinctoria* L.).
Око воловьё, см. Астра дикая (*Aster Amellus* L.).
Око воробьино, см. Пастушья сумка (*Capsella Bursa Pastoris* Moench.).
Око воронье, см. Вороний глазъ (*Paris quadrifolia* L.).
Око козине, см. Клеверъ луговой (*Trifolium pratense* L.).
Окопникъ, см. Окопникъ лекарственный (*Symphytum officinale* L.).

Окопникъ лекарственный (*Symphytum officinale* L.). Фармацевтическое название: *Symphytum* s. *Consolida major* (Herba, Radix et Flores). Адамова голова (Костр.), Бурачникъ (Могил.), Бѣлопузникъ (Вор.), Визъ-трава, Викъ-трава, Виль-трава, Вислоухъ (Орл.), Гавясъ (Екат.), Група (Тул.), Живокость, Живикость (въ большей части Россіи), Живокисть, Живокисть (Малор.), Живокисть (Малор.), Живокисть водяной (Бѣлор.), Живокесень, Живостокъ, Правокость (Малор.), Жилонникъ (Хар.), Жилокость (Полт.), Жирный корень, Корень сальный, Сальникъ, Сальница аптекарская, Костоломъ (Полт.), Красъ розовый, Лодышникъ (Полт.), Лошаково ухо, Огуречная трава, Окопникъ (Двин. и друг.), Просыная волоть, Разстрѣлъ (Ряз.), Свербигузъ (Тул.), Сломивнать, Языкъ воловьій (Малор.). Многолѣтнее жестко-шершавое травянистое растеніе, выш. 7—22½ вершк., изъ семейства «бурарачниковыхъ» (*Boraginaceae* Juss.), распространенное почти по всей Европѣ и во всей Европейской Россіи. Корневище короткое, съ толстымъ вѣтвистымъ почти чернымъ корнемъ; стебель вѣтвистый, гранистый и наверху крылатый отъ низбогающихъ листьевъ. Нижніе листья яйцевидно-ланцетные, черешковые, верхніе—ланцетные, сидячіе, низбогающіе на стебель. Грязно-фиолетовыя или бѣловатыя цвѣты въ завиткахъ на концахъ цвѣтоносовъ. Чашечка глубоко-5-тираздѣльная, съ ланцетными заостренными долями; вѣнчикъ трубчато-колокольчатый, въ зѣвѣ съ 5-ю ланцетовидными сходящимися чешуйками и съ 3-угольными отогнутыми зубцами. Тычинокъ 5; завязь верхняя 4-хгнѣздная, 4-хлепастая; столбикъ съ 2-храздѣльнымъ рыльцемъ. Плодъ сухой, распадающійся по созрѣваніи на 4 яйцевидно-трехгранныхъ черныхъ и блестящихъ орѣшка. Цвѣтетъ съ мая до осени. Растетъ на влажныхъ мѣстахъ, по канавамъ, по берегамъ рѣкъ и на лугахъ. Причисляется къ числу медоносныхъ растеній. (Табл. XXXIII, фиг. 186.)

МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНІЕ. Въ прежнее время корень растенія употреблялся врачами видѣ припарокъ къ переломамъ костей, въ настоящее время врачами не употребляется. Корни окопника вырываются осенью, очищаются отъ земли и сушатся. Они почти безъ запаха и содержатъ въ себѣ большое количество слизистаго вещества. Въ народѣ слизистый отваръ корня принимаютъ отъ

поносовъ, настанваютъ на винѣ и пьютъ отъ боли въ груди: при позовомъ кровотеченіи втягиваютъ мелко истолченный порошокъ корня въ носъ. Слизистымъ отваромъ этого корня обрабатываютъ верблюжью шерсть для выработки тканей. Также имъ смачиваютъ кожу на заводахъ.

Въ ветеринарной медицинѣ отваръ корня полезенъ при болезненномъ мочеиспусканіи съ появленіемъ крови въ мочѣ и при началѣ остраго разстройства кишечника, сопровождающагося поносомъ и болями въ животѣ. Лошадямъ и рогатому скоту даютъ отъ 1—2 унцъ (30,0—60,0 грам.) корня, свиньямъ, козамъ, и овцамъ $\frac{1}{2}$ —1 унца (15,0—30,0), кошкамъ и собакамъ—отъ 1 драхмы до 4-хъ драхмъ (2—4 грм.) каждый часъ; если заболѣванія не очень рѣзкія и острые, то рѣже. Даютъ корень въ отварѣ: 1 часть корня разводятъ 10—15 частями воды, кипятятъ, пока не останется половина. Часто прибавляютъ въ отваръ другихъ веществъ, напр., ромашки; если поносъ очень сильный, прибавляютъ немного опія. Животныя охотно пьютъ отваръ. При кровотеченияхъ изъ мелкихъ сосудовъ посыпаютъ кровоточащее мѣсто порошкомъ корня, который образуетъ корку, защищающую рану отъ попаданія въ нее грязи. Также корень идетъ, какъ связывающее и почти индифферентное средство, для приготовленія кашекъ и пилуль съ другими болѣе сильно дѣйствующими веществами.

Въ ветеринарной гомеопатіи спиртную настойку корня разводятъ въ водѣ и прикладываютъ на переломы костей, ушибы ихъ, на боли въ области кости въслѣдствіе воспаленія въ нихъ надкостницы, также на болящіе сухожилья и суставы. Чистою настоею втираютъ конечности при замѣчаемой у животныихъ слабости въ ногахъ.

Окрипъ }
Окрипъ } см. Укропъ огородный (*Anethum graveolens* L.).
Окропъ }

Оксамитъ, см. Голубки обыкновенные (*Aquilegia vulgaris* L.).

Оксамитъ, см. Бархатцы (*Tagetes patula* L.).

Оладошникъ, см. Короставникъ полевой (*Scabiosa arvensis* L.).

Олеандръ (*Nerium Oleander* L.). Фармацевтическое назв.: *Oleander s. Nerium, s. Rosago (Folia)*. Лавророза, Леандръ, Плоховецъ, Полоховецъ, Пугало, Пуховникъ. Дерево, достигающее 2 $\frac{1}{2}$ саж. выш., изъ семейства «кутровыхъ» (*Apocynaceae*), родомъ изъ средиземно-морской области, съ ланцетными дѣльными листьями и съ крупными красными розовыми и бѣлыми цвѣтами, ради которыхъ часто разводятъ въ комнатахъ, садахъ и оранжереяхъ. Кора и древесина употребляются около Ниццы для истребленія мышей, а въ южной Франціи—для истребленія навозныхъ мухъ. Растеніе также обладаетъ свойствомъ очищать мутную воду.

Медицинское употребленіе. Листья олеандра имѣютъ горькій вкусъ и дѣйствуютъ наркотически-ядовито; такъ-же дѣйствуютъ и прочія части растенія. Врачами растеніе совсѣмъ не употребляется. Въ народѣ листья и кора служатъ для обмыванія при хрониче-

скихъ сыпяхъ. Порошокъ листьевъ производитъ чиханіе. Водный настой листьевъ или спиртную настойку олеандра употребляютъ еще для втиранія отъ хроническихкихъ сыпей.

Въ гомеопатіи спиртная настойка олеандра готовится весною изъ молодыхъ листьевъ при началѣ цвѣтенія и дается при болѣзненной слабости, усталости, безсонницѣ, дурномъ расположеніи духа, разбѣянности, слабой памяти, сыпи на головѣ, перхоти на головѣ, мокнущей сыпи за ушами, при жаждѣ и потерѣ аппетита и сердцебиеніи. Даютъ отъ 1—2 капель чистой настойки—въ особенности при параличахъ, или 1, 2, 3-го разведенія 1—2 раза въ день или чаще, смотря по силѣ заболѣванія.

Олений корень, см. Пушпырникъ обыкновенный (*Torilis Anthriscum* Gärtn.).

Олений мохъ, см. Мохъ олений (*Cladonia rangiferina* Hoffm.).

Олень-корень меньшій, см. Ясенецъ бѣлый (*Dietamnus Fraxinella* Pers.).

Оленье ухо, см. Медвѣжье ухо (*Verbascum Thapsus* L.).

Оленья трава, см. Авранъ лекарственный (*Gratiola officinalis* L.).

Олехъ, см. Ольха черная (*Alnus glutinosa* Lam.).

Олехъ, см. Ольха бѣлая (*Alnus incana* De.).

Олешина, см. Ольха черная (*Alnus glutinosa* Lam.).

Олешина, см. Ольха бѣлая (*Alnus incana* De.).

Олешникъ, см. Ольха черная (*Alnus glutinosa* Lam.).

Олешникъ, см. Ольха бѣлая (*Alnus incana* De.).

Олешникъ-трава, см. Горичникъ болотный (*Peucedanum palustre* Moench.).

Олива, см. Оливковое дерево (*Olea Europaea* L.).

Олива, см. Лохъ (*Elaeagnus hortensis* M. B.).

Оливковое дерево (*Olea europaea* L.). Маслина обыкновенная, Масличіе (Славян.), Масличина, Маслина и много другихъ, Олива. Вѣчно-зеленый кустарникъ или дерево, выш. въ нѣсколько саженъ, изъ семейства «масличныхъ» (*Oleaceae* Lindl.), родомъ изъ западной Азіи. Листья ланцетные, вверху темно-зеленые, снизу покрытые чешуйками, бѣловатые. Цвѣты мелкіе, желтовато-бѣлые, душистые, въ пазушныхъ кистяхъ. Плодъ—шаровидный или продолговатый костяникъ, свѣтло-зеленый или почти черныя, съ зеленовато-бѣлою мякотью. Дерево воздѣлывается въ Европѣ въ продолженіе многихъ столѣтій; у насъ разводится преимущественно на Кавказѣ и по берегамъ Чернаго моря, гдѣ встрѣчается въ одичаломъ состояніи, и въ маломъ количествѣ въ Крыму. Незрѣлые плоды заготавливаются впрокъ, зрѣлыя же служатъ для добыванія оливковаго, или деревяннаго масла, составляющаго важный предметъ торговли, лучшаго качества масло, такъ называемое прованское, привозится изъ южной Франціи и Италіи. (Табл. XXXV, фиг. 192.)

МЕДИЦИННОЕ УПОТРЕБЛЕНІЕ. Прованское масло употребляется въ обширномъ количествѣ въ пищу, идетъ на заготовленіе все-

возможных консервовъ, употребляется также и въ медицинѣ. Оно служитъ для приготовленія различныхъ мазей и пластырей принимается также и внутрь.

Внутри прованское масло даютъ, какъ легкое слабительное средство, подобно миндальному, при воспалительномъ состояннн слизистой оболочки желудочно-кишечнаго канала, при свинцовой коликѣ, при отравленнн ѣдыми веществами. Кроме того, прованское масло служитъ для клистировъ. Его или прибавляютъ 3—4 столовыхъ ложки въ отварную воду или въ отваръ ромашки, или же подогрѣваютъ и дѣлаютъ клизму изъ чистаго прованскаго масла, употребляя для этого отъ $\frac{1}{2}$ до 1 фунта. Такой масляный клистиръ ставится на ночь. Больной старается удержать масло до утра. Утромъ у него является обильный безообъзненный стулъ съ отдѣленіемъ большого количества слизи и газовъ; послѣ такой клизмы чувствуется большое облегченіе. Врачи особенно охотно рекомендуютъ такіе клистиры людямъ, страдающимъ желчными камнями, а также людямъ, страдающимъ хроническимъ катарромъ толстыхъ кишекъ.

Прованское, или деревянное масло, смѣшанное съ полынью, помогаетъ уничтоженію клоповъ. При ожогахъ прованское масло успокаиваетъ боль въ кожѣ. Отъ кашля прованское масло смѣшиваютъ съ яичнымъ желткомъ и съ сахаромъ и принимаютъ смѣсь утромъ и вечеромъ по 2 чайныхъ ложки.

Рекомендуется слѣдующій простой способъ изгнанія ленточнаго глиста при помощи прованскаго масла: человекъ, страдающій глистою, три дня питается скудной пищею, состоящею изъ мясного супа съ греночками бллага хлѣба; онъ долженъ ѣсть по возможности меньше, чтобы только-только успокоить чувство голода. На четвертое утро натощакъ онъ выпиваетъ 3 столовые ложки самаго чистаго прованскаго масла и минутъ черезъ 10 ставитъ себѣ клистиръ изъ теплаго варенаго молока. При позывѣ на низъ больной садится на горшокъ, въ которомъ налита теплая вода или молоко. Глистъ показывается и выходитъ весь съ головой.

Въ ветеринарной медицинѣ прованское масло также употребляется довольно часто. Его даютъ лошадямъ въ соединеннн съ слизистыми жидкостями при боляхъ въ животѣ, при отрывкѣ; собакамъ—отъ сухого кашля (отъ половины до цѣлой столовой ложки). Овцамъ и козамъ даютъ по небольшой столовой ложкѣ масла два раза въ день при воспаленнн десенъ, заботясь одновременно и о хорошемъ для нихъ кормѣ. Животнымъ, страдающимъ гнойной течею изъ ушей, кладутъ на ватъ нѣсколько капель прованскаго масла въ наружный слуховой проходъ. Прованскимъ масломъ смазываютъ животнымъ зудящіеся мѣста на кожѣ, а также для успокоенія чувства боли отъ укусовъ насѣкомыми и ужаленія ужа.

Смола, вытекающая изъ старыхъ вѣтвей оливковаго дерева, имѣетъ запахъ, похожій на ваниль, и во всей Италіи служитъ средствомъ для окуриванія помѣщеній. Кроме употребленія въ пищу и въ медицинѣ, оливковое дерево и его масло находятъ

себѣ обширное примѣненіе въ различныхъ фабричныхъ производствахъ. Масло употребляется при выдѣлкѣ мыла, масляныхъ и типографскихъ красокъ. Ольшковое дерево хорошо полируется, имѣетъ очень красивый видъ: именно, зелено-желтый фонъ съ черными пятнами и жилками, изъ него вырабатываются мелкія дорогія столярныя вещи.

Олія, см. Анютины глазки (*Viola tricolor* L.).

Ольха, см. Ольха бѣлая (*Alnus incana* Dc.).

Ольха, см. Ольха черная (*Alnus glutinosa* L.).

Ольха бѣлая (*Alnus incana* Dc.). Алехъ, Вільха (Малор.), Вилха, Вильха, Вольха, Елоха (Костр., Нижегород.), Елха (Вятск., Влад.), Елшина (Новг., Пск.), Лешина, Лешинникъ, Лешинина, Лешинягъ (Пск.), Олешина, Олешникъ (Вол. Росс.), Олынина (Новг., Пск.), Олышинникъ (Пск., Твер.), Олехъ, Олынякъ (Вор., Орл.). Кустарникъ или дерево изъ семейства «березовыхъ» (*Betulaceae* A. Br.), съ гладкою свѣтло-сѣрою корою и болѣе или менѣе пушистыми молодыми побѣгами. Листья очерченные, черешковые, яйцевидные, острые по краямъ, съ двойными пильчатыми зазубринами, снизу пушистые по всей поверхности или только вдоль жилокъ. Цвѣтки однополые, однодомные. Тычиночные, или мужскіе цвѣтки собраны сережками, состоящими изъ спирально-расположенныхъ на стержнѣ чешуекъ (прицвѣтничковъ), въ узлахъ которыхъ сидятъ по 3 цвѣтка. Пестичные или женскіе цвѣты—въ короткихъ, почти сидячихъ сережкахъ. Околоцвѣтникъ тычиночныхъ цвѣтовъ 4-храздѣльный, тычинокъ 4; околоцвѣтникъ женскихъ цвѣтовъ незамѣтный, завязь нижняя 2-хгнѣздная; рылецъ 2, нитевидныхъ, краснаго цвѣта. Во время плодовозрѣванія чешуйки пестичныхъ сережекъ разрастаются, становятся деревянистыми, вслѣдствіе чего получается соплодіе въвидѣ небольшой шишки. Плодъ—сухой односемянный орѣшекъ. Цвѣтетъ рано весною, до появленія листьевъ. Растетъ бѣлая ольха въ сѣверной и средней Европѣ, встрѣчается въ лѣсахъ въ сѣверной и средней Россіи, въ Малороссіи, на Кавказѣ и въ Сибири. Легкая древесина ея употребляется въ столярномъ и токарномъ производствахъ, но преимущественно идетъ на подводныя постройки, такъ какъ въ водѣ она очень прочна.

МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНІЕ. Въ народной медицинѣ употребляютъ ольховыя листья, кору и шишечки. Ольховыя листья имѣютъ слегка смолистый запахъ и клейкій горьковатый вкусъ; вкусъ коры горькій, вяжущій; ольховыя сѣмена не имѣютъ ни запаха, ни вкуса. Ольховыя листья крестьяне употребляютъ такъ-же, какъ березовыя, для того, чтобы вызвать у больныхъ потъ, для чего на постель больнымъ кладутъ свѣжіе ольховыя листья и такими-же листьями ихъ покрываютъ; листья берутъ теплые, согрѣтые въ печи или согрѣтые солнечными лучами. Больной обильно потѣетъ, и этотъ способъ лѣченія приноситъ большую пользу людямъ, страдающимъ простудою, ревматизмомъ въ суставахъ, подагрой, а также отъ застарѣлаго сифилиса.

Люди, принужденные дѣлать большіе переходы пѣшкомъ,

ставятъ передъ сномъ не надолго ноги въ ольховый отваръ, отчего боль въ ногахъ становится меньше. Изъ ольховой коры и шишекъ готовятъ отваръ, который, какъ вяжущее средство, помогаетъ отъ боли въ горлѣ; его употребляютъ ввидѣ поло-
скашя. Отваръ ольховой коры крестьяне пьютъ отъ перемежаю-
щейся лихорадки. Овцы и свиньи охотно питаются свѣжимъ зе-
ленымъ ольховымъ листомъ. Ольховыми сѣменами питаются птицы.
Ольха черная, или клейкая (*Alnus glutinosa* L.). Алѣхъ
(Вор.), Вилха, Вильха, Вільха (Малор.), Вольха, Елоха (Костр.,
Нижег.), Елха (Вятск., Влад.), Елшина (Новг., Пск.), Лешина,
Лешинина, Лешинникъ, Лешиннягъ (Пск.), Олешина, Олешникъ
(Вел. Росс.), Ольшина (Новг., Пск.), Ольшинникъ (Пск., Твер.),
Олехъ, Ольшнякъ (Вор., Орл.). Дерево, достигающее нѣсколь-
кихъ саженъ выш., изъ семейства «березовыхъ» (*Betulaceae* A.
Br.), распространенное почти во всей Европѣ, во всей Россіи,
за исключеніемъ крайняго сѣвера, и на Кавказѣ. Кора темно-
бурая съ трещинами; побѣги клейкіе; листья очередные, че-
решковыя, обратно-ланцетовидныя или почти круглыя, на вер-
хушкѣ тупыя или выемчатые, по краямъ неравно-пильчатые;
голыя, сверху клейкіе, снизу въ углахъ жилкозъ пушистыя.
Цвѣтки однополые и однодомныя. Мужскіе и женскіе цвѣты
собраны въ сережки, состоящія изъ спирально-расположен-
ныхъ на стержнѣ чешуекъ (прицвѣтничковъ), въ углахъ кото-
рыхъ помѣщаются цвѣтки; помѣщаются тычиночныя и пестич-
ныя сережки на однихъ и тѣхъ-же побѣгахъ и зимуютъ совер-
шенно открыто. Околоцвѣтничъ тычиночныхъ—мужскихъ—цвѣ-
товъ 4-храздѣльный; тычинокъ 4; околоцвѣтничъ женскій почти
незамѣтенъ; завязь нижняя 2-хгнѣздная; рылецъ 2, нитевид-
ныхъ, краснаго цвѣта. Во время плодоодрѣванія чешуйки пестич-
ныхъ цвѣтовъ разрастаются, становятся деревянистыми,
вслѣдствіе чего получается соплодіе ввидѣ небольшой шишки.
Плодъ—сухой односѣмянный орѣшекъ. Цвѣтетъ рано весною
до облиственія. Произрастаетъ на сырыхъ мѣстахъ и по бере-
гамъ рѣкъ. Легкая и красноватая древесина ольхи употреб-
ляется въ столярномъ и токарномъ дѣлѣ, преимущественно
идеть на подводныя постройки, такъ какъ въ водѣ она очень
прочна. (Таб. XXXIII, фиг. 184.)

Ольшина, см. Ольха бѣлая (*Alnus incana* Dc.).

Ольшина, см. Ольха черная (*Alnus glutinosa* L.).

Ольшинникъ, см. Ольха бѣлая (*Alnus incana* Dc.).

Ольшинникъ } см. Ольха черная (*Alnus glutinosa* L.).

Ольшнякъ }

Ольшнякъ, см. Ольха бѣлая (*Alnus incana* Dc.).

Оманъ, см. Девясилъ подсолнечный (*Inula Helenium* L.).

Оманъ, см. Коровякъ черный (*Verbascum nigrum* L.).

Оманъ болотный, см. Вербейникъ обыкновенный (*Lysimachia vulgaris* L.).

Омега малая, см. Петрушка собачья (*Aethusa Cynapium* L.).

Омега полевая, см. Рѣзакъ степной (*Falcaria Rivini* Host.).

- Омегъ, см. Борецъ синий (*Aconitum Napellus* L.).
 Омегъ, см. Борецъ желтый (*Aconitum Lycostonum* L.).
 Омегъ, см. Болиголовъ (*Conium maculatum* L.).
 Омегъ, см. Горичникъ болотный (*Peucedanum palustre* L.).
 Омегъ большой, см. Болиголовъ (*Conium maculatum* L.).
 Омегъ водяной, см. Вехъ ядовитый (*Cicuta virosa* L.).
 Омегъ водяной } см. Укропъ конскій (*Oenanthe Phelland-*
 Омегъ малый, } *rium* L.).
 Омегъ ядовитый, см. Вехъ ядовитый (*Cicuta virosa* L.).
 Омегъ, см. Болиголовъ (*Conium maculatum* L.).
 Омежная трава, см. Вехъ ядовитый (*Cicuta virosa* L.).
 Омежная трава, см. Кульбаба осенняя (*Leontodon autom-*
nalis L.).
 Омела }
 Омела вербовая } см. Омела обыкновенная (*Viscum album* L.).
 Омела обыкновенная (*Viscum album* L.). Армянка (русск. за
 Кавк.), Вихорево гнѣздо, Дубянка (Лянц.), Дубовая ягодка,
 Ивилга (Полтав.), Птичій клей, Омела, Омела вербовая, Омѣла
 (Малор.), и изм. Амела, Вимела (Подол.), Емела (Екат.), Имела
 (Кіев. г., Радом.), Умела (Малор.), Мѣла дубовая, Присноцвѣ-
 тущая трава, Шулга (Малор.). Голый желтовато-зеленый
 кустарникъ изъ семейства «ремнецвѣтниковыхъ» (*Loganthaceae*
 Don.), живущій или, вѣрнѣе, паразитирующій на многихъ де-
 ревяхъ: яблонѣ, грушѣ, тополѣ, липѣ, березѣ, соснѣ, пихтѣ и
 другихъ, распространенный въ средней и южной Европѣ,
 встрѣчающійся въ привислянскомъ краѣ, въ юго-западныхъ
 губерніяхъ, въ Крыму и на Кавказѣ. Стебель вилкообразный,
 выш. 7—12½ вершковъ. Листья продолговатые, тупые, тол-
 стые, цѣльнокрайніе, кожистые, мясистые. Зеленоватые цвѣты
 сидятъ по 5—6 въ развилкахъ стебля. Цвѣтки однополые,
 двудомные. Мужскіе, или тычиночные, съ 4-храздѣльнымъ вѣн-
 чикомъ и столькими-же пыльниками, приросшими къ долямъ
 вѣнчика и раскрывающимися многими отверстіями. Женскіе
 цвѣты съ мало-замѣтною 4-хзубчатою чашечкою и 4 лепестками,
 имѣющими видъ мясистыхъ чешуекъ. Завязь нижняя, съ сидя-
 чимъ рыльцемъ. Плодъ—шаровидныя бѣлыя ягоды, односѣмян-
 ныя, съ клейкою мякотью. Цвѣтетъ рано весною. Разселеніе
 омелы—паразита, производится, главнымъ образомъ, дроздами,
 которые поѣдаютъ ягоды и выдѣляютъ затѣмъ сѣмена непереваренными
 или при чисткѣ клюва оставляютъ на вѣтвяхъ
 представшія къ нему сѣмена. (Табл. XXXIV, фиг. 188.)

МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНІЕ. Растеніе это считалось священ-
 нымъ у германцевъ и древними врачами давалось довольно часто
 отъ эпилепсіи, коликъ и страданій легкихъ, теперь средство это
 врачами не употребляется, изрѣдка только въ народной медицинѣ
 внутрь также отъ эпилепсіи и коликъ, снаружи для смягченія
 нарывовъ. Внутрь принимаютъ омелу въ отварѣ вмѣстѣ съ вале-
 риановымъ корнемъ; берутъ 2 драхмы омелы и столько-же вале-
 рианы, заливаютъ стаканомъ кипятка, даютъ разъ вскипеть, про-

пѣживаютъ, студить и пьютъ черезъ 2 часа по столовой ложкѣ. Изъ омелы готовятъ слѣдующую мазь: 3 части омелы смѣшиваютъ съ двумя частями свѣжаго свиного сала и варятъ $1\frac{1}{2}$ часа, процеживаютъ сквозь тряпочку, прибавляютъ 8 драхмъ (1,5 грм.) воска и 2 драхмы камфоры. Этою мазью натираютъ больные суставы и закрываютъ ихъ нагрѣтыми полотенцами.

Омень, см. Деясиль подсолнечный (*Inula Helenium* L.).

Омерникъ, см. Вехъ ядовитый (*Cicuta virosa* L.).

Омонъ, см. Чертополохъ разнолистный (*Cirsium heterophyllum* All.).

Онагрикъ } см. Ослинникъ двулѣтній (*Oenothera biennis* L.).

Онагрина трава }

Оникъ, см. Борецъ желтый (*Aconitum Lycoctonum* L.).

Опенка осиновая } см. Опенокъ (*Agaricus melleus* Vahl.).

Опенки

Опенокъ (*Agaricus melleus* Vahl.). Опенка осиновая, Опяты, Опенокъ настоящий, Апенокъ, Апенокъ березовый, Опенки, Осеникъ. Грибъ изъ семейства «гименомицетовъ» — шляпныхъ грибовъ (*Hymenomycetes*), съ плоской шляпкой, по срединѣ съ выпуклостью, по краямъ полосатою, свѣтло-буро-желтаго цвѣта, усыпанной темно-бурыми волосатыми чешуйками. Пенекъ желтоватый, пленчатое кольцо бѣловатое; пластинки, расположенныя лучеобразно на нижней поверхности шляпки и по бокамъ которыхъ находится спороносный слой, сначала бѣлые, потомъ буроватые. Растетъ группами на корняхъ и на стволахъ хвойныхъ деревьевъ подъ корой которыхъ гнѣздится его мицелій, то есть, корневая система гриба. Какъ паразитъ, вреденъ для деревьевъ. Употребляется въ пищу. (Табл. XXXIV, фиг. 189.)

Опенокъ настоящий, см. Опенокъ (*Agaricus melleus* Vahl.).

Опестышъ, см. Хвощъ полевой (*Equisetum arvense* L.).

Опорѣзная, см. Тысячелистникъ обыкновенный (*Achillea millefolium* L.).

Опуховая трава, см. Мелколепестникъ ѣдкій (*Erigeron acris* L.).

Опуховая трава, см. Будра плющевидная (*Glechoma hederacea* L.).

Опуховая трава, см. Клеверъ нашенный, или кошачій (*Trifolium arvense* L.).

Опуховая трава, см. Коровякъ черный (*Verbascum nigrum* L.).

Опухольная, см. Подорожникъ средній (*Plantago media* L.).

Опуцки, см. Первоцвѣтъ лекарственный (*Primula officinalis* L.).

Опуцки, см. Пузырникъ обыкновенный (*Torilis Anthriscus* Gärtn.).

Опучай, см. Язвенникъ обыкновенный (*Anthyllis Vulneraria* L.).

Опяты, см. Опенокъ (*Agaricus melleus* Vahl.).

Оргишъ, см. Ячмень обыкновенный (*Hordeum vulgare* L.).

Ордовиѣ } см. Гордовина (*Viburnum Lantana* L.).

Ордына }

Орепей дылчій } см. Реняшокъ обыкновенный (*Agrimonia*

Орепей цѣпкій } *Eupatorium* L.).

Оржанецъ, см. Лисохвостъ колѣчат. (*Alopecurus geniculatus* L.).

Оржанецъ, см. Тимофеевка (*Phleum pratense* L.).

Оржанецъ, см. Пырей ползучій (*Triticum repens* L.).

Орихъ

Оришина } см. Орѣхъ лѣсной (*Corylus Avellana* L.).

Оришына }

Орихъ волосѣйскій, см. Орѣхъ грецкій (*Juglans regia* L.).

Оришина }

Оришникъ } см. Орѣхъ лѣсной (*Corylus Avellana* L.)

Оршишъ (*Triticum monosperum* L.). Однодерникъ (Сл. Перк.), Полуполба. Однолѣтнее и двулѣтнее травянистое растеніе изъ семейства «злаковыхъ» (*Gramineae* Juss.), родомъ изъ Греціи и Мал. Азій. Стебель выш. 7—14 вершк. Колосъ сжатый съ боковъ, плотный, съ ломкимъ стержнемъ. Колоски расположены въ 2 ряда, прикрываютъ другъ-друга черепицеобразно и снабжены длинною, часто извилистою остью, выходящей изъ наружной пленки плодущаго цвѣтка. Колосковыя чешуйки, или створки, наверху, имѣютъ 2 острыхъ, прямыхъ зубца. Колоски сидятъ на выступахъ стержня поодиночкѣ и содержатъ по 3—5 цвѣтковъ, изъ которыхъ только 2 нижнихъ плодущихъ. Каждый колосокъ приноситъ только одно зерно. Цвѣтетъ лѣтомъ. Такъ какъ оршишъ на почву не требователенъ, то подѣ посѣвъ его обыкновенно отводятъ мѣста съ самою плохою почвою. Въ Россіи почти не разводится.

Орлики, см. Голубки обыкновенные (*Aquilegia vulgaris* L.).

Орлики, см. Герань луговая (*Geranium pratense* L.).

Орлики, см. Будра плющевидная (*Glechoma hederacea* L.).

Орлиное дерево, см. Алоиное дерево (*Aquilaria Agallochum* Roxb.).

Орличникъ

Орлышникъ } см. Орлякъ обыкновенный (*Pteris aquilina* L.).

Орлякъ

Орлякъ обыкновенный (*Pteris aquilina* L.). Фармацевтическое назв.: *Filix Femina* или *Pteris aquilina*. Абага (Уф.), Волчьи зубы (Пет.), Лапушка боровая (Уф.), Крыло орлиное, Орлякъ, Папоротникъ и изм. Папороть, Папороть холостая (Курск.), Папортъ (Гродн., Могил., Полт., Хар.), Паперть (Олон.), Паперать, Папарить, Папиръ (Курск.), Папороть (Твер., Вятск.), Папарыць (Мог.), Папарникъ (Сарат.), Папертникъ (Гамб.), Папиртникъ (Сарат.), Папортникъ (Нижег.), Папоротникъ еланый (въ Томск. тайгѣ), Папоротникъ водяной, Рябникъ дикій (Влад.), Рябинка синяя (Влад.), Сказанякъ, Губмора, Гвимбра (Шароп. у. Кут. губ.). Травянистый многолѣтній папоротникъ изъ семейства «полиподіевыхъ» (*Polypodiaceae* R. Br.), распространенный во всей Европѣ, въ сѣверной Азій и весьма обыкновенный во всей Россіи. Подземное корневище ползучее, длинное, вѣтвистое. Листья крупные, въ средней Европѣ и Россіи 7—28 вершк. длины, на Кавказѣ-же и вообще въ тепломъ климатѣ до 1½ сажени, на длинныхъ черешкахъ. Пластика листа въ очертаніи треугольно-яйцевидная, дважды или трижды-перисторазсѣчен-

ная. Доли вторичныхъ листочковъ сидячія, продолговатыя или ланцетныя и тупыя. Нижняя часть черешка листьевъ даетъ на поперечномъ размѣрѣ нѣкоторое подобіе двуглаваго орла, вълѣдствіе своеобразнаго расположенія сосудистыхъ пучковъ. Спорангіи, то есть, вѣстилища, гдѣ развиваются споры, органы размноженія, расположены непрерывной линіей по окружности долей листа и прикрыты завороченнымъ его краемъ. Споры отшнуровываются во второй половинѣ лѣта. Растетъ въ сухихъ лѣсахъ или сосновыхъ борахъ.

МЕДИЦИННОЕ УПОТРЕБЛЕНІЕ. Корень въ прежнѣе время употреблялся отъ глистовъ и поноса, теперь употребленіе орляка извѣстно только въ народной медицинѣ. Печеный корень употребляется въ пищу. Отъ глистовъ орлякъ употребляется или въ видѣ порошка отъ $\frac{1}{2}$ до 1 драхмы (2,0—4,0 грм.) съ медомъ или бѣлымъ виномъ утромъ и вечеромъ; дѣтямъ порошокъ дается въ молоко 20 гранъ (1,0 грм.) утромъ и вечеромъ, а на слѣдующее утро дается слабительное. Отваръ приговляется изъ 1 унціи корня на 1 фунтъ воды, уваривается онъ до 8-ми унцъ (240 грм.), процеживается. Къ процеженному отвару прибавляютъ 2 драхмы (8,0 грм.) гофманскихъ капель. Принимаютъ его утромъ и вечеромъ по чайной чашкѣ. Этотъ-же крѣпкій отваръ крестьяне пьютъ отъ застарѣлаго кашля и ломоты, имъ-же обмываютъ старыя раны. Дѣтямъ, страдающимъ золотухою и англійской болѣзною, этою травою набиваютъ подушки и дѣлаютъ покрывала, смѣшивая траву орляка съ огородными пахучими травами и цвѣтами.

Оробина, см. Рябина обыкновенная (*Sorbus Aucuparia* L.).

Оробинецъ, см. Рогоза узколистная (*Typha angustifolia* L.).

Оробинецъ, см. Рогоза широколистная (*Typha latifolia* L.).

Оробинецъ, см. Кислица обыкновенная (*Oxalis acetosella* L.).

Орѣхи, см. Орѣхъ грецкій (*Juglans regia* L.).

Орѣхи болотные, см. Орѣхи водяные (*Trapa natans* L.).

Орѣхи водяные, или чертовы (*Trapa natans* L.). Фармацевтическое названіе *Nucula aquatica* s. *Tribuli aquatici* (Semen.). Батлачикъ, Батланчукъ, Батланчукъ (Астр.), Боднакъ дикий, Котевка, Котелки (Малор.), Орѣхи болотные (Симб.), Орѣхи болотни, Орѣхи водяни (Малор.), Орѣхи каменные (Мог.), Орѣхи колкіе (Симб.), Орѣхи плавающие, Орѣхи чертовы (Сл. Ц.), Орѣхи чертовы, Капитаны водяные, Рогатки, Рогатникъ, Рогульникъ (Сл. Ц.), Рогули чертовы (Даль), Рогулешный видъ, Гульникъ, Чилига, Чилишъ. Водяное однолѣтнее травянистое растеніе изъ семейства «онагриковыхъ» (*Onagraceae* Juss.), распространенное въ средней и южной Европѣ, въ средней и южной Россіи и въ Сибири, съ тонкимъ, иногда очень длиннымъ, при основаніи ползучимъ стеблемъ. Подводные листья супротивные, линейные, быстро опадающіе; у основанія ихъ стебель выпускаетъ нѣсколько перисто-вѣтвистыхъ корней, которые прежде ошибочно принимались за подводные листья. Листья-же, плавающіе на поверхности воды, собраны у верхушки стебля густой розеткой; пластинка ихъ ромбическая, крупно-зубчатая, а чере-

шокъ по серединѣ раздуть ввидѣ пузыря (плавательный аппаратъ). Мелкіе бѣлые цвѣты сидятъ въ пазухахъ надводныхъ листьевъ. Плодъ—орѣшковидный, односѣмянный, почти чернаго цвѣта, съ 4 крупными комочками. Цвѣтетъ во второй половинѣ лѣта. Мучнистые сѣмена употребляются въ пищу (Табл. IX, фиг. 47.)

Орѣхи дикіе, см. Бадма (*Nelumbium caspicum* Fisch.).

Орѣхи земляные, см. Хвощъ полевой (*Equisetum arvense* L.).

Орѣхи земляные, см. Чина клубненосная (*Lathyrus tuberosus* L.).

Орѣхи каменные, см. Орѣхи водяные (*Trapa natans* L.).

Орѣхи кедровые, см. Кедръ сибирскій (*Pinus Cembra* L.).

Орѣхи кокосовые, см. Кокосовая пальма, или кокосовые орѣхи (*Cocos nucifera* L.).

Орѣхи колкіе, см. Орѣхи водяные (*Trapa natans* L.).

Орѣхи миндальные, см. Миндальное дерево (*Amygdalis communis* L.).

Орѣхи морскіе, см. Бадма (*Nelumbium caspicum* Fisch.).

Орѣхи персидскіе, см. Фисташковое дерево (*Pistacia vera* L.).

Орѣхи плавающие, см. Орѣхи водяные (*Trapa natans* L.).

Орѣхи чертовы, см. Орѣхи водяные (*Trapa natans* L.).

Орѣховое дерево, см. Кедръ сибирскій (*Pinus Cembra* L.).

Орѣхородка, см. Американскій земляной орѣхъ (*Arachis hypogaea* L.).

Орѣховый кустарникъ, см. Орѣхъ лѣсной (*Corylus Avellana* L.).

Орѣхъ, см. Орѣхъ грецкій (*Juglans regia* L.).

Орѣхъ, см. Орѣхъ лѣсной (*Corylus Avellana* L.).

Орѣхъ бегеновый (*Moringa pterygosperma* Gaert.). Дерево, произрастающее въ Остѣ-Индіи, съ большими двояко или тройко-перисто-разсѣченными листьями, съ длинными бобообразными плодами, заключающими крупныя сѣмена. Листья, цвѣты и незрѣлые плоды употребляются бѣднымъ классомъ населенія въ пищу, какъ овощи, изъ зеренъ-же, извѣстныхъ въ торговлѣ подъ именемъ «бегеновыхъ орѣховъ», добываютъ бегеновое масло, входящее въ составъ благовонныхъ маселъ и масловъ. Изъ ствола вытекаетъ смолистое вещество, вродѣ трагантоваго гумми. Кора, покрывающая корень дерева, напоминаетъ своимъ вкусомъ хрѣвъ, почему и употребляется въ хозяйственномъ обиходѣ подобно послѣднему.

Орѣхъ водяной, см. Орѣхи водяные (*Trapa natans* L.).

Орѣхъ воложскій, см. Орѣхъ грецкій (*Juglans regia* L.).

Орѣхъ грецкій (*Juglans regia* L.). Орѣхи (Слав.), Орѣхъ воложскій, Орѣхъ волосскій (Малор.), Горѣшина, Горишина (Мал., Стар., Банд.). Дерево изъ семейства «орѣховыхъ» (*Juglandaceae* DC.), родомъ съ Востока, встрѣчается и въ лѣсахъ Закавказья, съ корой черно-сѣрою на старыхъ, бурюю на молодыхъ вѣтвяхъ, достигающее нѣсколькихъ саженъ вышины. Листья съ сильнымъ ароматическимъ запахомъ, черешковые, непарно-перистые, о 5—9 яйцевидныхъ или продолговатыхъ листочкахъ. Цвѣты однодомные: тычиночные (мужскіе)—въ зеленоватыхъ

висящихъ сережкахъ, женскіе (пестичные)—на концахъ побѣговъ, одиночные или по 2—5. При цвѣтахъ кроющій прицвѣтникъ. Мужскіе цвѣты, приросшіе къ своему кроющему прицвѣтнику, съ 2—4-храздѣльнымъ околоцвѣтникомъ и многими тычинками, кончающимися надъ пыльниками острѣмъ; женскіе—сросшіеся нѣсколько со своими прицвѣтниками, имѣютъ 4-храздѣльный околоцвѣтникъ и нижнюю завязь, несущую 2 рыльца. Плодъ—костянка съ сѣтчато-морщинистой косточкой, облеченной тонкимъ слоемъ мякоти. Косточки извѣстны въ продажѣ подъ именемъ грецкихъ орѣховъ. Цвѣтетъ въ маѣ. Разводится на югѣ Россіи. Твердая, упругая коричнево-бурая древесина очень цѣнится въ мебельномъ, токарномъ, оружейномъ и каретномъ мастерствахъ. Плоды употребляются въ пищу и служатъ для добыванія орѣхового масла. (Рис. 198.)

МЕДИЦИННОЕ УПОТРЕБЛЕНІЕ. Древніе врачи употребляли незрѣлые плоды и листья грецкаго орѣха для леченія золотухи и желтухи. Въ настоящее время грецкій орѣхъ употребляется только въ домашней медицинѣ.

Для лекарственныхъ цѣлей орѣхи собираются до тѣхъ поръ, пока ихъ бываетъ возможно проткнуть иголкою черезъ скорлупу. Зеленая скорлупа и листья обладаютъ способностью при растираніи давать особый довольно сильный бальзамическій запахъ и имѣютъ горькій острый вкусъ, зависящій отъ присутствія въ скорлупѣ особаго вещества, которое застываетъ на воздухѣ и превращается сокъ въ темно-коричневую массу, окрашивающую въ черный цвѣтъ платье, руки и губы; цвѣтъ этотъ не сразу проходитъ. При высушиваніи шелухи вкусъ ея становится менѣ горькимъ. Составныя части растенія: горькое вещество, дубильное вещество и жирное масло. Всѣ эти вещества имѣютъ вяжущее и укрѣпляющее дѣйствіе. Незрѣлые орѣхи и скорлупа употребляются ввидѣ отвара отъ поносовъ, глистовъ, застарѣлыхъ силей, полнокровія, опухолей и сифилиса. Изъ отвара листьевъ дѣлаютъ съ усишкомъ золотушнымъ дѣтямъ ванны, или-же полощатъ ротъ отъ рыхлости десенъ и отъ жабы.

Орѣховое масло хвалятъ отъ болей при мочеиспусканіи, отъ задержки менструацій и отъ глистовъ. Снаружи имъ смазываютъ лишай и пятна на кожѣ. Выжатый сокъ изъ молодыхъ зеленыхъ орѣховъ, подслащенный медомъ, служитъ для полосканія горла отъ жабы, для смазыванія рта дѣтямъ отъ молочницы. Для приготвленія отвара берутъ зеленой корки орѣха 1 унці (30 грм.) на фунтъ воды, которую кипятятъ, пока не останется 8 унцій (240,0 грм.) жидкости. Отваръ процеживаютъ и принимаютъ внутрь столовыми ложками. Отваромъ-же обмываютъ раны и обмываютъ дѣтямъ задній проходъ отъ зуда при нахожденіи у нихъ маленькихъ круглыхъ глистовъ. Листья дѣйствуютъ слабѣе, и потому ихъ берется больше: на стаканъ горячей воды берутъ горсть листьевъ, процеживаютъ настой и пьютъ по чайной чашкѣ. Орѣховое масло дается отъ глистовъ и каменной болѣзни отъ 1 до 2—3 унцій (30,0, 60,0, 90,0 грм.). Слабыхъ стариковъ этимъ масломъ растираютъ.

Въ ветеринарной медицинѣ грецкій орѣхъ, его скорлупка и листья употребляются въ тѣхъ случаяхъ, когда необходимо дать горькое и вяжущее средство, а также какъ гниетогонное средство. Лошадямъ и рогатому скоту даютъ 2—4 унціи (60—120,0 грм.). Овцамъ 4—8 драхмъ (15 — 30,0 грм.). Собакамъ 15 гр. до 1 драхмы (1,0—4,0 грм.) 2—3 раза въ день, всего лучше въ чистомъ отварѣ. Снаружи этимъ отваромъ обмываютъ хроническія сыпи, расчесы и пещистыя язвы. Отваромъ скорлупы обмываютъ животныхъ отъ блохъ и затѣмъ, чтобы защитить ихъ отъ укусовъ насекомыхъ.

Орѣхъ лѣсной (*Corylus Avellana* L.). Лещина, Лѣщина, Липина (югъ Росс.), Лищина (деревья), Лиска (одно дерево), Леща, Лешка и изм. Лязга, Лязговина, Лястовина, Залепуина (Орл.), Орѣшникъ обыкновенный (Вел. Росс.). Орѣховый кустарникъ: Орѣшникъ, Орѣшина, Орѣшина (Малор.), Орѣшенье. Плоды: Горѣхъ, Горихъ лисковый, Варихъ, Орихъ, Орѣхъ. Довольно высокій кустарникъ выш. 1—1½ саж., съ сѣрою корой на вѣтвяхъ, изъ семейства «березовыхъ» (*Betulaceae* A. Br.), распространенный по всей Европѣ и почти во всей Европейской Россіи, за исключеніемъ крайняго сѣвера. Молодыя вѣтви железисто-черешковыя, двояко-цилчатые, снизу пушистыя. Цвѣты однодомные; мужскіе, или тычиночныя, — въ цилиндрическихъ густыхъ сережкахъ, одиночныя, въ углахъ кроющихъ чешуй и снабженные 2-мя предлистьями; тычинокъ по 4, раздвоенныхъ, приросшихъ къ кроющей чешуѣ. Пестичныя—женскія—соцвѣтія видѣ листо-выхъ почекъ. Околоцвѣтникъ незамѣтный, завязь нижняя, 2-хлѣздная; рылецъ 2, нитевидныхъ, краснаго цвѣта; послѣдствіи женскія соцвѣтія разрастаются въ коронную вѣточку, несущую нѣсколько листьевъ и на концѣ 1—4 орѣха. Плодъ—орѣхъ, сидящій въ колокольчатой зеленой плюскѣ (обверткѣ), раздѣланной на неравныя доли. Цвѣтетъ весною, до появленія листьевъ. Растетъ въ лѣсахъ и между кустарниками. Плоды составляютъ вѣсьмъ извѣстное лакомство и употребляются для добыванія масла.

Для той-же цѣли служить фундукъ, или ламбертовъ орѣхъ (*Corylus tubulosa* W.), произрастающій въ южной Европѣ и составляющій плоды болѣе высокаго достоинства.

МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНІЕ. лѣсного орѣха почти то-же, что и грецкаго. Врачами растение не предписывается, употребленіе его извѣстно только въ домашнемъ обиходѣ. Орѣховыя ядра, очищенные отъ шкурки, служатъ вмѣстѣ миндальныхъ, употребляются въ купаньяхъ и идутъ на приготовленіе орѣховаго молока, полезнаго отъ болѣй при мочеиспусканіи, и пріятнаго прохладительнаго питья для больныхъ хроническими болѣзнями. Изъ зеренъ лѣсного орѣха выжимаютъ очень хорошее масло, которымъ смазываютъ трещины сосковъ у кормящихъ женщинъ; смѣшавъ съ яичнымъ бѣлкомъ, его прикладываютъ на обожженные мѣста; также имъ мажутъ голову отъ выпаденія волосъ. Внутри масло лѣсного орѣха употребляется въ томъ-же количествѣ, какъ и грецкаго. Зрѣлые лѣсные орѣхи ѣдятъ вмѣсто десерта, но они раз-

дражаютъ слабый желудокъ, а незрѣлые даже могутъ вызвать кровавый поносъ. Неумѣренное употребленіе лѣсныхъ орѣховъ съ кожицею вызываетъ также несприятный сухой кашель, поэтому слѣдуетъ сначала опустить орѣхи въ горячую воду и снять съ нихъ кожицу.

Орѣхъ малдивскій (*Ladoicea Sechellarum* Lab.). Орѣхъ соломоновъ. Пальма, по внѣшнему виду весьма похожая на вѣрную пальму, достигаетъ нѣсколькихъ саженъ высоты; замѣчательна своими плодами, принадлежащими къ огромнѣйшимъ въ свѣтѣ (отъ 40—50 фунт.); сокъ ихъ туземные жители употребляютъ въ пищу, а изъ скорлупы выдѣлываютъ сосуды.

Орѣхъ соломоновъ, см. Орѣхъ малдивскій (*Ladoicea Sechellarum* Lab.).

Орѣшекъ бѣлый, см. Бѣлоглавка (*Trifolium montana* L.).

Орѣшекъ красный, см. Клеверъ средний (*Trifolium medium* L.).

Орѣшекъ полевой, см. Клеверъ луговой (*Trifolium pratense* L.).

Орѣшенье, см. Орѣхъ лѣсной (*Corylus Avellana* L.).

Орѣшки волошки, см. Клеверъ луговой (*Trifolium pratense* L.).

Орѣшки заячьи, см. Бобовникъ (*Amygdalis nana* L.).

Орѣшки земляные, см. Хохлатка плотная (*Corydalis solida* Smith.).

Орѣшки земляные, см. Земляные орѣшки (*Spiraea filipendula* L.).

Орѣшки земляні } см. Бобовникъ (*Amygdalis nana* L.).

Орѣшки калмыцкіе }

Орѣшки медовые, см. Земляные орѣшки (*Spiraea filipendula* L.).

Орѣшки полевые }

Орѣшки полюви } см. Бобовникъ (*Amygdalis nana* L.).

Орѣшки пьяные }

Орѣшникъ, см. Поповникъ обыкновенный (*Chrysanthemum Leucanthemum* L.).

Орѣшникъ американскій } см. Американскій орѣшникъ (*Ber-*

Орѣшникъ бразильскій } *tholletia excelsa* St. B.).

Орѣшникъ земляной фисташковый, см. Американскій земляной орѣхъ (*Arachis hypogaea* L.).

Орѣшникъ обыкновенный, см. Орѣхъ лѣсной (*Corylus Avellana* L.).

Орѣшница, см. Бутень клубненосный (*Chaerophyllum bulbosum* L.).

Осенній цвѣтъ, см. Зимовникъ осенній (*Colchicum autumnale* L.).

Осенній цвѣтъ, см. Бѣлосоръ болотный (*Parnassia palustris* L.).

Осенникъ, см. Зимовникъ осенній (*Colchicum autumnale* L.).

Осика, см. Осина (*Populus tremula* L.).

Осина (*Populus tremula* L.). Ветла, Горечавка (Приарг. кр.), Иудино дерево, Осика (Малор.), Осинное дерево, Осинка, Осичина (Малорос.), Осыка, Асина (Лит., Русск. Ст.), Осокоръ (Полт.), Трясушка (Приарг. кр.), Осинное сѣмя наз.

Бредъ (Волог.), Шентунъ-дерево. Большое дерево, вып. въ нѣсколько саженъ, изъ семейства «ивовыхъ» (*Salicineae* Rich.), распространенное въ средней и южной Европѣ, въ средней и южной Россіи, въ Сибири и Туркестанѣ, съ пепельно-сѣрымъ стволомъ. Молодые листья и нижняя поверхность листьевъ бѣло-войлочные. Листья длинно-черешковые, яйцевидные или округло-овальные, угловато-зубчатые или выемчато-лопастные. Цвѣты однополые, двудомные, въ углахъ кроющихъ, обыкновенно надрѣзанныхъ, темно-бурыхъ прицвѣтниковъ, опадающихъ до созрѣванія коробочекъ, образуютъ густыя цилиндрическія сережки, въ послѣдствіи висячія. Околоцвѣтникъ цвѣтовъ косой, блудисеобразный; тычинокъ 8; краснаго цвѣта. Пестикъ состоитъ изъ двухъ плодолистиковъ, образующихъ верхнюю завязь, съ короткимъ столбикомъ, несущимъ 2 двухраздѣльные рыльца, пурпуроваго цвѣта. Цвѣтетъ рано весной. Растетъ на влажныхъ мѣстахъ, въ лѣсахъ и по берегамъ рѣкъ. Древесина употребляется въ токарномъ и столярномъ дѣлѣ. (Таб. XXXIV, фиг. 187.)

МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНІЕ. Осина употребляется въ народной медицинѣ въ Сибири отъ скорбута и сифилиса, въ Владимірской губ. отъ лихорадки. Для отвара берутъ 1 унцъ (30,0 грм.) почек осины или корки, завариваютъ фунтомъ кипятка и даютъ кипѣть, пока не останется 8 унцій (240,0 грм.) жидкости, которую и пьютъ чайными чашками, подсластивъ сахаромъ или медомъ. Также почки настаиваютъ на винномъ спиртѣ и принимаютъ настойку по 20—30 и 40 капель. Снаружи листья осины прикладываютъ къ геморроидальнымъ шишкамъ.

Осинка } см. Осина (*Populus tremula* L.).
Осиновое дерево }
Осичина, см. Осина (*Populus tremula* L.).
Оситнякъ, см. Камышъ озерной (*Scirpus lacustris* L.).
Оскоръ } см. Оскоръ обыкновенный (*Populus nigra* L.).
Оскоръ }

Ослинникъ, см. Ослинникъ двулѣтній (*Oenothera biennis* L.).

Ослинникъ двулѣтній (*Oenothera biennis* L.). Фармацевтическое названіе: *Onagra*, *Oenothera*, *Rapunculus*. Бабекъ польный (Гродн.), Жовтець (Черн.), Ковальникъ (Мог.), Перелеть (Мал.), Левконія полевая (Мин.), Ослинникъ, Осличникъ, Онагрикъ, Ночная свѣча, Ночная свѣтильня, Свѣчникъ, Ралунцель, Ралонтигъ, Фіалка почная. Салатный корень, Лошакова трава, Осолова трава, Онагина трава, Жолнеры (Черн.), Мугри (Орл.), Крокъс (Екат.), Вѣховика, Вѣхъ (Екат.), Купино (Тавр.), Синило (Гродн.). Двулѣтнее травянистое растеніе изъ семейства «онагриковыхъ» (*Onagraceae* Juss.), родомъ изъ Сѣверной Америки, широко распространенное въ Европѣ, встрѣчающееся въ средней и южной Россіи. Стебель большею частью простой, пушистый, съ очередными эллиптическими или ланцетовидными, слегка зубчатыми листьями. Крупные душистые желтые цвѣты собраны длинною верхушечною кистью. Чашечка надъ завязью съ длинною тонкою

трубочкою, наверху расширенною въ 4-храздѣльный отгибъ; лепестковъ 5; тычинокъ 8: 4 длиннѣе, 4 короче: плодъ—коротко-цилиндрическая коробочка, при основаніи болѣе толстая, чѣмъ наверху, 4-хгранная, 4-хстворчатая. Сѣмена безъ хохолка. Разводится преимущественно для украшенія садовъ. Корни растенія ѣдятъ вареными или въ видѣ салата. Въ медицинѣ растеніе совсѣмъ оставлено. (Табл. XXXIV, фиг. 190.)

Осличникъ, см. Ослиникъ двулѣтній (*Oenothera biennis* L.).

Ослянка турецкая, см. Эспарсеть кормовой (*Onobrychis sativa* Lam.).

Оснякъ, см. Зимовникъ осенній (*Colchicum autumnale* L.).

Осока, см. Аиръ обыкновенный (*Acorus Calamus* L.).

Осока, см. Лисохвостъ оранжевый (*Alopecurus fulvus* Sm.).

Осока, см. Осока обыкновенная (*Carex vulgaris* Fries.).

Осока, см. Осока дернистая (*Carex caespitosa* L.).

Осока, см. Касатикъ водяной (*Iris pseudacorus* L.).

Осока, см. Рогоза широколистная (*Typha latifolia* L.).

Осока блѣдная (*Carex pallescens* L.). Многолѣтняя трава, образующая дерновинки, изъ семейства «осоковыхъ» (Cyperaceae Juss.), распространенная въ сѣверной и средней Европѣ, въ сѣверной, средней и юго-западной Россіи, на Кавказѣ и въ Сибири. Стебель, выш. 5—7 вершк., наверху шероховатый. Листья линейные, съ замкнутымъ влагалищемъ и продольнымъ жилемъ на спинкѣ, покрыты волосками. Цвѣтки однополые, собранные однополыми колосьями, образующими, въ свою очередь, колосообразныя соцветія. Въ составъ каждого колоска входятъ нѣсколько желтоватыхъ, съ зеленою полоскою на спинкѣ, пленокъ (прицвѣтныхъ чешуй), прикрывающихъ другъ друга на подобіе черепицы и заключающихъ въ пазухѣ по одному цвѣтку; верхушечный колосъ—съ тычиночными цвѣтами. Околоцвѣтника нѣтъ, тычинокъ 8; пестичные колоски (то есть, съ женскими цвѣтами), въ числѣ 2—3, коротко-цилиндрическіе, слегка поникшіе на ножкахъ. Листовидный прицвѣтникъ при нижнемъ колоскѣ обыкновенно выдается надъ верхушкою стебля. При женскихъ цвѣтахъ одногнѣздная завязь заключена въ замкнутый прицвѣтникъ, называемый мѣшечкомъ, гладкій, желтовато-зеленый, несущій нитевидный столбикъ съ 3-мя рыльцами, выступающими изъ верхняго отверстія прицвѣтника. Плодъ—орѣшекъ, заключенный въ мѣшечекъ. Цвѣтетъ въ маѣ и въ іюнѣ. Растетъ на лугахъ и между кустарниками. Причисляется, какъ и всѣ виды осоки, къ плохимъ кормовымъ травамъ. (Рис. 199.)

Осока болотная, см. Осока пузырчатая (*Carex vesicaria* L.).

Осока болотная, см. Камышъ лѣсной (*Scirpus silvaticus* L.).

Осока боровая, см. Осока обыкновенная (*Carex vulgaris* L.).

Осока водяная, см. Осока пузырчатая (*Carex vesicaria* L.).

Осока врачебная см. Осока мохнатая (*Carex hirta* L.).

Осока дернистая, см. Осока обыкновенная (*Carex vulgaris* Fr.).

Осока двудомная (*Carex dioica* L.). Многолѣтняя низенькая травка изъ семейства «осоковыхъ» (*Cyperaceae* Juss.), распространенная въ сѣверной и средней Европѣ, въ сѣверной, средней и юго-западной Россіи и въ Сибирѣ, съ ползучими подземными побѣгами. Стебель тонкій, гладкій, почти цилиндрический, съ нитевидными гладкими листьями и одиночнымъ верхушечнымъ колоскомъ, въ составъ котораго входятъ яйцевидныя коричневыя, расположенныя спирально, пленки (прицвѣтныя чешуи), прикрывающія другъ друга на подобіе черепицы и заключающія въ пазухѣ по одному цвѣтку. Цвѣтки двудомные, безъ околоцвѣтника. Тычинокъ 3; какъ у всѣхъ осокъ, завязь заключена въ замкнутый прицвѣтникъ, называемый мѣшечкомъ и сохраняющійся при плодахъ; плодъ—орѣшекъ, заключенный въ мѣшечекъ. Цвѣтетъ весной. Растетъ на сырыхъ лугахъ и торфяныхъ болотахъ.

Осока заячья (*Carex leporina* L.). Многолѣтняя трава изъ семейства «осоковыхъ» (*Cyperaceae* Juss.), распространенная почти по всей Европѣ и весьма обыкновенная въ Россіи. Стебель выш. $3\frac{1}{2}$ —7 вершк., 3-хгранный, гладкій, наверху широко-овальный, съ линейными, по краямъ остро-широковатыми, листьями. Колоски, болышую часть въ числѣ 6, образуютъ наверху стебля продолговатый колосъ. Пленки, или прицвѣтники чешуй, входящія въ составъ каждаго колоска и прикрывающія другъ друга на подобіе черепицы,—овальныя буроватыя, бѣловатыя или соломенно-желтыя, съ зеленою полоскою на спинкѣ. Въ пазухѣ каждая изъ нихъ содержитъ по одному цвѣтку. Верхніе цвѣты у каждаго колоска пестичные, женскіе, нижніе—тычиночные. Тычинокъ 3; завязь заключена въ прямостоящій, прижатый, яйцевидный, сплюснутый, съ зазубренною перепончатого каймою и двугубымъ носикомъ, мѣшечекъ (замкнутый прицвѣтничекъ), несущій нитевидный столбикъ съ 2 рыльцами. Плодъ—орѣшекъ, заключенный въ мѣшечекъ. Цвѣтетъ въ маѣ и въ іюнѣ. Растетъ на сырыхъ и болотистыхъ мѣстахъ. Плохая кормовая трава.

Осока криничина, см. Осока ранняя (*Carex praecox* Jacq.).

Осока купорная, см. Рогоза широколистная (*Typha latifolia* L.).

Осока лисья (*Carex vulpina* L.). Опорѣзная. Многолѣтняя трава изъ семейства «осоковыхъ» (*Cyperaceae* Juss.), распространенная почти во всей Европѣ и весьма обыкновенная въ Россіи. Корневище образуетъ дерновники. Стебель остро-3-хгранный, съ вогнутыми гранями, выш. $1\frac{1}{2}$ —2 вершк. Листья широко-линейные, по краямъ остро-широковатые. Цвѣты однодомные, въ колоскахъ, собранныхъ простымъ или, при основаніи, сложнымъ колосомъ; прицвѣтныя чешуи, или пленки—овальныя, остисто-заостренныя, коричневыя или бѣловатыя, короче мѣшечковъ, въ которыхъ заключена завязь. Каждый колосокъ несетъ наверху мужскіе, тычиночные цвѣты, а внизу женскіе—пестичные. Тычинокъ 3; одnogнѣздная завязь заключена въ мѣшечекъ (замкнутый прицвѣтничекъ), несущій нитевидный столбикъ съ

2-мя рыльцями и заключающій плодъ—орѣшекъ. Мѣшечки, заключающіе зрѣлые орѣшки,—яйцевидные, плоско-выпуклые, растопыренные, съ ясно-замѣтными жилками и двузубчатымъ носикомъ. Цвѣтеть въ маѣ и въ іюнѣ; растётъ на сырыхъ лугахъ, болотахъ, по канавамъ, по берегамъ рѣкъ и прудовъ.

Осока лѣсная (*Carex silvatica* Huds.). Многолѣтняя трава изъ семейства «осоковыхъ» (*Cyperaceae* Juss.), распространенная въ средней и южной Европѣ, въ западной, средней и юго-западной Россіи, на Кавказѣ и въ Сибири. Стебель ея гладкій, выши. 7—14 вершк. Листья широко-линейные, по краямъ остро-пероховаты. Верхушечный колосокъ одиночный, съ тычинными (мужскими) цвѣтами; пестичные, съ женскими цвѣтками, колоски, въ числѣ 3—4, линейные, блѣдно-зеленые, рыхлые, поникшіе, на длинныхъ ножкахъ, удаленные другъ отъ друга. Прицвѣтныя чешуи, или пленки, прикрывающія другъ друга на подобіе черепицы, входящія въ составъ каждаго колоска, по краямъ широко-перепончатые, короче мѣшечковъ, заключающихъ въ себѣ завязь, несущихъ нитевидный столбикъ съ 3-мя рыльцами и продолженныхъ въ длинный двузубчатый носикъ. Тычинокъ 3; плодъ—орѣшекъ, заключенный въ мѣшечекъ. Цвѣтеть въ маѣ и въ іюнѣ. Растетъ въ лѣсахъ. (Рис. 230.)

Осока мохнатая (*Carex hirta* L.). Декопъ (Орл.), Декохтъ (Курск.), и изм. Декокопъ, Осока песочная (Влад.), Осока врачбная, Дорогая трава, Цырей красный, Цырей осочный (Вор.), Шелковая трава (Черн.). Шелковица (Вор.), Скорода (Черн.). Многолѣтнее травянистое растение изъ семейства «осоковыхъ» (*Cyperaceae* Juss.), распространенная почти по всей Европѣ и въ Россіи. Стебель невысокій, 3-хгранный, гладкій; листья зеленые, вмѣстѣ съ влагалищами болѣе или менѣе густо-мохнатые. Колоски коротко-цилиндрическіе. Мужскихъ (тычинныхъ) цвѣтковъ 1—3, женскихъ (пестичныхъ)—2—3. Прицвѣтныя чешуи, или пленки, закрывающія другъ друга на подобіе черепицы, въ серединѣ зеленоватыя, по краямъ бѣловато-перепончатые, снабженные длиннымъ зазубреннымъ остріемъ; тычинокъ 3; завязь однодѣльная, заключенная въ пушисто-мохнатомъ, заостренномъ въ небольшой носикъ, раздѣляющійся на 2 расходящихся зазубренныхъ зубца, прицвѣтникъ. Плодъ—орѣшекъ, заключенный въ мѣшечекъ. Цвѣтеть въ началѣ лѣта. Растетъ на влажныхъ песчаныхъ мѣстахъ.

Осока обыкновенная (*Carex vulgaris* Fr., *Carex caespitosa* Auct.). Осока дернистая. Осока, Осока боровая, Березка, Кустовица. Острець (Тамб.), Рожь болотная (Кал.), Шарагъ (Олон.), Ящерець (Мог.). Многолѣтняя трава изъ семейства «осоковыхъ» (*Cyperaceae* Juss.), весьма обыкновенная въ Европѣ и въ Россіи; образуетъ дерновинки. Стебель 3-хгранный, гладкій, наверху пероховатый, при основаніи безъ чешуевидныхъ листьевъ (листовыхъ влагалищъ). Листья спзо-зеленые, линейные, остро-пероховатые. На верхушкѣ стебель несетъ колосокъ съ тычинными (мужскими) цвѣтками, а подъ нимъ 2—3 колоска съ пестичными (женскими). Последніе—коротко-цилиндрическіе, ту-

пые, сидячіе; нижній — иногда на ножкѣ. Листовидный прицвѣтникъ, сидящій на нижнемъ колоскѣ, обыкновенно не доходитъ до верхушки стебля. Прицвѣтныя чешуйки, или пленки, закрывающія другъ друга на подобіе черепицы, у тычиночныхъ колосковъ бурья, а у пестичныхъ черныя. Тычинокъ 3; одногнѣздная завязь заключена въ мѣшечекъ (замкнутый прицвѣтничекъ), плоско-выпуклой формы, гладкій, съ очень короткимъ носикомъ, зеленый или сверху черный, несущій нитевидный столбикъ съ 2-мя рыльцами. Плодъ—орышекъ, заключенный въ мѣшечекъ. Цвѣтетъ весною. Растетъ на болотахъ и сырыхъ лугахъ. (Табл. XXXV, фиг. 196.)

Осока озерная, см. Рогоза широколистная (*Typha latifolia* L.).

Осока песочная, см. Осока мохнатая (*Carex hirta* L.).

Осока песчаная (*Carex arenaria* L.). Фармацевтическое назв.: *Carex arenaria* s. *Sasaparilla germanica*, *Gramen rubrum*. Её и песочный, Карусъ (Малор.), Корень песочный, Осокъ песочный (Тамб.), Осочныця (Вол., Подол.), Песчець (Кал.). Многолѣтняя трава изъ семейства «осоковыхъ» (*Cyperaceae* Juss.), распространенная почти во всей Европѣ, преимущественно на морскихъ берегахъ, въ Прибалтійскомъ и западномъ краѣ, встречается въ средней Россіи и въ Крыму. Корневище длинное, горизонтальное, ползучее. Стебель 3-хгранный, наверху шероховатый; листья узко-линейные, желобчатые, жесткіе, шероховатые. Колоски многочисленные (6—16), сближенные въ линейно-продолговатый колосъ; нижние колоски съ пестичными цвѣтками, верхніе—съ мужскими, т. е., тычиночными; средніе—при верхушкѣ тоже съ тычиночными. Тычинокъ 3; пленки, или прицвѣтныя чешуи, составляющія колосъ и черепичато прикрывающія другъ друга,—заостренные, бурья, съ бѣловато-перепончатымъ краемъ. Завязь одногнѣздная, заключенная въ продолговато-яйцевидномъ мѣшечкѣ, заостренномъ, буромъ, съ сильно выдающимися жилками, несущемъ нитевидный столбикъ съ двураздѣльнымъ рыльцемъ. Плодъ—орышекъ, заключенный въ мѣшечкѣ. Цвѣтетъ въ началѣ лѣта. Растетъ на песчаныхъ мѣстахъ и на морскихъ берегахъ.

МЕДИЦИННОЕ УПОТРЕБЛЕНІЕ. Прежніе врачи употребляли это растение отъ сифилиса, теперь совсѣмъ оставили. Корень осоки песчаной имѣетъ пріятный запахъ, мучной сладковатый вкусъ, слегка балзамическій. Въ крестьянскомъ быту пьютъ отваръ корня отъ простудной ломоты, насморка, удущья въ груди и отъ разныхъ нечистыхъ сыпей и чирьевъ. Всѣ другіе виды осоки имѣютъ тѣ-же свойства.

Осока пузырчатая (*Carex vesicaria* L.). Осока болотная, водяная, Осока-рѣзунъ (Вят.), Рѣзецъ (Кал.), Болотные толкачики. Зеленая многолѣтняя трава изъ семейства «осоковыхъ» (*Cyperaceae* Juss.), распространенная въ Европѣ, въ сѣверной, западной и юго-западной Россіи, на Кавказѣ и въ Сибири. Листья линейные, одинаковы по длинѣ съ стеблемъ или немного длиннѣе. Стебель остро-3-хгранный, наверху остро-шероховатый;

цвѣты однополые, образуютъ тычиночныя и пестичныя колоски; первые—въ числѣ 2—3, вторые—2—4, продолговато-цилиндрическіе, почти сидячіе; пленки, или прицвѣтныя чешуи—ланцетныя, буроватыя, короче мѣшечковъ, заключающихъ завязь, яйцевидно-коническихъ, вздутыхъ, продолженныхъ въ небольшой двузубчатый носикъ, снабженныхъ ясно-замѣтными жилками. Тычинокъ 3; столбикъ нитевидный, съ 3-мя рыльцами. Плодъ—орѣшекъ, заключенный въ мѣшечекъ. Цвѣтетъ въ началѣ лѣта. Растетъ на болотахъ и берегахъ.

Осока ранняя (*Carex praecox* Jacq.). Осока криничина. Многолѣтняя трава изъ семейства «осоковыхъ» (*Cyperaceae* Juss.), распространенная почти во всей Европѣ, въ западной, средней, юго-западной Россіи, въ Крыму, на Кавказѣ и въ Сибири. Корневище ползучее, съ подземными побѣгами. Стебель вып. 2—7 верш., длиннѣе линейныхъ листьевъ, сближенныхъ въ нижней части стебля пучкомъ. Верхушечный колосокъ съ тычиночными цвѣтами, а находящіеся подъ нимъ 1—3 продолговатой яйцевидныхъ колоска—съ пестичными; нижній колосокъ отодвинутъ отъ другихъ и обыкновенно сидитъ на ножкѣ. Прицвѣтники при колоскахъ очень короткіе и пленчатые. Пленки, или прицвѣтныя чешуйки, составляющія колосокъ и расположенныя черепичато,—бурья, яйцевидныя, остисто-заостренныя, почти одинаковой длины съ мѣшечками, продолженными въ короткій носикъ, содержащими завязь и несущими нитевидный столбикъ съ 3-мя рыльцами. Цвѣтетъ весною. Растетъ на сухихъ мѣстахъ, въ степяхъ и рощахъ.

Осока-рѣзунъ, см. Осока пузырчатая (*Carex vesicaria* L.).

Осока-трава, см. Касатикъ водяной (*Iris pseudacorus* L.).

Осока чужестранная, см. Артишокъ обыкновенный (*Cynara Scolymus* L.).

Осокорь, см. Осокорь обыкновенный (*Populus nigra* L.).

Осокорь бѣлый, см. Тополь серебристый (*Populus alba* L.).

Осокорь даурская } см. Тополь душистый (*Populus balsamifera* L.).

Осокорь душистая }

Осокорь обыкновенный (*Populus nigra* L.). Осокорь (Вел. Росс.) и пзм. Оскорь, Оскорь, Сокора (Малор.), Сокорина (Черниг.), Осухарь (Вят.), Яскеръ, Яскоръ (Малор.), Ясакаръ (Екат.), Ясокоръ (Ясний корень—Вѣлор.), Сухарка (Оренб.), Осина (Бесс.), Ветла, Рябчикъ (у барочниковъ въ Польшѣ), Папортовое дерево, Тополь (въ б. ч. Россіи), Тополь висловскій, Тополь черный, Чернотополь (Даль). Высокое дерево изъ семейства «ивовыхъ» (*Salicineae* Rich.), распространенное въ средней и южной Россіи, въ Туркестанѣ и Сибири, съ широкою короной и отстоящими вѣтвями. Листья почти треугольныя, заостренныя, при основаніи притупленныя, по краямъ пильчатые, съ обѣихъ сторонъ зеленые. Почки блестящія, покрытыя душистою смолой. Цвѣты однополые, двудомные, въ сережкахъ. Чешуйки у сережекъ бахромчато-надрѣзанныя. Околоцвѣтникъ косой, блюдцеобразный; тычинки красныя, въ числѣ 12—20. Завязь верхняя, одно-

гибкая, съ короткимъ столбикомъ, несущимъ 2 желтыхъ двураздѣльныхъ рыльца. Плодь—коробочка. Цвѣтетъ весною; растетъ на влажныхъ мѣстахъ и по берегамъ рѣкъ. Мягкая и легкая древесина употребляется на разныя токарныя и столярныя издѣлія. (Табл. XXXV, фиг. 193 и рис. 201.)

МЕДИЦИНОКОЕ УПОТРЕБЛЕНІЕ. Осокорь въ медицинѣ употребляется точно такъ-же, какъ *populus alba* (тополь серебристый), только какъ народное средство. Кору принимаютъ отъ перемежающихся лихорадокъ, смолистыя почки ввидѣ мази накладываются на воспаленныя геморроидальныя шишки.

Осокорь пирамидальный, см. Тополь пирамидальный (*Populus pyramidalis* Roz.).

Осокъ песочный, см. Осока песчаная (*Carex arenaria* L.).

Осокъ песочный, см. Колоснякъ песчаный (*Elymus arenarius* L.).

Осолодошникъ, см. Девясиль иволжетный (*Inula salicina* L.).

Осолотка-травя, см. Солодковый корень (*Glycyrrhiza echinata* L.).

Осота, см. Чертополохъ курчавый (*Carduus crispus* L.).

Осотикъ, см. Чертополохъ полевой (*Cirsium arvense* Scop.).

Осотнякъ, см. Сусакъ зонтичный (*Butomus umbellatus* L.).

Осотъ, см. Чертополохъ полевой (*Cirsium arvense* Scop.).

Осотъ, см. Осотъ огородный (*Sonchus oleraceus* L.).

Осотъ, см. Осотъ полевой (*Sonchus arvensis* L.).

Осотъ бѣлый, см. Остро-пестрая трава (*Silybum Marianum* Gärtn.).

Осотъ дикій, см. Камышъ лѣсной (*Scirpus silvaticus* L.).

Осотъ заячій, см. Осотъ огородный (*Sonchus oleraceus* L.).

Осотъ итальянскій, см. Кардобенедиктъ (*Cnicus benedictus* Gärtn.).

Осотъ красный, см. Чертополохъ курчавый (*Carduus crispus* L.).

Осотъ красный, см. Чертополохъ полевой (*Cirsium arvense* Scop.).

Осотъ лѣсной, см. Чертополохъ разнолистный (*Cirsium heterophyllum* All.).

Осотъ огородный (*Sonchus oleraceus* L.). Желтушникъ (Тв.), Заячникъ (Влад.), Заячій салатъ, Заячья капуста, Звѣтеникъ (Умань), Какпшъ. Какпшъ (Умань), Козелокъ (Нижег.), Куровникъ (Вор.), Молочникъ (Смол.), Пудожъ, Молочай, Молочакъ (Малор.), Малокитникъ, Осотъ (Бѣлор.), Осотъ заячій (Даль), Пушинникъ (Нижег.), Синеголовникъ, Сусай (Херс.), Цигорія полевая. Однолѣтняя сорная трава изъ семейства «сложноцвѣтныхъ» (*Compositae* Adans.), распространенная по всей Европѣ и весьма обыкновенная въ Россіи. Стебель выш. 7—22½ вершк., толстый, полый, вѣтвистый, совершенно голый, за исключеніемъ цвѣтоножекъ, усаженныхъ железистыми волосками. Нижніе листья перисто-раздѣльные или ланцетные, верхніе—стеблеобъемлющіе, съ острыми усиками. Корзинки желтыхъ цвѣтовъ собраны на верхушкѣ стебля щитковидной метелкой. Обвертки корзинокъ состоятъ изъ черешчатыхъ голыхъ листочковъ, цвѣтоложе корзинокъ голое. Всѣ цвѣты язычковые. Тычинокъ 5, спаянныхъ нитями въ трубочку, черезъ которую проходитъ

столбикъ съ двураздѣльнымъ рыльцемъ. Завязь нижняя одногнѣздная, односѣмянная. Плодъ—слегка сплюснутая сѣмянки снабженная хохолкомъ. Цвѣтъ лѣтомъ. Произрастаетъ на огородахъ, въ садахъ, около дорогъ, на сорныхъ мѣстахъ и на поляхъ. Имѣетъ горьковатый вкусъ. Молодые листья его и корни могутъ быть употребляемы въ супъ и какъ салатъ. (Табл. XXXV, фиг. 194.)

Осоць паволошный, см. Татарникъ (*Oenothera Acanthium* L.).

Осоць полевой (*Sonchus arvensis* L.). Фармацевтическое назв.: *Heracium Sonchitis* (Herba.). Пирчакъ (Малор.). Желтушникъ (Тв.), Молочакъ, Осоць полевой (Малор.), Молочайникъ, Чертовое зѣле, Молочай (Малор.), Молочникъ (Вятск.), Уразная (Вятск.). Заячья капуста, Молочай капустный. Многолѣтнее травянистое растение изъ семейства «сложноцвѣтныхъ» (*Compositae* Adans.), распространенное почти по всей Европѣ и Россіи. Главный корень съ длинными горизонтальными боковыми корнями. Стебель простой или наверху слегка вѣтвистый, выш. 14—28 верш. Листья длинныя, ланцетовидныя, цѣльные или перисто-надрѣзные, струговидныя, по краямъ съ неравными зубцами, стеблевые—при основаніи сердцевидныя, съ округлыми ушками, верхніе—цѣльные. Вѣтви цвѣтоножки и листья обертокъ усажены желтыми или темно-бурыми железистыми волосками. Довольно крупныя корзинки ярко-желтыхъ цвѣтовъ собраны рыхлой щитковидной метелкой. Всѣ цвѣты язычковые. Тычинокъ 5, сросшихъ нитями въ трубочку, черезъ которую проходитъ столбикъ съ 2-храздѣльнымъ рыльцемъ. Завязь нижняя одногнѣздная, односѣмянная. Плодъ—слегка сплюснутая, снабженная хохолкомъ сѣянки. Цвѣтъ лѣтомъ. Произрастаетъ на поляхъ и лугахъ. (Рис. 202.)

Осоць слабительный, см. Макъ мексиканскій (*Argemone mexicana* L.).

Осоць черный, см. Василекъ перистый (*Centaurea Scabiosa* L.).

Осочная трава, см. Перловникъ поникшій (*Melica nutans* L.).

Осочница, см. Осока песчаная (*Carex arenaria* L.).

Острагонъ, см. Эстрагонъ (*Artemisia Dracunculus* L.).

Острець, см. Подорожникъ ланцетолистный (*Plantago lanceolata* L.).

Острець (*Elymus sabulosus* M. B.). Травянистое многолѣтнее растение изъ семейства «злаковыхъ» (*Gramineae* Juss.), распространенное на прибрежныхъ пескахъ Чернаго и Каспійскаго морей, встрѣчающееся кое-гдѣ въ южныхъ губерніяхъ, съ длинными ползучими побѣгами. Стебли выходятъ пучками, не очень толстые, высокіе, гладкіе, вмѣстѣ съ листьями голубовато-зеленые. Листья довольно широкіе, жесткіе, часто свертывающіеся. Колосъ длинный; колоски собраны внизу и вверху обыкновенно по 2; въ серединѣ колоса по 3—4 цвѣтка, изъ нихъ 2—3 женскихъ и верхній мужской. Чешуи при колоскахъ, или створки—съ 2—3 жилками, совершенно гладкія, блестящія; цветочныя чешуи ланцетныя, наверху почти голыя, снабженныя остроконеціемъ. Околосцвѣтникъ состоитъ изъ рѣсничатыхъ пленочекъ. Завязь

односемянная. Плодъ—зерно съ широкимъ желобкомъ съ внутренней стороны. Киргизы дѣлають изъ него чин, т. е., ширмы; въ Сибири острець считается лучшею и питательнѣйшею кормовою травой. Сбрана въ Неланди прибавляютъ къ хлѣбу.

Острица, см. Острица лежачая (*Asperugo procumbens* L.).

Острица, см. Подмаренникъ цѣлкій (*Gallum Aparine* L.).

Острица, см. Подмаренникъ желтый (*Gallum verum* L.).

Острица лежачая (*Asperugo procumbens* L.). Лепчица, Лепиць.

Липчица (Малор.), Мокрець, Острица, Острица, Репяшки весенне (Одесс.), Рипяшки (Под.), Скала, Скалка-травя. Однолѣтнее травянистое растение изъ семейства «бурачниковыхъ» (*Boerhaginaceae* Juss.), распространенное почти во всей Россіи. Стебель лежащій, дл. $3\frac{1}{2}$ —14 вершк., усаженный острыми, часто загнутыми назадъ, щетинками. Листья эллиптическіе, жестко-шершавые, нижніе—очередные, верхніе—сближенные по 2—3, цѣльнокрайніе или мелко-зубчатые. Цвѣты мелкіе одиночные, пурпурово-синіе, по 1—3 въ углахъ верхнихъ листьевъ. Чашечка широко-колокольчатая, раздѣлена до середины на 5 ланцетныхъ долей, между которыми находятся по 1 или 2 зуба; послѣ цвѣтенія она разрастается и становится сплюснутой; вѣнчикъ ворончатый, съ 5 тупыми чешуйками въ зѣвѣ. Тычинокъ 5; завязь верхняя, 4-хлѣздная, 4-хлопастная. Столбикъ съ 2-раздѣльнымъ рыльцемъ. Плодъ сухой, распадающійся по созрѣваніи на 4 орѣшка. Цвѣтетъ въ маѣ и въ іюнѣ. Растетъ по берегамъ рѣкъ, около дорогъ и на сорныхъ мѣстахъ. (Рис. 203.)

Острица, см. Острица лежачая (*Asperugo procumbens* L.).

Островершки, см. Живучка ползучая (*Ajuga reptans* L.).

Острога, см. Сосенка водяная (*Hippuris vulgaris* L.).

Острогонъ, см. Эстрагонъ (*Artemisia Dracunculus* L.).

Острожа, см. Васильки рогаые (*Delphinium consolida* L.).

Острожка, см. Сосенка водяная (*Hippuris vulgaris* L.).

Острожка-травя, см. Васильки рогаые (*Delphinium consolida* L.).

Острожокъ, см. Васильки рогаые (*Delphinium consolida* L.).

Острокильникъ волосистый (*Oxitropis pilosa* Dc.). Горобионецъ (Малор.), Горохъ волосистый, полевой, Перелеть (Хар., Екат.), Соколій перелеть (Хар.), Пушокъ (Вор.). Многолѣтнее травянистое мохнато-волосистое растение изъ семейства «мотыльковыхъ» (*Papilionaceae* L.), распространенное въ средней Европѣ, въ средней и южной Россіи и въ Сибири. Стебель прямостоящій или приподнимающійся, выш. 5—12 вершк. Листья перисто-перистые, съ 20 яичевидно-продолговатыми или линейно-продолговатыми листочками. Блѣдно-желтые цвѣты въ густыхъ продолговатыхъ кистяхъ. Чашечка трубчатая, 5-ти зубчатая, съ ланцето-шиловидными зубцами. Вѣнчикъ мотыльковый, состоящій изъ 5 лепестковъ: верхняго флага, 2 боковыхъ крыльевъ и 2 нижнихъ, сросшихся на подобіе лодочки; лодочка его на тупой верхушкѣ снабжена остроконечіемъ. Тычинокъ 10, изъ нихъ 9—сросшихся, 10-я (верхняя) свободная. Столбикъ нитевидный голый. Плодъ—вверхъ стоячій бобъ, линейно-

продолговатый, заостренный и мохнатый. Цвѣтеть съ мая по июль. Растетъ на холмахъ скалистыхъ мѣстахъ и въ степяхъ.

Острокильникъ полевой (*Oxytropis campestris* Dc.). Низенькая многолѣтняя травка изъ семейства «мотыльковыхъ» (*Papilionaceae* L.). распространенная въ сѣверной и средней Европѣ встрѣчающаяся на Уралѣ и въ восточной Сибири, съ прикорневыми непарно-перистыми листьями, въ пазухахъ которыхъ сидятъ на длинныхъ ножкахъ короткія, почти колосовидныя соцветія. Листочки многочисленные, ланцетовидные, цѣльно-крайне. Чашечка трубчатая, 5-ти зубчатая. Вѣнчикъ мотыльковый, 5-ти лепестный (верхній лепестокъ—флагъ, 2 боковыхъ—крылья, 2 нижнихъ, сросшихся между собою, образуютъ лодочку), блѣдно-желтый, слегка красноватый, съ двумя фіолетовыми пятнами на верхушкѣ лодочки. Тычинокъ 10:9—сросшихся между собою, 10-я (верхняя) свободна. Столбикъ нитевидный. Плодъ—двустворчатый многосѣмянный бобъ; верхній шовъ его болѣе или менѣе владеетъ внутри и раздѣляетъ его на два полугнѣзда. Цвѣтеть лѣтомъ. (Рис. 204.)

Острокоръ, см. Падубъ обыкновенный (*Ilex aquifolium* L.).

Острокровъ большой, см. Метла, или мышій тернъ (*Ruscus aculeatus* L.).

Остролистная трава, см. Подбѣлъ (*Andromeda polifolia* L.).

Остролистникъ, см. Падубъ обыкновенный (*Ilex aquifolium* L.).

Остролистникъ, см. Горчакъ (*Polygonum Persicaria* L.).

Остролистъ, см. Акантъ остролистный (*Acanthus mollis* L.).

Остролистъ, см. Падубъ обыкновенный (*Ilex aquifolium* L.).

Остролистъ, см. Тѣлорѣзь сабуровидный (*Stratiotes aloides* L.).

Остропестеръ, см. Остро-пестрая трава (*Silybum Marianum* Gärt.).

Остро-пестрая трава (*Silybum Marianum* Gärt.). Фармацевтическое названіе *Carduus marianus*, s. *Mariae*, *Fructus* s. *Semen Cardui Mariae* s. *mariani*. *Semen Spinac* albac, *Semen Lactei* s. *Leucacanthae*. Лягушечникъ, Девясилъ черный, Комочникъ (Вол., Под.), Марьины колючки, Осоть бѣлый, Остропестеръ, Марьино остропестро (Влад.). Растопиша (Малор.). Расторопиша, Разторопиша, Росторопиша, Татарникъ. Травянистое двулѣтнее растеніе изъ семейства «сложноцвѣтныхъ» (*Compositae* Adans.), распространенное въ южной Европѣ, въ западной и юго-западной Россіи. Стебель прямой, простой или вѣтвистый, вмѣстѣ съ листьями голый; листья ланцетные, желтовато-колюче-зубчатые, по жилкамъ бѣло-пятнистые, нижніе при основаніи суженные, перисто-лопастные, съ 3-угольными лопастями, стеблевые—сидячіе, со стебле-обхватывающимъ основаніемъ, цѣльные. Корзинка пулуровыхъ цвѣтовъ крупная, съ черепичатою оберткой изъ колючекъ и колюче-рѣсничатыхъ зеленыхъ листочковъ. Цвѣтоложе мясистое, покрыто волосками. Цвѣты обоополовые, съ трубчатымъ вѣнчикомъ. Чашечка 5-тизубчатая; тычинокъ 5, сросшихся между собою нижними частями нитей. Пыльники ихъ съ шиловидными придатками. Столбикъ на верхушкѣ не-

глубоко-двулопастный. Плодь—обратно-яйцевидный съмянки съ хохолкомъ. Цвѣтетъ лѣтомъ. Растетъ въ садахъ и огородахъ иногда на сорныхъ мѣстахъ.

МЕДИЦИНОКОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ. Остро-пестрая трава прежде употреблялась въ медицинѣ отъ желтухи и болѣзней селезенки, теперь оставлена.

Остудная трава, см. Грыжникъ голый (*Herniaria glabra* L.).

Остудникъ, см. Ясминникъ душистый (*Asperula odorata* L.).

Остудникъ, см. Грыжникъ голый (*Herniaria glabra* L.).

Остудникъ, см. Ленъ дикий (*Linaria vulgaris* Mill.).

Остючки, см. Череда трехраздѣльная (*Bidens tripartita* L.).

Осыка, см. Осина (*Populus Tremula* L.).

Отварочникъ, см. Горлецъ, раковыя шейки (*Polygonum Bistorta* L.).

Отваръ, см. Ложечная трава (*Cochlearia officinalis* L.).

Отдолень, см. Гравилатъ водяной (*Geum rivale* L.).

Отдышная трава, см. Сивецъ луговой (*Scabiosa succisa* L.).

Отзепникъ, см. Звѣздчатка злачная (*Stellaria graminea* L.).

Откасникъ } см. Первоцвѣтъ лекарственный (*Primula officinalis* Jacq.).

Откашникъ } nalis Jacq.).

Откосникъ, см. Язвенникъ обыкновенный (*Anthyllis Vulnagaria* L.).

Отмычная трава, см. Скабіоза желтая (*Scabiosa succisa* L.).

Отношникъ, см. Валеріана лекарственная (*Valeriana officinalis* L.).

Отхасникъ, см. Василистникъ желтый (*Thalictrum flavum* L.).

Офрисъ паукообразный (*Ophrys aranifera* Huds.). Бровникъ, Двулистникъ, Птичье гнѣздо, Младоглища. Многолѣтнее травянистое растение изъ семейства «орхидныхъ» (*Orchidaceae* Juss.), распространенное въ средней и южной Европѣ. Корневая шишка почти шаровидная. Листья ланцетные, очередные, стеблеобъемлющіе. Соцвѣтіе образуетъ рѣдкій колосъ. Лепестковидный околоцвѣтникъ состоитъ изъ 3 наружныхъ зеленыхъ, съ красноватымъ оттѣнкомъ, и 3 внутреннихъ листочковъ; одинъ изъ послѣднихъ, отличающійся своею формою, образуетъ широкую, продолговато-4-угольную, округлую, иногда 3-лопастную, вышуклую, пурпурово-или желтовато-бурю губу, въ серединѣ съ болѣе свѣтлыми пятнами. Тычинка одна; нить ея срастается съ столбцомъ завязи въ колонку, образуя гиностелій; пыльникъ 2-хлѣбздный. Завязь нижняя, одногнѣздная, обыкновенно скрученная, рыльце находится на колонкѣ подъ пыльникомъ. Плодь—коробочка. Цвѣтетъ въ маѣ и юнѣ. Произрастаетъ преимущественно на известковой почвѣ.

Охватка } см. Копытень европейскій (*Asarum*

Охватка благовонная } europaeum L.).

Охватка благовонная, см. Ясенецъ бѣлый (*Dictamnus Fraxinella* Pers.).

Охватка прѣстая, см. Копытень европейскій (*Asarum europaeum* L.).

Очанка, см. Очанка лекарственная (*Euphrasia officinalis* L.).
Очанка, см. Дубровникъ обыкновенный (*Teucrium chamaedrys* L.).
Очанка, см. Дубровка (*Veronica chamaedrys* L.).
Очанка желтая (*Euphrasia lutea* L.). Три брата. Однолѣтнее травянистое растение изъ семейства «норичниковыхъ» (*Scrophulariaceae* R. Br.), распространенное въ средней Европѣ, въ средней и южной Россіи, коротко-пушистое. Стебель прямой, выш. $3\frac{1}{2}$ —7 вершк., вѣтвистый. Листья супротивные, линейно-ланцетные, цѣльно-крайніе; прицвѣтники линейные, не превышающіе цвѣтовъ; цвѣты желтые, одиночные, пазушные (въ гущахъ прицвѣтниковъ), образуютъ верхушечныя колосовидныя кисти. Чашечка трубчато-колокольчатая, 4-зубчатая, съ трехугольными зубцами. Вѣничикъ коротко-пушистый, снаружи двугубый, съ расширенною спереди трубкою и двугубымъ отгибомъ; верхняя губа выемчатая, съ отвороченными краями, нижняя—плоская трехлопастная, одинаковой длины съ верхней губой. Тычинокъ 4, двусильныхъ (т. е., 2 короче, 2 длиннѣе), замѣтно превышающихъ верхнюю губу, съ голыми на верхушкѣ пыльниками. Завязь верхняя 2-гнѣздная, съ однимъ столбикомъ. Плодъ—продолговатая, сжатая, раскрывающаяся гнѣздоразрывно съ 2-мя створками, коробочка, съ продолговатыми вдоль бороздчатыми сѣменами. Цвѣтетъ въ іюлѣ и въ августѣ. Произрастаетъ въ степяхъ, лѣсахъ и на холмахъ. (Рис. 205.)

МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНІЕ. Настой очанки желтой въ водкѣ пьютъ отъ рѣзы въ животѣ.

Очанка лекарственная (*Euphrasia officinalis* L.). Фармацевтическое названіе: *Euphrasia*. Василекъ полевой (Кіев.), Глазница, Глазная трава, Горлянка (Пек.), Жабная (Моск.), Кашка (Влад.), Зезюлька (Гродн.), Змѣвецъ (Вятск.), Луговой вересъ (Кіев.). Очная трава, Очанка, Очная помощь, Полосовая (Олон.), Родимная (Вятск.), Рябушка (Ниж.), Сердечникъ кошачій, Свѣтъ очей, Свѣтликъ, Свѣчка (Даль), Сорочьи или вороньи слезы (Твер., Ост.), Соничникъ, Ушеникъ (Пек.), Щиръ (Минск.). Однолѣтнее травянистое коротко-пушистое небольшое растение изъ семейства «норичниковыхъ» (*Scrophulariaceae* R. Br.), распространенное почти во всей Европѣ и во всей Россіи. Стебель выш. $1\frac{1}{2}$ — $3\frac{1}{2}$ вершк., рѣдко выше, вѣтвистый. Листья супротивные, сидячіе, яйцевидные, крупно-зубчатые, верхніе—постепенно переходятъ въ прицвѣтники, въ углахъ которыхъ сидятъ одиночные цвѣты, образующіе верхушечныя колосовидныя кисти. Чашечка трубчато-колокольчатая, съ узко-ланцетными, тонко-заостренными 4 зубцами; вѣничикъ двугубый, бѣлый или лиловый, съ верхней спереди мелко-зубчатой выемчатой губой съ отвороченными краями, и съ трехлопастной лопатно-выемчатой нижней губой съ фіолетовыми волосками и желтымъ пятномъ. Тычинокъ 4, двусильныхъ (2 длиннѣе остальныхъ 2); пыльники при основаніи мохнатые. Завязь верхняя, 2-гнѣздная, съ однимъ столбикомъ. Плодъ—продолговатодвустворчатая гнѣздоразрывно-раскрывающаяся коробочка съ

продолговатыми вдоль бороздчатыми сѣменами. Цвѣтетъ въ июль и въ августъ. Растетъ на лугахъ и между кустарниками. (Табл. XXXVI, фиг. 197.)

МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ. Все цвѣтущее растение считалось въ древности очень полезнымъ при глазныхъ болѣзняхъ, кромѣ того, употреблялось отъ желтухи, слабости желудка. Теперь растение это извѣстно только въ народной медицинѣ. Его употребляютъ ввидѣ настоя, изъ него выжимаютъ сокъ и приготавливаютъ воду, также настаиваютъ растение на бѣломъ винѣ. Винную настойку даютъ внутрь при глазныхъ болѣзняхъ; также ею примачиваютъ глаза; для настоя берутъ 3 драхмы (12,0 грм.) сушеннаго растения, настаиваютъ 6-ю унцами (12-ю стол. л.) кипятка или винограднаго вина. Изъ отвара дѣтямъ дѣлаютъ ванны (въ Бессарабской губ.), внутрь даютъ отъ боли въ животѣ (въ Могилевской губ.), отъ грудной боли (въ Новгородской губ.), отъ горловой боли ввидѣ чая (Пековской губ.), отъ жабы (Москов. губ.), отъ грыжи (Владимирской губ.).

Въ гомеопатіи растение употребляется тоже отъ глазныхъ болѣзней, при катаррѣ слизистой оболочки глазъ, золотушномъ воспаленіи глазъ, при припуханіи слизистой оболочки и слепотѣ глазъ, при гнойномъ зараженіи глазъ, при свѣтобоязни, при постоянномъ слезотеченіи, при летающихъ мушкахъ передъ глазами, при колющихъ боляхъ въ глазномъ яблокѣ и въ углахъ глаза. Кромѣ того, растение это дается при кашлѣ, послѣ гриппа и при судорогахъ въ ногахъ.

Даютъ 1—2 капли чистой настойки или 1-го разведенія 2—3 капли нѣсколько разъ въ день. При глазныхъ болѣзняхъ, кромѣ внутренняго употребленія, настойкой обмываютъ глаза, и для примочки на 2—3 стол. ложки отварной воды берется отъ 10-ти до 15-ти капель чистой настойки.

Въ гомеопатической ветеринаріи врачи употребляютъ настойку также отъ воспаленія глазъ у животныхъ, въ особенности, если оно соединено съ заболѣваніемъ слизистой оболочки носа и если на роговой оболочкѣ появились пятна. Для животныхъ настойка употребляется только снаружи для обмываній и примочекъ на глаза; берется растворъ такой-же крѣпости, какъ для людей.

Очереть, см. Тростникъ обыкновенный (*Arundo Phragmites* L.).

Очереть, см. Вѣйникъ наземный (*Calamagrostis epigelos* Roth.).

Очи воловы, см. Астра дикая (*Aster Amellus* L.).

Очи-трава, см. Гвоздика пышная (*Dianthus superbus* L.).

Очи царскія, см. Ленъ кукушкинъ (*Polytrichum commune* L.).

Очижникъ } см. Очитокъ острый (*Sedum acre* L.).

Очипокъ }

Очипокъ, см. Заячья капуста (*Sedum Telephium* L.).

Очистникъ } см. Очитокъ острый (*Sedum acre* L.).

Очитки }

Очитки полевые, см. Рыжикъ полевняой (*Camellina sativa* Crantz.).

Очитокъ, см. Очитокъ острый (*Sedum acre* L.).

Очитокъ. см. Заячья капуста (*Sedum Telephium* L.).

Очитокъ бѣлый (*Sedum album* L.). Многолѣтнее травянистое растение изъ семейства «толстянковыхъ» (*Crassulaceae* Dc.), распространенное почти во всей Европѣ, въ Финляндіи, въ Прибалтійскихъ губерніяхъ, въ Крыму и на Кавказѣ, съ тонкимъ ползучимъ корневищемъ, выпускающимъ стелющіеся безплодные побѣги и приподнимающіеся цвѣтоносные стебли. Листья очередные, почти цилиндрическіе, мясистые. Цвѣтководное соцвѣтіе состоитъ изъ многочисленныхъ мелкихъ бѣлыхъ цвѣтѣвъ. Чашечка 5-тираздѣльная. лепестковъ 5, тычинокъ 10. Пестикъ состоитъ изъ 5-ти плодolistиковъ, расположенныхъ кольцомъ и заканчивающихся столбиками. Плодъ — сложная листовка, раскрывающаяся вдоль внутренняго шва. Цвѣтетъ во второй половинѣ лѣта. Произрастаетъ на сухихъ песчаныхъ и каменистыхъ мѣстахъ, въ тѣсахъ и между кустарниками. (Рис. 206.)

Очитокъ заячій, см. Заячья капуста (*Sedum Telephium* L.).

Очитокъ острый (*Sedum acre* L.). Фармацевтическое названіе: *Sedum acre* s. *minimus*, s. *vermiculare*, s. *illicebra* (Herba). Барашки (Курск.), Бурачки (Кіев.), Гонецъ, Гонецъ, Грыжная трава (Волог., Двиг.), Гусинецъ (Тв.), Гусиное мыло (Ниж.), Гусиная плоть (Вор., Тар.), Иабриль (Курск.), Лихорадочная трава (Ряз., Кал.), Мокрытникъ (Влад.), Молодиль, Молодень (Кіев., Подол.), Молодилица (Волог.) и изм. Молодишникъ, Молодильникъ, Молодильная трава, Моложай и ошиб. Мотодиль, Мошначъ (Малорос.), Нарубашень, Очижникъ, Очитокъ, Очитки (Мал.), Очистникъ, Перець дикий, Перець длинный, Ёдкій, Плеточка (Волог.), Прищеница, Пьяница (Могил.), Раскидникъ или Расходникъ малый (Малор.), Румянило (Черн.), Сердечная трава (Перм.), Утробашень, Чистикъ (Малор.), Шинкачъ (Мал.), Ядренецъ (Могил.). Многолѣтняя трава изъ семейства «толстянковыхъ» (*Crassulaceae* Dc.), образующая дерновинки, выш. 1—3½ вершк., распространенная почти во всей Европѣ и во всей Россіи, съ приподнимающимися цвѣтоносными стеблями. Листья маленькіе, сидячіе, яйцевидно-цилиндрическіе, съ тупымъ основаніемъ; на короткихъ безплодныхъ побѣгахъ они сидятъ тѣсно, образуя 6 неясныхъ рядовъ. Цвѣты почти сидячіе, желтые, въ конечныхъ кистяхъ. Чашечка 5-тираздѣльная; лепестковъ 5; тычинокъ 10; пестикъ состоитъ изъ 5-ти плодolistиковъ, заканчивающихся короткими столбиками, при основаніи сросшихся между собою и расположенныхъ кольцомъ. Плодъ — сложная листовка, раскрывающаяся вдоль внутренняго шва. Цвѣтетъ съ мая по июль. Растетъ на каменистыхъ и песчаныхъ мѣстахъ. Острый сокъ свѣжей травы производить на кожѣ воспаленіе и пузыри. (Табл. XXXV, фиг. 195.)

МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНІЕ. Въ прежнее время растение употреблялось врачами отъ надучей болѣзни, отъ болѣзни пузыря, водянки и перемежающейся лихорадки, затѣмъ было оставлено. Теперь оно опять предлагается заграничными врачами, какъ средство отъ эпилепсіи. Изъ растенія готовится спиртная вытяжка;

въ крестьянскомъ быту изъ листьевъ приготавливаютъ отваръ или сушеные листья принимаются ввидѣ порошка. Горсть свѣжей травы, собранной до цвѣтенія, варится въ фунтѣ ($\frac{1}{2}$ бутылки) молока или пива, уваривается до половины, затѣмъ отваръ процеживается и принимается 2—3 раза въ день по маленькой чайной чашкѣ. Свѣжій сокъ растения дается по столовой ложкѣ; по наблюдениямъ народнымъ, онъ помогаетъ отъ малокровія, желтухи и въ началѣ водняной болѣзни. Отъ падучей даютъ сушеные листья въ порошокъ по 15-ти гранъ съ сахаромъ утромъ и вечеромъ. Лечение это для полученія успѣха должно продолжаться не менѣе трехъ мѣсяцевъ. Наружное употребленіе очитка тоже довольно обширно. Толченые свѣжіе листья прикладываются къ мозолямъ; траву варятъ съ пивомъ для припарокъ, которыя накладываются на больные стяннутые суставы цынготныхъ больныхъ. Свѣжая толченая трава въ нѣкоторыхъ мѣстахъ прикладывается къ раковымъ язвамъ, которыя очипаются. Смѣшанный съ коровинымъ масломъ сокъ служитъ хорошимъ средствомъ, уничтожающимъ сыпь и гнойныя корки на головѣ.

Очки воловьи, см. Девясилъ иволжистый (*Inula salicina* L.).

Очко воронье, см. Истодъ обыкновенный (*Polygala vulgaris* L.).

Очки курячі, см. Воробьиное просо полевое (*Anagallis arvensis* L.).

Очки жаби, см. Незабудка болотная (*Myosotis palustris* With.).

Очникъ, см. Колокольчикъ крапиволистный (*Campanula Trachelium* L.).

Очный корень, см. Валериана лекарственная (*Valeriana officinalis* L.).

Очный цвѣтъ, см. Воробьиное просо полевое (*Anagallis arvensis* L.).

Очная помощь } см. Очанка лекарственная (*Euphrasia officinalis* L.).

Очная трава }

П.

Паболоки, см. Конопля полевая, или обыкновенная (*Cannabis sativa* L.).

Павани-вѣчки, см. Незабудка болотная (*Myosotis palustris* With.).

Павія красная, см. Капитанъ конскій красный (*Aesculus Pavia* L.).

Павунъ, см. Вахта трилистная (*Menyanthes trifoliata* L.).

Павутиця, см. Вьюнокъ полевой (*Convolvulus arvensis* L.).

Пагкаутовое дерево, см. Гваяковое дерево (*Guajacum officinale* L.).

Падма, см. Бадма (*Nelumbium caspicum* Fisch.).

Падубница, см. Земляника лѣсная (*Fragaria vesca* L.).

Падубъ, см. Ясень обыкновенный (*Fraxinus excelsior* L.).

Падубъ, см. Падубъ обыкновенный (*Ilex aquifolium* L.).

Падубъ обыкновенный (*Ilex aquifolium* L.). Фармацевтическое название: *Aquifolium* s. *Agrifolium* (Folia et Bacca). Вязожелдь,

Водолістъ, Водолістникъ, Дерево остролиственное, Ежовникъ, Желдь, Іозъ, Клей птичій, Клей древесный (Сл. Ц.) Острокоръ, Острокровъ, Остролистъ, Остролистникъ, Падубъ, Терновникъ, Чесмина. Вѣчно-зеленый сильно вѣтвистый кустарникъ изъ семейства «падубовыхъ» (*Aquifoliaceae*), распространенный въ Европѣ и встрѣчающійся въ лѣсахъ на Кавказѣ, выш. до 4 саженъ. Листья коротко-черенковые, кожистые, блестящіе, волнистые, выемчато-колюче-зубчатые. Цвѣты мелкіе, бѣлые, въ густыхъ пазушныхъ пучкахъ. Плодъ—темно-красныя костянки. Цвѣтетъ въ маѣ и юнѣ. Разводится въ садахъ, отъ сѣмянъ, любитъ глинисто-песчаную почву, выходитъ по посѣвѣ сѣмянъ только на третій годъ. Запахъ его слабый, нѣсколько напоминаетъ терпентинъ, листья на вкусъ горькіе, непріятные и клейкіе отъ липкаго вещества, извѣстнаго подъ названіемъ птичьяго клея, растворимаго легко только въ винномъ спиртѣ; большое количество этого вещества находятъ также въ дубѣ дерева; для полученія его сдираютъ дубъ въ іюлѣ мѣсяцѣ, варятъ его въ водѣ въ теченіе 7—8 часовъ, послѣ чего скатываютъ его въ комъ, который въ теченіе 15—20 дней гноятъ въ сыромъ мѣстѣ. По прошествіи этого времени его толкутъ въ ступкѣ, пока не получается родъ слизистаго тѣста, которое перемываютъ въ свѣжей водѣ, чтобы отдѣлить все постороннія вещества, и кладутъ на 4—5 дней въ горшокъ, чтобы съ него сошла глина; наконецъ, перекладываютъ въ другіе горшочки и хранятъ для употребленія. Изъ него готовится клей. Плотная зеленовато-бѣлая древесина употребляется въ токарномъ дѣлѣ. (Р и с. 207.)

МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНІЕ. Падубъ обыкновенный прежде употреблялся въ медицинѣ, особенно ягоды его отъ эпилепсін; въ настоящее время растеніе почти оставлено.

Пажить гусиная, см. Гусиная ланка (*Potentilla anserina* L.).

Пазабникъ

Паздника

Паземка

Паземника

Пазеника

Пазменка

Пазная трава } см. Пазникъ крапчатый (*Achyrophorus maculatus* Scop.).

Пазникъ

Пазникъ гладкій (*Hypochaeris glabra* L.). Однолѣтнее травянистое растеніе изъ семейства «сложноцвѣтныхъ» (*Compositae* Adans.), распространенное въ средней и южной Европѣ, встрѣчающееся на песчаныхъ мѣстахъ въ Привислянскомъ краѣ и Литвѣ, выш. $3\frac{1}{2}$ —7 вершк., съ прикорневыми выемчато-зубчатыми голыми листьями, собранными розеткой. Каждый цвѣточный стебель несетъ по 2 желтыхъ корзинки, сидящихъ на длинныхъ ножкахъ. Обертка корзинки состоитъ изъ наружныхъ гладкихъ и внутреннихъ широко-перепончатыхъ листочковъ. Общее цвѣтоложе покрыто пленчатыми прицвѣтниками. Вѣнчикъ у всехъ

цвѣтовъ язычковый. Тычинокъ 5; завязь нижняя одногнѣздная, односѣмянная, съ однимъ столбикомъ. Плодъ—сѣмянки, изъ которыхъ среднія снабжены носикомъ, почти одинаковой съ ними длины. Цвѣтетъ лѣтомъ и осенью. Растетъ на песчаныхъ мѣстахъ. (Рис. 208.)

Пазникъ крапчатый (*Achyrophorus maculatus* Scop.). Фармацевтическое название: *Costa* (Herba), *Costus nostratus* (Herba et Fl.). Боровикъ глухой (Клев.), Петрова закуска (Малор.), Пазная трава, Пазникъ, Прозалникъ (Вятск.), Свинка, Травка баранья, Туговка (Вор.), Ястребиная трава, Ястребка мохнатая. Многолѣтнее травянистое растение изъ семейства «сложноцвѣтныхъ» (*Compositae* Adans.), распространенное въ сѣверной и средней Европѣ, въ сѣверной и средней Россіи, рѣже встрѣчающееся на югѣ, съ прикорневыми продолговатыми, къ основанію сужеными, выемчато-зубчатыми шершавыми листьями и простымъ шершавымъ стеблемъ, съ одной корзинкой желтыхъ цвѣтовъ или съ 1—2 длинными вѣтвями, несущими по одной корзинкѣ, и съ 1—2 небольшими листьями. Корзинка крупная колокольчатая на длинной, наверху мало утолщенной, ножкѣ; обертка корзинки состоитъ изъ наружныхъ ланцетныхъ, черноватощетинистыхъ и внутреннихъ линейно-ланцетныхъ, наверху, по краямъ, желтовато-войлочныхъ листочковъ. Общее цвѣтоложе покрыто пленчатыми прицвѣтниками. Чашечка 5-тизубчатая. Вѣнчикъ язычковый, превышающій прицвѣтникъ. Тычинокъ 5; завязь нижняя одногнѣздная, съ однимъ столбикомъ. Плодъ—сѣмянки съ хохолкомъ, состоящимъ изъ одного ряда перистыхъ волосковъ. Цвѣтетъ въ началѣ лѣта. Растетъ между кустарниками, на лугахъ и въ рощахъ.

МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНІЕ извѣстно только въ народѣ. Листья прикладываются къ ранамъ. Цвѣты продаются иногда вмѣсто арники.

Пазникъ укореняющійся (*Hypochaeris radicata* L.). Многолѣтнее травянистое растение изъ семейства «сложноцвѣтныхъ» (*Compositae* Adans.), распространенное почти во всей Европѣ, встрѣчающееся въ западной Россіи. Стебель, выш. 7—14 вершк., голый, безлистный, съ 2—3 довольно крупными желтыми корзинками на длинныхъ ножкахъ и съ прикорневыми узкими выемчато-зубчатыми или выемчато-надрѣзанными листьями, съ обѣихъ сторонъ шершаво-волосистыми и съ средней желтовато-бѣлою жилкой. Общее цвѣтоложе покрыто пленчатыми прицвѣтниками. Всѣ цвѣты язычковые. Тычинокъ 5; завязь нижняя одногнѣздная, односѣмянная, съ однимъ столбикомъ. Плодъ—сѣмянка, продолженная кверху въ длинный носикъ, почти вдвое превышающій сѣмянку, снабженную хохолкомъ; внутренніе волоски хохолка перистые. Цвѣтетъ лѣтомъ. Растетъ на лугахъ, между кустарниками и въ лѣсахъ.

МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНІЕ. Этотъ видъ пазника, равно какъ и пазникъ гладкій, имѣетъ слегка горьковатый вкусъ и слабительное дѣйствіе; въ медицинѣ почти не употребляется.

- Пазобника }
 Пазобникъ } см. Земляника лѣсная (*Fragaria vesca* L.).
 Пазубника }
 Пазынока }
- Пакленокъ, см. Кленъ полевой (*Acer campestre* L.).
 Пакленъ, см. Кленъ полевой (*Acer campestre* L.).
 Пакленъ, см. Кленъ обыкновенный (*Acer platanoides* L.).
 Пакленъ, см. Кленъ татарскій (*Acer tataricum* L.).
 Паклина, см. Кленъ полевой (*Acer campestre* L.).
 Паклинокъ, см. Кленъ татарскій (*Acer tataricum* L.).
 Паклунъ, см. Параличная трава (*Ajuga Chamaepitys* L.).
 Паклунъ, см. Барбарисъ обыкновенный (*Berberis vulgaris* L.).
 Палисандровое дерево (*Jacaranda* L.). Дерево, родомъ изъ Южной Америки. Крѣпкая прочная древесина шоколаднаго оттѣнка, извѣстная подъ названіемъ палисандроваго, якарандоваго или бразильскаго розоваго дерева, употребляется въ столярномъ дѣлѣ, особенно въ качествѣ подѣлочнаго матеріала.
- Палки, см. Рогоза широколистная (*Typha latifolia* L.).
 Палочка Христова, см. Короставникъ полевой (*Scabiosa arvensis* L.).
 Палочка чертова, см. Рогоза широколистная (*Typha latifolia* L.).
 Палочная трава, см. Ежа сборная (*Dactylis glomerata* L.).
 Палочная трава, см. Дубровникъ обыкновенный (*Teucrium Chamadrys* L.).
 Палочникъ, см. Ежа сборная (*Dactylis glomerata* L.).
 Палочникъ, см. Тимофеевка (*Phleum pratense* L.).
 Палочникъ, см. Рогоза узколистная (*Typha angustifolia* L.).
 Палочникъ, см. Рогоза широколистная (*Typha latifolia* L.).
 Палошникъ, см. Касатикъ водяной (*Iris pseudacorus* L.).
 Палутыця, см. Вьюнокъ полевой (*Convolvulus arvensis* L.).
 Палынъ, см. Полынъ горькая (*Artemisia absinthium* L.).
 Пальма, см. Бальзаминъ (*Balsamina hortensis* L.).
 Пальма, см. Самшитъ обыкновенный (*Buxus sempervirens* L.).
 Пальма, см. Финиковая пальма (*Phoenix dactylifera* L.).
 Пальма восковая (*Ceroxylon andicola* Humb.). Одна изъ высочайшихъ пальмъ Востъ-Индіи, выделяющая изъ ствола родъ блѣдно-желтаго воска, который, подобно лаку, покрываетъ дерево; изъ содранной коры также вывариваютъ этотъ пальмовый воскъ, имѣющій примѣненіе, подобное пчелиному, и въ громадномъ количествѣ препровождаемый изъ Америки въ Европу. Съ cadaго дерева добываютъ до 25 ф. воска.
- Пальма капустная, см. Капустная пальма (*Areca oleracea* L.).
 Пальма кокосовая, см. Кокосовая пальма (*Cocos nucifera* L.).
 Пальма Ротангъ, см. Тростниковая пальма (*Calamus Rotang* Willd.).
 Пальма сахарная, см. Саговая пальма (*Arenga saccharifera* Labill.).
 Пальма тростниковая, см. Тростниковая пальма (*Calamus Rotang* Willd.).

Пальма финиковая, см. Финиковая пальма (*Phoenix dactylifera* L.).

Пальма Христова, см. Клещевина обыкновенная (*Ricinus communis* L.).

Пальмовое дерево, см. Финиковая пальма (*Phoenix dactylifera* L.).

Пальмовый кустъ, см. Самшитъ обыкновенный (*Buxus sempervirens* L.).

Пальцева-травя, см. Ежа сборная (*Dactylis glomerata* L.).

Пальцы медвѣжьи, см. Серпуха въщелосная (*Serratula coronata* L.).

Пальчатка, см. Росичка (*Panicum sanguinale* L.).

Пальчикъ, см. Синеголовникъ плосколистный (*Eryngium planum* L.).

Пальчикъ дѣвичій, см. Язвенникъ обыкновенный (*Anthyllis vulneraria* L.).

Пампаская трава (*Gynerium argenteum* L.). Южно-американское растение, въ систематическомъ отношеніи приближающееся къ тростнику; разводится для декоративныхъ цѣлей; красивыя серебристо-блестящія метелки его идутъ на букеты.

Панна-дзиванна, см. Коровякъ черный (*Verbascum nigrum* L.).

Папава, см. Цикорій обыкновенный (*Cichorium Intybus* L.).

Папавка, см. Пушавка красильная (*Anthemis tinctoria* L.).

Папайя (*Papaya vulgaris* Dc. sin. *Carica Papaya* L.). Гонду, Ястре-нипа или сухая фи́га-травя, Дынное дерево. Дерево изъ Южной Америки, съ высокимъ невѣтвистымъ стволомъ, несущимъ на-верху корону пальчато-раздѣльныхъ листьевъ, въшнимъ ви-домъ напоминающихъ листья клещевины, и съ дынеобразными мясистыми повислыми плодами. Культивируется съ успѣхомъ во всѣхъ тропическихъ странахъ. Плоды, напоминающие и вку-сомъ, и видомъ дыню, употребляютъ въ пищу сырыми и варе-ными. Незрѣлые плоды доставляютъ вкусный маринадъ, а зерна ихъ употребляютъ, какъ пряность. Млечный сокъ, который содер-жится не только въ плодахъ, но и во всѣхъ частяхъ дерева, смѣшанный съ масломъ, употребляется, какъ средство противъ кожныхъ болѣзней. Сокъ замѣчателенъ еще тѣмъ, что заклю-чаетъ въ себѣ пепсинъ. Листья употребляютъ, какъ мыло. Изъ волоконъ ствола выдѣлываютъ веревки и различныя плетенія. Черезчуръ мягкая древесина не годится ни какъ строитель-ный, ни какъ подѣлочный матеріалъ.

Папарить } см. Орлякъ обыкновенный (*Pteris aquilina* L.).

Папарникъ }
Папартникъ, см. Папоротникъ черный (*Struthiopteris germa-nica* L.).

Папарыць }
Паперать } см. Орлякъ обыкновенный (*Pteris aquilina* L.).

Папертникъ }
Паперть }
Паперть, см. Кочедыжникъ обыкновен. (*Aspidium Filix femina* Bernh.).

Паперци, см. Кочедыжникъ обыкновенный (*Aspidium Filix femina Bernh.*).

Папикъ, см. Синеголовникъ равнинный (*Eryngium planum L.*).

Папиръ

Папиртникъ } см. Орлякъ обыкновенный (*Pteris aquilina L.*).

Папирусъ (*Cyperus Papyrus L.*). Египетская трава. Растение, весьма распространенное у древнихъ египтянъ, произрастающее въ дельтѣ Нила. Изъ него приготовляли папирусъ, замѣнявший теперьшнюю бумагу для письма, и цѣнили чрезвычайно дорого. Въ настоящее время растение встрѣчается только въ Сиріи и въ Сициліи.

Папокъ красный, см. Черноголовка обыкновенная (*Prunella vulgaris L.*).

✓ **Папоротникъ**, см. Кочедыжникъ обыкновенный (*Aspidium Filix femina Bernh.*).

✓ **Папоротникъ**, см. Многоножка обыкновенная (*Polypodium vulgare L.*).

✓ **Папоротникъ**, см. Орлякъ обыкновенный (*Pteris aquilina L.*).

Папоротникъ, см. Пижма (*Tanacetum vulgare L.*).

✓ **Папоротникъ водяной**, см. Орлякъ обыкновенный (*Pteris aquilina L.*).

✓ **Папоротникъ дубовый**, см. Многоножка тройчатая (*Polypodium dryopteris L.*).

✓ **Папоротникъ еланный**, см. Орлякъ обыкновенный (*Pteris aquilina L.*).

✓ **Папоротникъ женскій**, см. Орлякъ обыкновенный (*Pteris aquilina L.*).

✓ **Папоротникъ каменный**, см. Многоножка обыкновенная (*Polypodium vulgare L.*).

Папоротникъ мужской, см. Щитникъ большой (*Aspidium Filix mas Sw.*).

Папоротникъ обыкновенный, см. Кочедыжникъ обыкновенный (*Aspidium Filix femina Bernh.*).

Папоротникъ сладкій, см. Многоножка обыкновенная (*Polypodium vulgare L.*).

Папоротникъ солодковый, см. Многоножка обыкновенная (*Polypodium vulgare L.*).

Папоротникъ черновой } см. Щитникъ большой (*Aspidium*

Папоротникъ черный } *Filix mas Sw.*).

Папоротникъ черный, см. Кочедыжникъ обыкновенный (*Aspidium Filix femina Bernh.*).

Папоротникъ черный (*Struthiopteris germanica W.*). Вороново крыло (Тул.), Клоповникъ (Арх.), Коточияница (Костр.), Капародъ, Калорко (Вятск.), Купородникъ (Даль), Папороть крупный, Папороть черный тр., Папороть рѣчная (Перм.), Папорть (Пет.), Папартникъ (Олон.), Перо страусова трава, Разнолистникъ, Черная трава (Каз.). Самый крупный изъ нашихъ папоротниковъ, распространенный въ Европѣ, въ Азіи и сѣверной Америкѣ, въ средней и сѣверной Россіи. Листья у него двоякаго

рода: одни бесплодные, очень крупные (дл. $1\frac{1}{2}$ — $2\frac{1}{2}$ арш.), почти прямостоящие, собраны ввидѣ воронки. Въ очертаніи они продолговатые, кверху заостренные. Пластинки изъ перисто-разѣченныхъ съ линейно-ланцетными, глубоко-перисто-раздѣльными сегментами. Плодоносные листья, появляющіеся среди воронки, гораздо меньшихъ размѣровъ, буровато-коричневаго цвѣта; пластинка ихъ не развивается нормально; края ея сегментовъ остаются свернутыми до самаго срединнаго нерва и скрываютъ многочисленные спорангіи, т. е., вмѣстилища для споръ. Растетъ въ сырыхъ лѣсахъ.

МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНІЕ. Папоротникъ употребляется въ народной medicinѣ отъ глистовъ и отъ лихорадки (въ Казанской губ.). Въ Пермской губерніи отваръ корня пьютъ отъ худобы. **Папороть**, см. Кочедыжникъ обыкновенный (*Aspidium Filix femina* Bernh.).

Папороть, см. Щитникъ большой (*Aspidium Filix mas* Sw.).

Папороть, см. Многоножка обыкновенная (*Polypodium vulgare* L.).

Папороть, см. Гусиная лапка (*Potentilla anserina* L.).

Папороть, см. Орлякъ обыкновенный (*Pteris aquilina* L.).

Папороть бороной, см. Кочедыжникъ обыкновенный (*Aspidium Filix femina* Bernh.).

Папороть домашній, см. Дубровка (*Veronica Chamaedrys* L.).

Папороть душистый, см. Жимолость вьющаяся (*Lonicera Periclymenum* L.).

Папороть жиноча, см. Кочедыжникъ обыкновенный (*Aspidium Filix femina* Bernh.).

Папороть каменный, см. Многоножка тройчатая (*Polypodium dryopteris* L.).

Папороть крупный, см. Папоротникъ черный (*Struthiopteris germanica* L.).

Папороть рѣчная, см. Папоротникъ черный (*Struthiopteris germanica* L.).

Папороть холостая, см. Орлякъ обыкновенный (*Pteris aquilina* L.).

Папороть черная, см. Папоротникъ черный (*Struthiopteris germanica* L.).

Папортникъ, см. Орлякъ обыкновенный (*Pteris aquilina* L.).

Папортовое дерево, см. Осокоръ обыкновенный (*Populus nigra* L.).

Папортъ, см. Папоротникъ черный (*Struthiopteris germanica* W.).

Папортъ, см. Кочедыжникъ обыкновенный (*Aspidium Filix femina* Bernh.).

Папортъ, см. Орлякъ обыкновенный (*Pteris aquilina* L.).

Папочная трава, см. Мелисса лекарственная (*Melilotus officinalis* L.).

Папуша, см. Кукуруза обыкновенная (*Zea Mays* L.).

Папушникъ, см. Махорка (*Nicotiana rustica* L.).

- Папушня**, см. Кукуруза обыкновенная (*Zea Mays* L.).
- Парагвайскій чай**, см. Чайное ложное дерево (*Plex Gorgonha* Lamb.).
- Параличная рѣпа-трава**, см. Переступень бѣлый (*Bryonia alba* L.).
- Параличная трава**, см. Живучка ползучая (*Ajuga reptans* L.).
- Параличная трава** (*Ajuga Chamaepitys*, sin. *Ajuga Chia*.). Фармацевтическое название: *Chamaepitys*, *Herba arthritica*, vel *arthritica*. Богородичное зелье (Екат.), Ива, Кадило, Пахлунъ, Пахлунъ, Перелстъ (Тавр.), Повѣтренная трава, Сутловка (Сл. Церк.), Кипарисникъ, Ладанка. Многолѣтнее почти полукустарниковое растеніе изъ семейства «губоцвѣтныхъ» (*Labiatae* Juss.), распространенное въ южной и средней Европѣ, въ южной Россіи, въ Крыму и Закавказьѣ. Стебель съ мохнатыми междоузліями. Нижніе листья лопатчато-линейные, цѣльные, или на верхушкѣ 3-хлопастные, прочіе 3-храздѣльные, верхушечные глубоко-3-храздѣльные, съ линейными, цѣльно-крайними долями. Цвѣты желтые, одиночные, пазушные. Чашечка, какъ и листья, усажена длинными, жесткими волосками, до середины остро-5-тизубчатая, съ верхнимъ менѣе крупнымъ зубцомъ. Вѣнчикъ желтый, снаружи пушистый, съ пурпуровыми штрихами на трубчкѣ, которая въ 4—5 разъ длиннѣе чашечки, съ короткою выемчатою или 2-храздѣльною верхнею и 3-хлопастною нижнею губой, средняя лопасть которой крупная, обратно-сердцевидная. Тычинокъ 4, изъ которыхъ 2 боковыя длиннѣе двухъ остальныхъ; гнѣзда пыльниковъ расходящіяся, потомъ сливающіяся между собой. Завязь 4-гнѣздная, 4-хлопастная, съ подпестичнымъ дискомъ и срединнымъ столбикомъ. Плодъ по созрѣваніи распадается на 4 продолговатыхъ, морщинистыхъ орѣшка. Цвѣтетъ лѣтомъ. Растетъ главнымъ образомъ на поляхъ и въ степяхъ.
- МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНІЕ.** Параличная трава прежде употреблялась въ медицинѣ, какъ сильное проносное и мочегонное средство, теперь оставлена.
- Параличникъ**, см. Крестовникъ обыкновенный (*Senecio vulgaris* L.).
- Парамонъ**, см. Поповникъ обыкновенный (*Chrysanthemum Leucanthemum* L.).
- Паречка**, см. Смородина красная (*Ribes rubrum* L.).
- Паржидло**, см. Медунца (*Spiraea ulmaria* L.).
- Паридова трава**, см. Вороній глазъ (*Paris quadrifolia* L.).
- Парило**, см. Ренишокъ обыкновенный (*Agrimonia Eupatorium* L.).
- Парило**, см. Медунца (*Spiraea ulmaria* L.).
- Пармелія морщинистая** (*Parmelia caperata* Ach., sin. *Impriscaria caperata* DC.). Дубовая лапа, Дубовая лапка, Тарчовникъ. Широко распространенный лишайникъ, сѣрый, снизу черноватый, съ красновато-бурыми апотеціями (блюдцевидныя вместилища сумокъ со спорами), растущій на корѣ деревьевъ и на камняхъ.

Пармелія постѣнная (*Parmelia parietina* Ach., sin. *Physcia parietina* Kbr.). Дубовая лапа, лапка, Тарчовникъ. Желтый или оранжевый широко распространенный листовидный лишайникъ (имѣющій видъ развѣтвленныхъ листовыхъ пластинокъ), развивающійся въ видѣ розетки. Встрѣчается на корѣ деревьевъ, на камняхъ, деревянныхъ крышахъ и т. п.

Парнассія, см. Велозоръ болотный (*Parnassia palustris* L.).

Парникъ, см. Репяшокъ обыкновенный (*Agrimonia Eupatorium* L.).

Паровица, см. Залпникъ клубненосный (*Phlomis tuberosa* L.).

Паровица, см. Звѣздчатка злачная (*Stellaria graminea* L.).

Паровница, см. Марь обыкновенная (*Chenopodium album* Moqu.).

Паролистникъ, см. Ярмолистъ (*Zygophyllum Fabago* L.).

Парфенка } см. Картофель (*Solanum tuberosum* L.).

Парфенчы }
Парыло, см. Репяшокъ обыкновенный (*Agrimonia Eupatorium* L.).

Парышъ, см. Гречиха спорышъ, или гречиха птичья (*Polygonum aviculare* L.).

Паръчка } см. Смородина красная (*Ribes rubrum* L.).

Паръчъ }
Пасленъ, см. Пасленъ сладко-горькій (*Solanum dulcamara* L.).

Пасленъ, см. Пасленъ черный (*Solanum nigrum* L.).

Пасленъ гадючій } см. Пасленъ сладко-горькій (*Solanum*

Пасленъ-глысникъ } *dulcamara* L.).

Пасленъ сладко-горькій (*Solanum dulcamara* L.). Фармацевтическое назв.: *Amara dulcis* (*Spirites* s. *Lignum*), *Dulcamara* (*Caules*).

Будь-дерево, Бирючьи ягоды (Самар.), Волчьи ягоды, Вовчи ягоды (Малор.), Вороньи ягоды (Волг.), Гадючья трава (Весс.), Гадючьи

ягоды (Сл. Ц.), Глестникъ (Южн. Росс.), Глыстныхъ, Глестовникъ

(б. ч. Росс.), Глестикъ, Горько-сладо, Заплица (Сл. Ц.), Заслиха

(Новор., Палм.), Золотуха (Северг.), Куричьи слѣпота (Самар.),

Лазиха (Вят.), Лозига, Мать-трава, Медвѣжьи ягоды (Смол.),

Надтнникъ (Малор.), Надтынникъ (Укр., Кален.), Натнникъ

(Даль), Пасленъ, Паслигъ, Паслюнъ (Малор.), Пасленъ, Послѣнь,

Пясликъ (Сл. Ак.), Пасленъ гадючій, Пасленъ-глысникъ (Вол.

Под.), Песій гроздь (Сл. Церк.), Плетняковая трава. Подживот-

никъ (Урал.). Песники (Сл. Ц.), Сладко-горькія песники, Собачьи

ягоды (Тобол.), Сорочьи ягоды (Сар., Влад.), Сорочьи сережки,

Почная тѣнь, Почная стѣнь, Сластиха, Солодка (Кал., Костр.),

Солодкогогорькая, или сладкогогорькая трава, Сладкогогорькъ, Пасмур-

ница (Даль). Полукустарниковое голое или слегка пушистое

растеніе изъ семейства «пасленовыхъ» (*Solanaceae* Juss.), распро-

страненное почти во всей Европѣ и во всей Россіи. Стебель

деревянистый, изгибистый, лежащій или вьющійся и тогда до-

стигающій до 1 с. длины. Листья черенковые, продолговато-

яйцевидные, заостренные, при основаніи обыкновенно сердце-

видные, часто 2—3-храздѣльные, причемъ конечная доля крупнѣе

боковыхъ. Фиолетовые цвѣты въ зонтикообразныхъ метелкахъ.

Чашечка 5-тилопастная, 5-тизубчатая; вѣнчикъ звѣздчатый, 5-тилопастный. Тычинокъ 5, съ крупными золотисто-желтыми пыльниками, сложенными конусомъ. Завязь верхняя 2-хгнѣздная, съ однимъ столбикомъ, несущимъ головчатое рыльце. Плодъ—яйцевидный красный повислая ягода. Цвѣтетъ лѣтомъ. Растетъ на влажныхъ, тѣнистыхъ мѣстахъ, по берегамъ рѣкъ и между кустарниками. Причисляется къ числу ядовитыхъ растений. (Табл. XXXVIII, фиг. 214.)

МЕДИЦИННОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ. Свѣжіе листья цвѣтущаго паслена сладкогорькаго, имѣющіе непріятный запахъ, напоминающій запахъ мускуса, и солоно-горькій вкусъ, содержатъ въ себѣ сильно дѣйствующее вещество, называемое соланинъ; приемъ его въ количествѣ 1 драхмы (4,0 грм.) вызываетъ сильную рвоту. Прежніе врачи употребляли листья его снаружи, какъ болеутоляющее средство. Теперь оно совершенно оставлено.

Въ гомеопатіи спиртная настойка употребляется отъ водянки и зудящихъ сыпей.

Пасленъ черный (*Solanum nigrum* L.). Бздника (Вел. Росс.), Бздникъ (Урал.), Бзднюка (Укр.). Бздюха (Орл.), Здиха, Поздника, Позникъ-бзника (Под.), Базника (во всемъ Урал. войскѣ), Жибзника, Бездушная трава (Влад.), Волчьи ягоды (Могил.), Вороняшки (Симб.), Ворониха, Вороняга, Вороньи ягоды, Глистникъ, Пасленъ, Паслина, Паслинъ, Паслінь (Малор.), Паслі, Песль ягоды, Пислюква (Курск.), Пенки, Пенки черныя, Подсолнечникъ, Солнечникъ, Пислюка (Черн.), Сорочьи ягоды, Собачьи ягоды (Могил.). Однолѣтнее травянистое растеніе изъ семейства «пасленовыхъ» (*Solanaceae* Juss.), распространенное почти во всей Европѣ и въ Россіи. Стебель выш. 7—22 вершк., съ разстопырными вѣтвями. Листья черешковые, яйцевидные, выемчато-зубчатые. Мелкіе бѣлые цвѣты въ ложныхъ зонтикахъ на концахъ короткихъ вывѣзанныхъ цвѣтоносовъ. Чашечка 5-тизубчатая, съ широко-яйцевидными долями. Вѣнчикъ звѣздчатый, 5-тилопастный. Тычинокъ 5, съ золотисто-желтыми пыльниками, сложенными конусомъ. Завязь верхняя 2-хгнѣздная, съ однимъ столбикомъ съ головчатымъ рыльцемъ. Плодъ—шаровидныя черныя или зеленыя ягоды. Сорная ядовитая трава, встрѣчающаяся на огородахъ, поляхъ, садахъ и около дорогъ. Цвѣтетъ лѣтомъ и осенью. (Табл. XXXVIII, фиг. 211.)

Пасленъ, см. Пасленъ сладко-горькій (*Solanum dulcamara* L.).

Паслина } см. Пасленъ черный (*Solanum nigrum* L.).

Паслинъ } см. Пасленъ сладко-горькій (*Solanum dulcamara* L.).

Паслі } см. Пасленъ черный (*Solanum nigrum* L.).

Паслінь } см. Пасленъ сладко-горькій (*Solanum dulcamara* L.).

Пасмурица, см. Пасленъ сладко-горькій (*Solanum dulcamara* L.).

Пастернакъ, см. Пастернакъ огородный (*Pastinaca sativa* L.).

Пастернакъ огородный (*Pastinaca sativa* L.). Борецъ полевой, Борщъ полевой (Вятск.), Козелецъ (Тул.), Козелек (Орл.),

Тар.), Козельчикъ (Вор.), Козловникъ (Нижег.), Травя польный кропъ (Вил.), Корень олений большой трава, Оленья, или еленья трава, Пастернакъ, Пастернякъ, Постернакъ, Постырнякъ, Пу-стырнякъ, Пустарнякъ (Малор.), Поповники (Вят.), Стволю, Стволюе. Двудѣтное травянистое растеніе изъ семейства «зонтичныхъ» (*Umbelliferae* Juss.), распространенное почти во всей Европѣ и во всей Россіи. Стебель выш. 14—22½ вершк., угловато-бороздчатый. Листья перисто-разсѣченные, сверху блестящіе, снизу покрытые мягкими волосками; доли по краямъ съ острыми зубцами и болѣе или менѣе глубокими надрѣзами; конечная доля листа 3-хлопастная. Желтые мелкіе цвѣты въ сложныхъ зонтикахъ о 8—12 лучахъ, безъ обвертокъ и обверточекъ. Чашечка о 5-ти зубчикахъ; лепестковъ и тычинокъ по 5. Завязь нижняя 2-хлѣздная, на верхуникъ съ железистымъ дискомъ, выделяющимъ сладкій сокъ. Столбиковъ 2. Плодъ—овальная двусѣмянка, по созрѣваніи распадающаяся на 2 плода, съ 3-мя нитевидными средними и 2 краевыми крылатыми ребрышками. Цвѣтетъ съ іюля до сентября. Растетъ на сорныхъ мѣстахъ, на поляхъ, лугахъ и огородахъ. Разводится ради сочныхъ, сладковатыхъ ароматическихъ корней, употребляемыхъ въ пищу, какъ овощъ. Снять его на глубоко-взрытой, рыхлой и хорошо удобренной почвѣ. Сѣмена его имѣютъ довольно пріятный запахъ и употребляются иногда въ качествѣ приправы разныхъ кушаній. (Рис. 209.)

МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНІЕ. Душистые корни пастернака, отваренные въ молоко, считаются въ народѣ хорошимъ средствомъ для людей худосочныхъ и чахоточныхъ. Также отваръ его принимаютъ отъ лихорадки и болей при мочеиспусканіи.

Пастернякъ, см. Пастернакъ огородный (*Pastinaca sativa* L.).

Пастикъ, см. Горлець, раковая шейка (*Polygonum Bistorta* L.).

Пастушья сумка (*Capsella Bursa pastoris* Moench.). Фармацевтическое названіе: *Bursa pastoris*. Бабки. Бѣлень (Олон.), Воробьиное око (Укр.), Воробьева кашка (Екат., Херс.), Воробьиная кашница (Сарат.), Винчики, Пичакъ, Грицки (Малор.), Гречиха полевая (Вил.), Гречка полевая, Ершевъ глазъ, Чижовъ глазъ, Денежникъ (Вят.), Дикарка (Ниж.), Забихуха (Вят.), Зозульникъ (Под., Вол.), Кошелекъ, Кошелишка, Клоновникъ (Ниж.), Клопички (Мог.), Лебедець (Вор.), Могильная трава (Сар.). Мошонка (Даль), Мошоночникъ, Мишочки (Подол., Вол.), Пастушья трава, Помолочникъ (Малор.), Рижуха (Малор.), Рѣжуха (Умань), Рѣдишникъ льсвой (Ниж.), Сердечная трава, Сердочки (Архан.) Сумочникъ, Сѣрики, Сірики (Полтвѣе), Стрѣлки (Мог.), Сухотникъ (Полт.), Ташка-трава, Ташка-зелье, Ташникъ, Таткунъ (Вят.), Ярутка, Черевецъ, Червишникъ еловой (Полт.), Відъчервей (Малор.), Вехъ (Влад.), Пвалекъ, Валекъ (Каз.), Дикій лень (Хар.). Однодѣтное голое или покрытое волосками травянистое растеніе изъ семейства «крестоцвѣтныхъ» (*Cruciferae* Juss.), распространенное во всей Европѣ и во всей Россіи. Стебель простой или вѣтвистый, выш. 5—8½ вершк.; прикор-

новые листья, обыкновенно перисто-раздельные, собраны при основании стебля розеткой; стеблевые листья сидячие, цельные, иногда выемчато-зубчатые. Цветы белые, мелкие. Лепестковъ 4, расположенныхъ на-крестъ. Тычинокъ 10. Столбикъ короткий. Плодъ—треугольные, обратно-сердцевидные, узкоперегородчатые стручечки. Цвететъ съ марта до октября. Сорная трава, распространенная на поляхъ, огородахъ, около домовъ и дорогъ.

МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ. Трава пастушьей сумки употребляется въ народѣ отъ всякихъ кровотеченій; особенно хва-лится она отъ маточныхъ кровотеченій, также отъ лихорадки. Листья растений могутъ быть употребляемы въ пищу. Изъ сѣмянъ можетъ приготовляться горчица и получаться масло.

Пастушья трава, см. Пастушья сумка (*Capsella Bursa pastoris* Moench.).

Пасть львиная, см. Львиный зѣвъ большой (*Antirrhinum majus* L.).

Пататъ, см. Бататъ (*Batatas edulis* Chols.).

Патма, см. Бадма (*Nelumbium caspicum* Fisch.).

Паунъ, см. Горлецъ, раковая шейки (*Polygonum Bistorta* L.).

Пахлунъ, см. Параличная трава (*Ajuga Chamaepitys* L.).

Пахучая трава, см. Тысячелистникъ обыкновенный (*Achillea Millefolium* L.).

Пахучка, см. Яминникъ душистый (*Asperulo odorata* L.).

Пахучка, см. Пахучка обыкновенная (*Calamintha Clinopodium* L.).

Пахучка, см. Мята водяная (*Mentha aquatica* L.).

Пахучка обыкновенная (*Calamintha Clinopodium* Benth., sin. *Clinopodium vulgare* L., *Melissa Clinopodium* Benth.). Фармацевтическое названіе: *Clinopodium vulgare* s. *major* (Herba.). Базилекъ, Василекъ дикій, Василечки полевые, Бабки болотныя (Киевск.), Деревянка (Минск.), Душица глухая (Тул.), Душица малая, Душица-пахучка, Заяя трава, Змѣвикъ, Машки (Черн.), Мята кошачья (Курск.), Мята рубчатая (Ниж.), Пахучка, По-стельница обыкновенная. Свентоянникъ (Вил.), Синеголовникъ (Вор.), Шандра (Малор.), Шаружникъ (Даль), Шарунникъ (Пет.), Волосникъ (Бесс.), Жабріи (Ниж.), Чеснокъ конскій (Ниж.), Вы-рачка (Гродн.), Расходникъ (Хар.), Хмунякъ (Екат.). Многолѣтнее травянистое мохнатое растеніе изъ семейства «губоцвѣтныхъ» (*Labiatae* Juss.), распространенное почти во всей Европѣ и во всей Россіи. Стебель выпш. 7—14 вершк., прямостоящій, по-крытый мягкими волосками. Листья яйцевидные, по краямъ слабо-пильчатые, снизу блѣдно-зеленые; верхушечные—внизъ отогнутые. Пурпуровые цвѣты сидятъ въ большомъ числѣ му-товками (въ кольцахъ) и окружены волосистыми шиловидно-линейными прицвѣтниками; чашечка о 5-ти зубахъ, трубчатая, поникающая, двугубая; верхняя губа 3-зубчатая, нижняя 2-храздѣльная, внутри безъ волосистаго кольца; вѣничикъ съ выдающеюся изъ чашечки трубкою и двугубымъ отгибомъ; верхняя губа почти плоская, выемчатая, нижняя—3-хлопастная, съ болѣе широкою среднею лопастью; тычинокъ 4, сближенныхъ

подъ верхнюю губую. наружныя изъ нихъ длиннѣе внутреннѣхъ. Завязь верхняя 4-хлопастная, 4-хгнѣздная, съ срединнымъ столбикомъ, несущимъ 2-храздѣльное рыльце. Плодъ при созрѣваніи распадается на 4 овальныхъ, почти шаровидныхъ орѣшка. Цвѣтетъ во второй половинѣ лѣта; растетъ между кустарниками и по опушкѣ лѣсовъ.

МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНІЕ. Въ народной медицинѣ трава идетъ въ наборъ для настоя вина. Растеніе было предложено, какъ суррогатъ китайскаго чая.

Пахучка сухоягодная, см. Восковникъ обыкновенный (*Murica Gale L.*).

Пацерачка, см. Незабудка болотная (*Myosotis palustris With.*).

Пачули (*Plectranthus graveolens R. Br.*). Кустарниковое растеніе съ кистями синихъ цвѣтовъ изъ семейства «губоцвѣтныхъ» (*Labiatae Juss.*), родомъ съ Маскаренскихъ острововъ, содержитъ эфирное масло, изъ котораго готовится духи «пачули».

Певгъ, см. Пихта сибирская (*Abies sibirica Ledeb.*).

Пелунъ

Пелунъ } см. Полынъ (*Artemisia L.*).

Пелынъ

Пельтигера (*Peltigera venosa L.*) Вляиконоскока или Щитконоскока, Кожистый листовидно-развѣтвленный лишайникъ, сверху темно-зеленый, снизу темный, покрытый густымъ войлокомъ и усѣянный маленькими ямками. Встрѣчается на корѣ деревьевъ, рѣже на утесахъ, главнымъ образомъ—на горахъ.

Пеникница, см. Вѣтреница лютиковая (*Anemone ranunculoides L.*).

Пенязникъ, см. Луговой чай (*Lysimachia Nummularia L.*).

Пеонія кустъ цвѣточный, см. Пионъ обыкновенный (*Paeonia officinalis Retz.*).

Пералотъ, см. Арника горная (*Arnica montana L.*).

Первенецъ, см. Первоцвѣтъ лекарственный (*Primula officinalis Jacq.*).

Первоцвѣтка, см. Селезеночникъ очереднолистный (*Chrysosplenium alternifolium L.*).

Первоцвѣтъ, см. Первоцвѣтъ лекарственный (*Primula officinalis Jacq.*).

Первоцвѣтъ высокій (*Primula elatior Jacq.*). Аврикола (въ сад.). Многолѣтнее травянистое растеніе изъ семейства «первоцвѣтныхъ» (*Primulaceae Vent.*), распространенное въ средней Европѣ, встрѣчающееся изрѣдка въ западной Россіи, въ Крыму, на Кавказѣ и на Уралѣ, съ короткимъ корневищемъ и прикорневой розеткой изъ яйцевидныхъ морщинистыхъ; при основаніи сразу суженныхъ въ черешокъ, снизу пушистыхъ листьевъ. Цвѣточная стрѣлка, выш. $3\frac{1}{2}$ —7 вершк., несетъ зонтикъ свѣтложелтыхъ цвѣтовъ, почти безъ запаха. Чашечка 5-тилопастная, узкая цилиндрическая, съ ланцетными острыми долями. Вѣничикъ съ цилиндрическою трубкой, расширенной у мѣста прикрѣпленія тычинокъ, и съ плоскимъ 5-тираздѣльнымъ

отгибомъ, свѣтло-желтый и въ зѣвѣ—ярко-желтый. Тычинокъ 5 супротивныхъ частями вѣнчика; пыльники находятся въ зѣвѣ вѣнчика. Завязь верхняя одногнѣздная; столбикъ съ головчатымъ рыльцемъ. Плодъ—коробочка, выдающаяся изъ чашечки, раскрывающаяся наверху зубцами. Цвѣтетъ весною. Растетъ между кустарниками и въ лѣсахъ. Разводится во многихъ видахъ въ садахъ. Употребляется такъ-же, какъ и первоцвѣтъ лекарственный. (См. ниже.)

Первоцвѣтъ лекарственный (*Primula officinalis* Jacq., sin. *Primula veris* L.). Фармацевтическое названіе: Rad. et Hib. Primulae veris s. Paralyseos, а корни—Radix Verbasculi pratensis s. Paradisiacae, s. Radix arthritica. Баранчики (Орл., Моск., Кал.), Баранцы (Кал., Курск.), Барашки (Моск.), Баранья трава, Кудель-барашки (Тамб.), Божьи ручки (Полт.), Божі-ручки (Малор.), Буквица бѣлая (Моск., Мог., Смол., Малор.). Буквица бѣлая (Волын.), Буквица бѣлая, Буквица желтая (Черниг.). Буквица зеленая, Вороньи глаза. Гарлуна (Орл.), Гасникъ, Гашникъ, Откосникъ (Смол.), Откашникъ (Смол.), Желтуха (Кіев.), Камчужная (Перм.), Ключики (Зап. Росс.), Козлечникъ (Курск.), Коровьи слезы, Котики, Куделька, Куритина (Курск.), Ледъ, Ледуночка, Лиферія желтая, Малквa желтая (Кіев.), Медяникъ, Медянички, Медяникъ-зелье, Медунка, Медяникъ-зілле (Малор.), Николайки (Кіев.), Опуцки, Лопуцки, Первенецъ (Волын., Под.), Первоцвѣтъ, Перелетъ (Малор.), Попутникъ, Пролеска (Екат.), Просерень, Растъ, Рястъ, Свербигузъ, Скороспѣлка, Снитка (Кал., Перм.), Стигнячки (Полт.), Сорочі лапки (Малор.). Многолѣтнее травянистое растение изъ семейства «первоцвѣтныхъ» (*Primulaceae* Vent.), распространенное въ Европѣ, въ сѣверной, средней, юго-западной Россіи и на Кавказѣ, съ короткими корневищемъ и прикорневой розеткой изъ яйцевидныхъ, городчатыхъ, морщинистыхъ, съ крылатыми черешками, листьевъ, снизу покрытыхъ бархатистымъ пушкомъ. Душистые желтыя цвѣты сидятъ зонтикомъ на верхушкѣ цвѣточный стрѣлки выш. отъ $3\frac{1}{2}$ — $11\frac{1}{2}$ вершк. Чашечка 5-лопастная, немного вздутая, съ яйцевидными заостренными лопастями. Вѣнчикъ, состоящій изъ цилиндрической трубочки и вогнутого 5-тираздѣльнаго отгиба, желтый, съ 5 оранжевыми пятнами въ зѣвѣ. Тычинокъ 5; столбикъ короткий, съ головчатымъ рыльцемъ. Завязь верхняя одногнѣздная. Плодъ—яйцевидная коробочка, которая короче чашечки. Цвѣтетъ весною. Растетъ на лугахъ, холмахъ и въ лѣсахъ. (Таб. XXXVI. фиг. 202.)

МЕДИЦИННОЕ УПОТРЕБЛЕНІЕ. Прежде растеніе употреблялось въ медицинѣ, теперь совсѣмъ оставлено. Цвѣты давались въ отварѣ ввидѣ чая при болѣзни груди, мигрени и головокруженіи. Въ смоленской губерніи зелень и корни варятъ въ молокѣ и пьютъ отъ чахотки, отъ лихорадки и даютъ дѣтямъ отъ судорогъ. Отваръ корешковъ и листьевъ совѣтуютъ пить отъ удара, отъ дрожанія въ конечностяхъ, ломоты въ членахъ, отъ бессонницы. Снаружи листья прикладываютъ отъ опухоли суставовъ. Молодые листочки

употребляютъ вмѣсто салата. Цвѣты настанваютъ въ винѣ, чтобы придать ему хорошій запахъ, а корни—въ пивѣ.

Первоцвѣтъ мучнистый (*Primula farinosa* L.). Многолѣтнее травянистое растение изъ семейства «первоцвѣтныхъ» (*Primulaceae* Vent.), распространенное въ сѣверной, западной Россіи и въ Сибири. Листья продолговато-обратно-яйцевидные, городчатые, суженные сразу въ черешокъ, снизу пушистые, образующие прикорневую розетку. Цвѣты сидятъ зонтикомъ на верхушкѣ цвѣточной стрѣлки, выш. $\frac{1}{2}$ — $3\frac{1}{2}$ вершк. Чашечка цилиндрическая, 5-тилопастная, съ продолговатыми тупыми лопастями; вѣнчикъ, состоящій изъ цилиндрической трубочки и плоскаго 5-тираздѣльнаго отгиба, свѣтло-лиловый или красный, съ желтымъ зѣвомъ. Тычинокъ 5, супротивныхъ частямъ вѣнчика. Завязь верхняя одногнѣздная, съ простымъ столбикомъ, несущимъ головчатое рыльце. Плодъ—цилиндрическая, выдающаяся изъ чашечки, коробочка. Цвѣтетъ въ началѣ лѣта. Произрастаетъ на лугахъ. Въ австрійскихъ Альпахъ корни употребляются жителями, какъ средство, облегчающее дыханіе при восхожденіи на горы.

Первоцвѣтъ, см. Легочница лекарственная (*Pulmonaria officinalis* L.).

Пердунецъ, см. Люцерна серповидная (*Medicago falcata* L.).

Пердунецъ, см. Люцерна посѣвная (*Medicago sativa* L.).

Перевертень, см. Жимолость вьющаяся (*Lonicera Periclymenum* L.).

Переважиха, см. Лапчатка - узикъ (*Potentilla Tormentilla Schrenck.*).

Перевязка, см. Герань луговая (*Geranium pratense* L.).

Перей, см. Лисохвостъ луговой (*Alopecurus pratensis* L.).

Перекати-поле, см. Спаржа обыкновенная (*Asparagus officinalis* L.).

Перекати-поле, см. Колючникъ обыкновенный (*Carlina vulgaris* L.).

Перекати-поле, см. Синеголовникъ плосколистный (*Eryngium planum* L.).

Перекати-поле, см. Синеголовникъ равнинный (*Eryngium campestre* L.).

Перекати-поле, см. Рѣзакъ стеной (*Falcaria Rivini* Host.).

Перекати-поле, см. Качимъ метельчатый (*Gypsophila paniculata* L.).

Перекати-поле, см. Зольникъ калийный (*Salsola Kali* L.).

Перекати-поле, см. Катранъ красный, или Кермекъ (*Statice Gmelini* Willd.).

Перекатичникъ, см. Спаржа обыкновенная (*Asparagus officinalis* L.).

Перекатичникъ, см. Рѣзакъ степной (*Falcaria Rivini* Host.).

Перекатичникъ } см. Качимъ метельчатый (*Gypsophila paniculata* L.).

Перекопъ, см. Шадра обыкновенная (*Marrubium vulgare* L.).

- Перекспъ, см. Мята полевая (*Mentha arvensis* L.).
- Перелетникъ, см. Язвенникъ обыкновенный (*Anthyllis Vulneraria* L.).
- Перелетникъ, см. Синеголовникъ плосколистный (*Eryngium planum* L.).
- Перелеть, см. Язвенникъ обыкновенный (*Anthyllis Vulneraria* L.).
- Перелеть, см. Медвенецъ рогатый (*Lotus corniculatus* L.).
- Перелеть, см. Ослиникъ двулѣтний (*Oenothera biennis* L.).
- Перелеть, см. Острокильникъ волосистый (*Oxytropis pilosa* Dc.).
- Перелеть, см. Первоцвѣтъ лекарственный (*Primula officinalis* Jacq.).
- Перелеть, см. Бѣлоголовка (*Trifolium montanum* L.).
- Перелеть соколій, см. Язвенникъ обыкновенный (*Anthyllis vulneraria* L.).
- Перелеть соколій, см. Соколій перелеть (*Gentiana cruciata* L.).
- Перелеть соколій, см. Горечавка крупная (*Gentiana pneumonanthe* L.).
- Перелеть соколій, см. Острокильникъ волосистый (*Oxytropis pilosa* Dc.).
- Перелеть соколій, см. Шалфей лѣсной (*Salvia silvestris* L.).
- Перелеть соколій, см. Мыльнянка лекарственная (*Saponaria officinalis* L.).
- Перелеть соколій дикій, см. Хлопушка (*Silene inflata* Smith.).
- Перелисть болотный, см. Вшивица болотная (*Pedicularis palustris* L.).
- Перелисть царскій, см. Царскій скипетръ (*Pedicularis Scerptrum carolinum* L.).
- Перелѣска, см. Пролѣска (*Anemone Hepatica* L.).
- Переловная, см. Бѣлозоръ болотный (*Parnassia palustris* L.).
- Переложное, см. Волчье лыко (*Daphne Mezereum* L.).
- Перелой, см. Бѣлозоръ болотный (*Parnassia palustris* L.).
- Перелой, см. Фиалка ночная (*Platanthera bifolia* L.).
- Перелойка, см. Бѣлозоръ болотный (*Parnassia palustris* L.).
- Перелойная трава, см. Бѣлозоръ болотный (*Parnassia palustris* L.).
- Перелойная трава мужская, см. Бѣлозоръ болотный (*Parnassia palustris* L.).
- Перелотъ, см. Козелецъ приземистый (*Scorzonera humilis* L.).
- Перелѣска, см. Пролѣска (*Anemone Hepatica* L.).
- Перелѣска, см. Сонъ (*Anemone Pulsatilla* L.).
- Переносъ-зелье, см. Синеголовникъ плосколистный (*Eryngium planum* L.).
- Перепалечникъ, см. Подмаренникъ желтый (*Galium verum* L.).
- Перепелочная трава, см. Синеголовникъ равнинный (*Eryngium campestre* L.).
- Перепечки, см. Просвирникъ обыкновенный (*Malva rotundifolia* L.).
- Переполевица, см. Вѣйникъ наземный (*Calamagrostis epiglos Roth.*).

Переполахъ, см. Василекъ луговой (*Centaurea jacea* L.)

Переполахъ, см. Короставникъ полевой (*Scabiosa arvensis* L.).

Переполахъ, см. Валеріана лекарственная (*Valeriana officinalis* L.).

Переполахъ мужицкій, см. Колокольчикъ жестковолосый (*Campanula cervicaria* L.).

Переполюшка ребячья, см. Грушанка круглолистная (*Pirola rotundifolia* L.).

Переполюшная, см. Гравилатъ прямой (*Geum strictum* L.).

Переполюшная } см. Синеголовникъ равнинный (*Eryngium*

Переполюшникъ } *campestre* L.).

Переполюшникъ, см. Синеголовникъ плосколистный (*Eryngium planum* L.).

Перепочка, см. Просвирникъ сѣверный (*Malva borealis* L.).

Перескледъ, см. Клобучекъ (*Epimedium alpinum* L.).

Пересна, см. Купальница европейская (*Trollius europaeus* L.).

Перестрѣлъ, см. Бородачникъ обыкновенный (*Lamprana communis* L.).

Перестрѣлъ, см. Золотая розга (*Solidago Virgaurea* L.).

Переступень, см. Переступень бѣлый (*Bryonia alba* L.).

Переступень бѣлоцвѣтный, см. Переступень бѣлый (*Bryonia alba* L.).

Переступень бѣлый (*Bryonia alba* L.). Алрунь, Змѣева трава, Бѣлая матица. Нечитай-зілля, Нечитай-зелѣ (Малор.). Параличная рѣна, трава, Переступъ, Переступень бѣлоцвѣтный, Переступень черноплодный, Тарамышекъ-трава. Шероховато-коротко-волосистое многолѣтнее ядовитое растение изъ семейства «тыквенныхъ» (*Cucurbitaceae* Juss.), распространенное въ средней Европѣ, въ средней, южной Россіи и на Кавказѣ. Стебель, выш. отъ 1 саж. до 1½ саж., съ простыми сердцевидными 5-тиугольно-лестными и крупно-зубчатыми листьями. Цвѣты желтовато-бѣлые, мелкіе, однодомные, то есть, на одномъ и томъ-же экземплярѣ находятся пестичные и тычиночные цвѣты. Тычиночные цвѣты въ кистяхъ, женскіе—щиткомъ. Чашечка и вѣнчикъ 5-тилопастные. Лопастн чашечки женскихъ цвѣтовъ равняются вѣнчику. Тычинокъ 5; изъ нихъ 4 попарно сросшихся, 5-ая свободна. Завязь нижняя 3-хлѣздная, съ 3-хлопастнымъ столбикомъ; рыльца голыя. Плодъ—черныя ягоды. Цвѣтетъ лѣтомъ. Растетъ въ лѣсахъ и между кустарниками.

МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНІЕ. Врачами переступень бѣлый употребляется крайне рѣдко. Прежніе врачи употребляли его отъ водянки, одышки, падушей болѣзни и паралича. Въ народной медицинѣ растение тоже почти не употребляется, оно считается ядовитымъ.

Въ гомеопатіи изъ корня переступня, вырытаго до цвѣтенія, готовятъ спиртную настойку, которая имѣетъ очень обширное примѣненіе при лихорадочныхъ болѣзняхъ, зависящихъ отъ страданія желудка и печени, при потрясающемъ ознобѣ, нервной дрожи, воспаленіи легкихъ и различнаго рода воспалительныхъ

заболѣваніяхъ, при болѣзняхъ матки, параличахъ, ревматизмѣ, кори, оспѣ, поверхностныхъ опухоляхъ и даже при лунатизмѣ. Даютъ 1—2 капли чистой настойки или 1—2—3-го разведенія, 1—2 раза въ день, иногда и чаще. Снаружи спиртный растворъ переступня употребляется для втираній при ревматическихъ боляхъ, для чего чайную ложку настойки смѣшиваютъ со столовой ложкой масла или спирта.

Въ ветеринарной медицинѣ небольшіе приемы переступня употребляются въ рѣдкихъ случаяхъ, именно при долго затянувшемся сапѣ.

Въ гомеопатической ветеринаріи переступень дается животнымъ отъ воспаленія легкихъ и плевры, отъ гриппа, ревматизма, при рожѣ, при воспаленіи желудка и кишокъ у новорожденныхъ, при отекахъ, происшедшихъ отъ простуды, при сапѣ у лошадей и припадкахъ коликъ во время чумы рогатаго скота. Даютъ капли 3—6-го разведенія.

Переступень двудомный (*Bryonia dioica* L.). Многолѣтнее ядовитое растение изъ семейства «тыквенныхъ» (*Cucurbitaceae* Juss.), распространенное въ средней и южной Европѣ, въ западной Россіи и на Кавказѣ. Стебель вышины отъ 1—1½ саж., съ простыми вѣтвистыми винтообразно-закругленными усиками. Листья пальчато-раздѣльные, изъ 5—7 угловатыхъ зубчатыхъ долей, изъ которыхъ средняя самая длинная. Растеніе двудомное, т. е., на однихъ экземплярахъ находятся только тычиночные (мужские) цвѣты, а на другихъ пестичные (женские). Первые цвѣты блѣдно-желтые, въ кистяхъ, пестичные-же собраны пѣткомъ. Чашечка у нихъ вдвое короче колесовиднаго вѣнчика. Чашечка и вѣнчикъ 5-тилопастные; изъ 5 тычинокъ 4 попарно сросшихся, 5-ая свободна. Завязь нижняя 3-хгнѣздная; столбикъ 3-хлопастный; рыльца шершаво-волосистыя. Плодъ—красныя ягоды. Цвѣтетъ лѣтомъ. Растетъ въ лѣсахъ и тѣнистыхъ мѣстахъ.

Переступень черноплодный, см. Переступень бѣлый (*Bryonia alba* L.).

Переступникъ, см. Плющъ обыкновенный (*Hedera Helix* L.).

Переступъ, см. Переступень бѣлый (*Bryonia alba* L.).

Переступъ горькій, см. Переступъ обыкновенный (*Tamus communis* L.).

Переступъ обыкновенный (*Tamus communis* L.). Фармацевтическое названіе: *Tamus. v. Bryonia nigra* (Radix.). Водогонъ, Дѣвій корень (Сл. Церк.), Матика винная, Переступъ черный. Вьющаяся многолѣтняя трава изъ семейства «діоскорейныхъ» (*Dioscoreaceae*), распространенная въ южной и западной Европѣ, въ Крыму и на Кавказѣ, съ длинно-черешковыми, заостренными, сердцевидными листьями и мелкими невзрачными зеленоватыми цвѣтами въ рыхлыхъ пазушныхъ кистяхъ. Лепестковидный околоцвѣтникъ 6-тираздѣльный. Тычинокъ 6; завязь нижняя 3-хгнѣздная, съ однимъ столбикомъ. Плодъ—красныя ягоды. Цвѣтетъ въ маѣ и въ іюнѣ. Разводится въ садахъ для

украшенія бесѣдокъ, рѣшетокъ и т. п. Въ Англіи молодые побѣги употребляютъ въ пищу, какъ спаржу. (Рис. 210.)

Переступъ черный, см. Переступъ обыкновенный (*Tamus communis* L.).

Перецъ, см. Майникъ двулистный (*Maianthemum bifolium* L.).

Перецъ англійскій, см. Перецъ ямайскій (*Myrtus Pimenta* L.).

Перецъ астраханскій, см. Перецъ стручковый (*Capsicum annuum* L.).

Перецъ боровой, см. Волчье лыко (*Daphne Mezereum* L.).

Перецъ боровой, см. Богородская трава (*Thymus Serpyllum* L.).

Перецъ бѣлый, см. Перецъ черный (*Piper nigrum* L.).

Перецъ водяной (*Poligonum Hydropiper* L.). Фармацевтическое назв.: *Persicaria urens*, s. *Hydropiper* (Herba). Брылена (Вятск.), Геморроидальникъ, Геморроидальная женская трава (въ сѣм. лавк. въ Москвѣ), Горецъ, Горецъ водяной, Горчакъ бабій (Вор.), Горчакъ женскій (Орл.), Горчакъ (Малор.), Горчаки (Смол.), Гирчакъ богородичный (Полт.), Горчица (Кал., Кур.), Горчица лѣсная (Могил.), Горчица дикая (Ряз.), Горчишка, Горчишная (Твер.), Дростъ (Могил.), Елка-трава, Лягушечья трава, Лягушечникъ (Сарат.), Перецъ собачій (Двинг. Рог.), Почечуйникъ, Почечуйная трава, Растопыръ, Рдестъ бѣлый, Рѣпникъ, Чередникъ, Чечина трава. Однолѣтнее травянистое растение изъ семейства «гречиховыхъ» (*Poligonaceae* Juss.), распространенное почти во всей Европѣ и во всей Россіи. Стебель обыкновенно лежащій, при основаніи укореняющійся, дл. 7—12 в. Листья ланцетные, съ голыми раструбами и съ короткими рѣсничками. Цвѣточные колосья рѣдкіе, нитевидные, на верхушкѣ поникающіе. Околоцвѣтникъ большею частью 4-храздѣльный, зеленый, по краямъ красный или бѣловатый. Тычинокъ 6; завязь одногнѣздная, снабженная при основаніи железистымъ кольцомъ; столбиковъ 2, несущихъ головчатые рыльца. Плодъ—трехгранная матовая мелко-шероховатая сѣмянка. Цвѣтетъ во второй половинѣ лѣта. Растетъ на сырыхъ мѣстахъ, по берегамъ рѣкъ и прудовъ. Все растение имѣетъ жгучій, какъ перецъ, вкусъ. (Рис. 211.)

МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНІЕ. Перецъ водяной прежде употреблялся врачами, какъ сильное вяжущее средство, отъ поносовъ, слизи- и кровотеченій, также отъ перемежающейся лихорадки, а снаружи для укрѣпленія слизистой оболочки десенъ и отъ выпаденія матки. Теперь употребляется крайне рѣдко.

Перецъ волчій, см. Волчье лыко (*Daphne Mezereum* L.).

Перецъ гвоздичный, см. Перецъ ямайскій (*Myrtus Pimenta* L.).

Перецъ дикій, см. Полюнь горькая (*Artemisia absinthium* L.).

Перецъ дикій, см. Копытень европейскій (*Asarum europaeum* L.).

Перецъ дикій, см. Волчье лыко (*Daphne Mezereum* L.).

Перецъ дикій, см. Грушанка круглолистная (*Pirola rotundifolia* L.).

Перецъ дикій, см. Грушанка малая (*Pirola minor* L.).

Перецъ дикій, см. Очитокъ острый (*Sedum acre* L.).

Перецъ дикій (*Vitex Agnus Castus* L.). Фармацевтическое назв.

Agnus Castus (Semina). Авраамово дерево, Агнецъ непорочный: Баранъ непорочный, Вѣрба влосская, Вѣрба волошская, Вѣрба итальянская, Лоза итальянская, Перцовое дерево, Перцовый кустъ, Перецъ ложномонашескій, Прутникъ, Цѣломудренникъ. Кустарникъ вып. отъ 1½ арш.—1½ саж. изъ семейства «губоцвѣтныхъ» (*Labiatae* Juss.), произрастающій на берегахъ Средиземнаго моря, въ сырыхъ мѣстахъ и по берегамъ ручьевъ, рѣкъ на Востокъ и въ Индію, съ узко-лопастными 5—7-миначатого-раздѣльными листьями. Его плоды—ягоды, отличающіяся большою пряностью, употребляются въ качествѣ приправы къ кушаньямъ вмѣсто перца. Гибкія и упругія вѣтви употребляются въ Греціи на различныя плетенныя издѣлія.

МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНІЕ. Очень ограничено и извѣстно только въ народной медицинѣ; сѣмена его хвалятся отъ хроническаго заболѣванія печени, селезенки и остановки мѣсячныхъ отдѣленій.

Перецъ длинный, см. Очитокъ острый (*Sedum acre* L.).

Перецъ душистый, см. Эстрагонъ (*Artemisia Dracunculus* L.).

Перецъ индѣйскій, см. Перецъ стручковый (*Capsicum annuum* L.).

Перецъ кайенскій (*Capsicum crassum* Willd.). Растеніе родомъ изъ Южной Америки. Стручки его жгучѣе и острѣе стручковыхъ перца турецкаго, или стручковаго. Обыкновенно сѣмена и мякоть зрѣлаго плода размельчаются на подобіе горчицы, смѣшиваются съ солью и пшеничной мукой и продаются подъ именемъ кайенскаго перца.

Перецъ красный, см. Перецъ стручковый (*Capsicum annuum* L.).

Перецъ ложномонашескій, см. Перецъ дикій (*Vitis Agnus Castus* L.).

Перецъ малагуетскій или манигуетскій (*Amonnuna Melegueta* Rose.). Райскія зерна. Растеніе, родомъ изъ Африки, произрастающее на берегу Гвинейскаго залива. Трехгранные плоды—кансули, отличаются ароматнымъ, прянымъ вкусомъ, напоминающимъ перецъ, почему и употребляются въ качествѣ приправы въ пищу. Въ торговлѣ этотъ перецъ извѣстенъ подъ названіемъ «райскихъ зеренъ», или малагуетскаго перца.

Перецъ полевой, см. Грушанка круглолистная (*Pirola rotundifolia* L.).

Перецъ русскій, см. Перецъ стручковый (*Capsicum annuum* L.).

Перецъ собачій, см. Перецъ водяной (*Polygonum Hydropiper* L.).

Перецъ стручковый (*Capsicum annuum* L.). Горчица (Земл. Войск. Донск.), Горчица уральская, Горчица турецкая, Жгунъ, Корольки садовые, Перецъ астраханскій, Перецъ индѣйскій, Перецъ красный, Перецъ русскій, Перецъ стручковый, Перецъ турецкій, Перчиця, Стручекъ астраханскій. Растеніе Южной Америки, уже издавна разводимое въ Европѣ, съ желтовато-бѣлыми цвѣтами, напоминающими цвѣты паслена, и съ яйцевидными листьями и красными многосѣмянными плодами. Вкусъ ихъ весьма острый и жгучій, запахъ ароматный, нѣсколько ѣдкій.

Высушенные плоды употребляются въ пищу въ качествѣ приправы къ различнымъ кушаньямъ и составляютъ немаловажный предметъ торговли, гдѣ они извѣстны подъ именемъ испанскаго, турецкаго перца. Существуетъ множество сортовъ, различающихся между собою по величинѣ, формѣ и окраскѣ плодовъ, а также болѣе или менѣе крупными листьями и нѣкоторой разницей въ окраскѣ цвѣтовъ. Стручковый перецъ нерѣдко встрѣчается, какъ комнатное горшечное растеніе.

МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНІЕ. Врачами перецъ внутрь почти никогда не прописывается; изрѣдка они даютъ его вмѣстѣ съ другими веществами, вызывающими красноту кожи, для втираній отъ ревматическихъ болей въ суставахъ и мышцахъ. Въ народной медицинѣ перецъ употребляется довольно часто. Перецъ дѣйствуетъ раздражающимъ образомъ на слизистую оболочку желудка и кишокъ. Неумѣренное его употребленіе можетъ даже вызвать ея воспаленіе. Небольшое количество толченаго перца или цѣлыхъ зернышекъ принимается при плохомъ аппетитѣ, слабомъ пищевареніи и при перемежающейся лихорадкѣ. Также перецъ предлагаютъ отъ задержки мочи и менструацій.

Въ ветеринарной медицинѣ перецъ дается животнымъ отъ долго длящихся катарровъ желудочно-кишечнаго канала, также отъ слабости животныхъ. Снаружи его употребляютъ для растираній застарѣлыхъ опухолей железъ и отъ параличей. Лошадямъ внутрь даютъ отъ 1 драхмы до $\frac{1}{2}$ унца (4,0—15,0 грм.), овцамъ—1 скрупуль— $\frac{1}{2}$ драхмы (1,2—1,8 грм.), собакамъ—отъ 1 грана до 12-ти (0,1—0,75 грм.) въ кашкахъ или плюляхъ, болышею частью въ смѣси со слизистыми веществами. Предварительно перецъ слѣдуетъ хорошенько растолочь, потому что цѣльные зерна проходятъ черезъ кишечникъ не измѣняясь. Вмѣсто толченаго перца животнымъ даютъ перцовую спиртную настойку: на 1 часть перца берутъ 6 частей спирта; такой настойки лошадамъ даютъ отъ 15—60 капель, овцамъ отъ 3-хъ до 15-ти, собакамъ отъ 10-ти до 30-ти. Эту же настойку употребляютъ снаружи; изъ толченаго перца готовятъ мазь: одну часть перца смѣшиваютъ съ 10-ю частями жира.

Перецъ турецкій, см. Перецъ стручковый (*Caprsicum annuum* L.).

Перецъ черный (*Piper nigrum* L.). Фармацевтическое назв.: *Piper album et nigrum*. Перецъ бѣлый (безъ кожи). Кустарникъ съ гибкимъ, тонкимъ стволомъ, съ овальными листьями и длинными колбообразными плодами, несущими 20—30 сначала зеленыхъ, постепенно желтѣющихъ и, наконецъ, красноватыхъ односѣмянныхъ ягодъ. Родомъ изъ Индіи. Плоды, извѣстные свосю пряностью, употребляются въ пищу въ качествѣ приправы.

Перецъ ѣдкій, см. Очитокъ острый (*Sedum acre* L.).

Перецъ ямайскій (*Myrtus Pimenta* L.). Перецъ гвоздичный, Перецъ англійскій. Вѣчно-зеленый довольно высокій кустарникъ, родомъ изъ Востъ-Индіи, распространенный преимущественно на Ямаикѣ. Его сушеные бобовидные плоды отличаются ароматнымъ, прянымъ, гвоздичнымъ запахомъ и извѣстны въ

торговлѣ подѣ именемъ ямайскаго, англійскаго, гвоздичнаго перца; они употребляются, какъ пряность, въ пищу въ качествѣ приправы.

Перечная трава, см. Перечникъ широколистный (*Lepidium latifolium* L.).

Перечникъ, см. Перечникъ широколистный (*Lepidium latifolium* L.).

Перечникъ широколистный (*Lepidium latifolium* L.). Бобовичникъ (Екат.), Белмець (Екат.), Тирчакъ (Тавр.), Горобяча кашка (Екат.), Любистокъ водяной (Тавр.), Мята грецкая, или Перешница самая меньшая, Перечникъ, Персчный крессъ, Перечная трава, Подхрѣнникъ (Курск.), Смогъ (Екат.), Хрѣнница, Хрѣница, Хрѣнокъ, Хрѣнокъ (Малор.), Хрѣнъ собачій (Хар., Черныевъ). Многолѣтнее растеніе изъ семейства «крестоцвѣтныхъ» (*Cruciferae* Juss.), распространенное въ средней и южной Европѣ, въ южной и юго-западной Россіи. Стебель прямой, вѣтвистый; листья продолговато-ланцетные, шпичатые, нижніе—суженные въ черешокъ, верхніе листья—сидячіе и обыкновенно цѣльно-крайніе. Мелкіе бѣлые цвѣты въ укороченныхъ кистяхъ, собранныхъ метельчатымъ соцвѣтіемъ. Чашечка изъ 4 паръ отпадающихъ листочковъ. Вѣнчикъ изъ 4-хъ на-крестъ расположенныхъ лепестковъ. Тычинокъ 6; плоды—округло-овальные, сперва пушистые, потомъ голые стручки; столбикъ едва замѣтный. Цвѣтетъ лѣтомъ. Растетъ на солончаковой почвѣ и на сорныхъ мѣстахъ, также при берегахъ. Употребляется на вѣники. Корень и листья употребляются въ народѣ отъ цыги.

Перечница-трава, см. Майникъ двулистный (*Maianthemum bifolium* L.).

Перечница самая меньшая, см. Перечникъ широколистный (*Lepidium latifolium* L.).

Перешникъ, см. Копытень европейскій (*Asarum europaeum* L.).

Перильцы, см. Сосенка водяная, или хвостникъ обыкновенный (*Hippuris vulgaris* L.).

Перій } см. Костеръ безостный (*Bromus inermis* L.).

Перійка } см. Ежа сборная (*Dactylis glomerata* L.).

Перловая трава } см. Перловникъ поникшій (*Melica nutans* L.).

Перловникъ } см. Перловникъ поникшій (*Melica nutans* L.).

Перловникъ поникшій (*Melica nutans* L.). Осочная трава (Умань), Перловая трава, Перловникъ, Перловый шонникъ, Перловое турецкое пишено. Многолѣтнее травянистое растеніе изъ семейства «злаковыхъ» (*Gramineae* Juss.), распространенное почти во всей Европѣ и во всей Россіи. Стебель выш. 7—12½, вершк. Колоски овальные, поникшіе, безостные, расположены однобочною кистью и заключаютъ 2 обоюполовыхъ цвѣтка и одинъ верхній булавовидный недоразвившійся цвѣтокъ. Колосковые створки красновато-коричневые, по краямъ перепончатые, почти одинаковой длины съ цвѣточными пленками. Тычинокъ 3; завязь одногнѣздная, односѣмянная, съ 2-мя столбиками. Плодъ—овальное зерно. Цвѣтетъ въ маѣ и въ іюлѣ

Растетъ въ лѣсахъ и между кустарниками. Хорошая кормовая трава. (Рис. 212.)

Перловникъ синій, см. Трясушка средняя (*Briza media* L.).

Перловое турецкое пшено } см. Перловникъ поникшій (Me-

Перловый пшонникъ } *lica nutans* L.).

Перникъ, см. Ковыль перистый (*Stipa pennata* L.).

Перо золотое, см. Золотая розга (*Solidago Virgaurea* L.).

Перо страусово трава, см. Папоротникъ черный (*Struthiopteris germanica* L.).

Персиковое дерево, см. Персикъ (*Amygdalis persica* L.).

Персикъ (*Amygdalis persica* L.). Бросквица, Брусквица, Брусвина, Персиковое дерево, Жердели, Зердали, Шалтала (сушеные плоды). Кустарникъ или дерево, выш. 1½—2½ саж. изъ семейства «миндалевыхъ» (*Amygdalaceae*), дико встрѣчающійся въ южномъ Туркестанѣ, Персіи и въ Закавказьѣ. Листья ланцетовидные, пильчатые. Цвѣты розовые одиночные, почти сидячіе; чашечка колокольчатая, 5-тилистная; 5-тилепестный вѣнчикъ и многочисленныя тычинки прикрѣплены къ краямъ вогнутого цвѣтоложа. Завязь свободная, не сросшаяся съ цвѣтоложемъ, одногнѣздная. Плодъ—мясистая сочная шаровидная костянка, съ продольной бороздкой на одной сторонѣ; поверхность плода голая или бархатисто-пушистая, смотря по сорту. Косточка съ глубокими извилистыми бороздками и ямками. Цвѣтетъ весной до появленія листьевъ. Воздѣлывается въ многочисленныхъ сортахъ деревомъ или въ шпалерахъ во всей южной и средней Европѣ и безъ прикрытія въ Европейской Россіи—въ самыхъ южныхъ частяхъ Бессарабіи, Херсонской, Екатеринославской губерніяхъ, въ Крыму и на Кавказѣ. Плоды употребляются въ пищу въ сыромъ, вареномъ и высушенномъ видѣ. (Рис. 213.)

МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНІЕ. Цвѣты персика имѣютъ слабый пріятный миндальный запахъ и горьковатый вкусъ, листья при растираніи даютъ такой-же запахъ; сѣмена персиковъ, равно какъ цвѣты и листья, содержатъ въ себѣ эфирное масло, съ примѣсью синильной кислоты такъ-же, какъ миндаль. Употребленіе листьевъ и цвѣтовъ персикового дерева крайне ограничено. Изъ цвѣтовъ дѣлаютъ наливку, которую принимаютъ, какъ легкій успокаивающій нервы напитокъ; черезъ листья пропускаютъ воду, которая по вкусу своему напоминаетъ вишневую воду; точно также изъ зернышекъ готовится вода, имѣющая тѣ-же свойства, какъ и вода горькихъ миндалей.

Персикъ дикій

Персикъ полевой } см. Бобовникъ (*Amygdalis nana* L.).

Персикъ степной }

Персонъ, см. Кокушникъ (*Gymnadenia conopsea* Rich.).

Перстинецъ, см. Ледвенецъ рогатый (*Lotus corniculatus* L.).

Перстникъ

Перцова трава } см. Ежа сборная (*Dactylis glomerata* L.).

Перховникъ, см. Колючникъ безстебельный (*Carlina subscaulis* Dc.).

- Перховникъ, см. Девясиль подсолнечный (*Inula Helenium* L.).
- Перцовое дерево } см. Перець дикий (*Vitex Agnus Castus* L.).
- Перцовый кустъ }
- Перчикъ боровой, см. Богородская трава (*Thymus Serpyllum* L.).
- Перчиця, см. Перець стручковый (*Capsicum annuum* L.).
- Песика, см. Желтоцвѣтъ пахучій (*Barbarea vulgaris* R. Br.).
- Песика, см. Сурѣлица (*Brassica Rapa* L.).
- Песій гроздъ, см. Пасленъ сладко-горькій (*Solanum dulcamara* L.).
- Песобой, см. Зимовникъ осенній (*Colchicum autumnale* L.).
- Песочникъ, см. Подорожникъ песчаный (*Plantago arenaria* W. K.).
- Песочная, см. Норичникъ узловатый (*Scrofularia nodosa* L.).
- Пестежка, см. Бутень клубненосный (*Chaerophyllum bulbosum* L.).
- Пестикъ, см. Спаржа обыкновенная (*Asparagus officinalis* L.).
- Пестикъ, см. Хвощъ полевой (*Equisetum arvense* L.).
- Пестикъ, см. Горлецъ, раковыя шейки (*Polygonum Bistorta* L.).
- Пестиль } см. Хвощъ полевой (*Equisetum arvensis* L.).
- Пестовникъ }
- Пестрець, см. Бутень клубненосный (*Chaerophyllum bulbosum* L.).
- Пестрина, см. Строчокъ (*Helleborus viridis* L.).
- Пестро-остро Марьино, см. Остро-пестрая трава (*Silybum Marianum* Gärtn.).
- Пестрова трава, см. Ежа сборная (*Dactylis glomerata* L.).
- Пеструшникъ, см. Погремокъ обыкновенный (*Rhinanthus Crista Galli* L.).
- Пестрѣль, см. Поповникъ обыкновенный (*Crysanthemum Leucanthemum* L.).
- Пестряночка, см. Строчокъ (*Helleborus viridis* L.).
- Пестушки }
- Песты }
- Пестыши }
- Пестышки }
- Песчанецъ, см. Колоснякъ песчаный (*Elymus arenarius* L.).
- Песчанка тимьянолистная (*Arenaria serpyllifolia* L.). Низкая (выш. 2—5 вершк.) однолѣтняя травка изъ семейства «гвоздичныхъ» (*Caryophyllaceae* Juss.), распространенная во всей Европѣ и почти во всей Россіи, съ прямостоящимъ или восходящимъ вѣтвистымъ стеблемъ, на которомъ сидятъ маленькіе яйцевидные листья. Чашелистиковъ и лепестковъ по 5. Чашелистики пушисто-волосистые, яйцевидно-ланцетные, съ 3 жилками. Лепестки бѣлые эллиптическіе. Тычинокъ 10; столбиковъ 3. Плодъ—коробочка, раскрывающаяся у верхушки 6 зубцами. Цвѣтетъ съ мая до сентября. Произрастаетъ на поляхъ, холмахъ, на сухой и песчаной почвѣ и на каменистыхъ мѣстахъ.
- Песчанка тонколистная (*Arenaria tenuifolia* L.). Однолѣтняя травка изъ семейства «гвоздичныхъ» (*Caryophyllaceae* Juss.),

распространенная въ средней и южной Европѣ, въ средней и южной Россіи, выш. всего $1\frac{1}{2}$ — $2\frac{1}{2}$ вершк. Листья шиловидные. Стебель вѣтвистый и голый. Чашелистиковъ и лепестковъ по 5; лепестки бѣлые овальные. Тычинокъ 10; столбиковъ 3. Плодъ—коробочка, раскрывающаяся 6 зубцами. Цвѣтеть съ мая до августа. Растетъ на песчаныхъ и каменистыхъ мѣстахъ. (Рис. 214.)

Песчанка трехнервная (*Arenaria trinervis* L., sin. *Mochringia trinervis* Clairv.). Однолѣтняя трава изъ семейства «гвоздичныхъ» (*Caryophyllaceae* Juss.), распространенная почти во всей Европѣ и во всей Россіи, выш. $3\frac{1}{2}$ —7 вершк. Стебель сильно вѣтвистый, съ явными, заостренными, черешковыми листьями. Чашелистиковъ и лепестковъ по 5. Чашелистики ланцетные, острые, о трехъ жилкахъ; лепестки бѣлые цѣльные. Тычинокъ 10; столбиковъ 3. Плодъ—коробочка, раскрывающаяся 6 зубцами. Цвѣтеть въ маѣ и въ юнѣ. Растетъ въ тѣнистыхъ мѣстахъ, между кустарниками. (Рис. 215.)

Песчанникъ, см. Колоснякъ песчаный (*Elymus arenarius* L.).

Песецъ, см. Осока песчаная (*Carex arenaria* L.).

Песецъ, см. Подорожникъ песчаный (*Plantago arenaria* L.).

Песья ягода, см. Пасленъ черный (*Solanum nigrum* L.).

Петріевъ хрестъ, см. Петровъ крестъ (*Lathraea Squamaria* L.).

Петровъ крестъ, см. Астрагалъ солодколистный (*Astragalus glycyphyllus* L.).

Петровъ крестъ, см. Купена лекарственная (*Convallaria Polygonatum* L.).

Петровъ крестъ, см. Соколій перелетъ (*Gentiana cruciata* L.).

Петровъ крестъ, см. Чина весенняя (*Orobus vernus* L.).

Петровъ крестъ, см. Погremoкъ обыкновенный (*Rhinanthus Crista Galli* L.).

Петровъ крестъ, см. Норичникъ узловатый (*Scrofularia nodosa* L.).

Петровъ крестъ, см. Медвѣжье ухо (*Verbascum Thapsus* L.).

Петровъ крестъ (*Lathraea Squamaria* L.). Фармацевтическое название корня: *Radix Squamariae*, v. *Dentarii*, s. *Anblati*. Виноградъ земляной (Полт.), Гнѣздо или Гнѣздникъ, Зараза-трава, Петріевъ хрестъ, Чешуйчатый корень, Майскій корень, Листъ львиный, Маслянки (Малдр.), Потаенница, Шпараговый растъ (Умань), Царь-трава, Петровъ цвѣтъ, Чешуйникъ, Чешуйчатый зубной корень, Солнечникъ чешуйчатый. Многолѣтнее чужезадное растение изъ семейства «норичниковыхъ» (*Scrofulariaceae* R. Br.), распространенное почти во всей Европѣ и встрѣчающееся почти во всей Европейской Россіи и на Кавказѣ, красновато-бѣлаго цвѣта, паразитирующее, т. е., живущее и развивающееся на корняхъ различныхъ кустарниковъ и деревьевъ, преимущественно на корняхъ орѣшника. Корневище его мясистое, покрытое короткими мясистыми чешуйчатыми листьями. Простой стебель несетъ небольшое число тонкихъ чешуйчатыхъ листьевъ, постепенно переходящихъ въ верхней части стебля

въ красноватые прицвѣтники и довольно длинное, одностороннее, слегка железисто-мохнатое соцвѣтіе. Чашечка колокольчатая, красная, 4-хлопастная; вѣнчикъ трубчатый, съ нѣсколько расширеннымъ отгибомъ, 2-губый: верхняя губа цѣльная красная, нижняя—3-хлопастная. Тычинокъ 4, съ другнѣздными, при основаніи пушистыми, пыльниками; завязь верхняя, съ однимъ столбикомъ. Плодь—шаровидно-яйцевидная повислая на вверху стоячей ножкѣ коробочка. Цвѣтеть весной. Растетъ въ лиственныхъ лѣсахъ.

МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНІЕ. Растеніе употребляется только въ народной медицинѣ. Оно имѣетъ слабительное дѣйствіе. Изъ травы варятъ настой, какъ чай, который женщины пьютъ отъ остановки менструацій и отъ другихъ женскихъ болѣзней.

Петровъ цвѣтъ, см. Петровъ крестъ (*Lathraea Squamaria* L.).

Петрова трава, см. Соколій перелетъ (*Gentiana cruciata* L.).

Петросилѣва трава, см. Петрушка огородная (*Petroselinum sativum* Hoffm.).

Петрушка, см. Петрушка огородная (*Petroselinum sativum* Hoffm.).

Петрушка болотная, см. Горпичникъ болотный (*Peucedanum palustre* Moench.).

Петрушка болотная, см. Сельдерей обыкновенный (*Apium graveolens* L.).

Петрушка горная (*Peucedanum Oreoselinum* Münch.). Фармацевтическое названіе: *Oreoselinum* s. *Apium montanum*. Буддырникъ, Гирча петрушечная, Козельчики (Вор.), Кувитликъ (Орл.), Морковникъ (Могил.), Гадюча морква (Малор.), Лѣсная морква (Волин.), Петрушка дикая (Гродн.), полевая (Минск.), Поперечникъ. Прорѣзная трава, Заячья рутка (Волинск.), Смодъ, Смодья. Многолѣтнее травянистое растеніе изъ семейства «зонтичныхъ» (*Umbelliferae* Juss.), распространенное въ средней и южной Европѣ и довольно обыкновенное въ Россіи. Стебель круглый, немного вѣтвистый. Листья тройко-перистые, въ очертаніи треугольные; развѣтвленія листового черешка растопыренные, бѣлые мелкіе цвѣты въ сложныхъ зонтикахъ. Чашечка 5-тираздѣльная, съ замѣтными зубцами. Вѣнчикъ 5-тилепестный. Тычинокъ 5; завязь нижняя 2-хлѣздная, съ 2 столбиками, расширенными при основаніи въ железистый дискъ, покрывающій верхушку завязи. Плодь округлый, распадающійся при созрѣваніи на 2 сѣмянки, съ нитевидными спинными ребрами и толстоватыми, крылатыми, плотно прилегающими другъ къ другу, красвыми ребрами. Цвѣтеть во второй половинѣ лѣта. Растетъ на холмахъ, степяхъ, между кустарниками, въ рощахъ и въ сосновыхъ лѣсахъ.

МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНІЕ этой пахучей и пряной травы крайне ограничено. Врачами она совсѣмъ не выписывается; въ народной медицинѣ отваръ ея пьютъ, какъ желудочное средство. **Петрушка дикая**, см. Петрушка горная (*Peucedanum Oreoselinum* Moench.).

Петрушка дикая, см. Бутень клубненосный (*Chaerophyllum bulbosum* L.).

Петрушка дикая, см. Болиголов крапчатый (*Conium maculatum* L.).

Петрушка дикая, см. Сельдерей обыкновенный (*Aplum graveolens* L.).

Петрушка коровья, см. Купырь лѣсной (*Anthriscus silvestris* Hoffm.).

Петрушка козья, см. Бедренец большой (*Pimpinella magna* L.).

Петрушка кошачья, см. Вехъ ядовитый (*Cicuta virosa* L.).

Петрушка огородная (*Petroselinum sativum* Hoffm.). Фармацевтическое названіе: *Petroselinum* s. *Aplum hortense* s. *alpinum* (Radix, Herba et Semen). Петрушка, Петросилева трава. Двудѣтная трава изъ семейства «зонтичныхъ» (*Umbelliferae* Juss.), родомъ изъ средиземно-морской области, выш. 12—22½ вершк., съ прямостоящимъ сильно вѣтвистымъ стеблемъ. Листья сверху блестящіе, въ общемъ очертаніи 3-угольные, нижніе — двояко или трояко-перисто-разсѣченные, съ клиновидно-яйцевидными, 3-хнадрѣзными и зубчатыми долями; верхніе — тройчатые, съ линейными пѣлынокрайними долями. Мелкіе зеленовато-желтые цвѣты въ многолучистыхъ (15—20 и болѣе главныхъ лучей) сложныхъ зонтикахъ; обертка состоитъ изъ 2—5, а обверточка — изъ 6—8 линейныхъ прицвѣтниковъ. Чашечка о 5 зубчикахъ; лепестковъ и тычинокъ по 5; завязь нижняя 2-гнѣздная, несетъ на верхушкѣ железистый дискъ и 2 столбика. Плодь — продолговато-яйцевидная двусѣмянка, распадающаяся при созрѣваніи на 2 плодика, отдѣляющихся отъ срединнаго столбика. Плодики съ 5 нитевидными ребрами. Цвѣтетъ лѣтомъ. Разводится всюду, какъ овощъ, листья и корни котораго обладаютъ довольно сильнымъ ароматнымъ запахомъ. Въ пищу въ качествѣ приправы употребляются корни и листья. (Табл. XXXVI, фиг. 203 и 204.)

МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ. Корни и листья петрушки огородной содержатъ въ себѣ эфирное масло, которое дѣйствуетъ, какъ мочегонное и вѣтрогонное средство. Въ народной medicinѣ употребляютъ сушеный корень петрушки, который превращаютъ въ порошокъ; также на немъ настаиваютъ воду. Петрушечное масло предписывается врачами въ малыхъ количествахъ, не болѣе 2—3 капель на пріемъ, при трипперѣ, воспаленіи мочевого канала, при камняхъ мочевого пузыря. Петрушечною водою обмываютъ лицо отъ прыщей и желтыхъ пятенъ. Корни петрушки отвариваются крестьянами, и отваръ принимается, какъ хорошее мочегонное средство при водянкѣ; отваромъ листьевъ обмываютъ тѣло отъ укусовъ насекомыхъ.

Въ гомеопатіи спиртная настойка изъ свѣже-выжатого сока петрушки считается лучшимъ средствомъ отъ триппера. Даютъ 1—2 капли чистой настойки или 1, 2, 3-го разведенія по нѣсколько разъ въ день.

Въ ветеринарной медицинѣ петрушка дается при задержкѣ мочи, а также когда животныя замѣтно слабѣютъ отъ долго продолжающихся болѣзней; отъ ревматизма, сапа, застарѣлой коросты и другихъ опухолей, отъ отека подкожной кѣтчатки, скопленія жидкости въ брюшной полости и отъ хроническаго воспаления легкихъ. Лошадямъ и рогатому скоту даютъ отваръ петрушки изъ $1\frac{1}{2}$ унца до $1\frac{1}{2}$ унца (15,0—45,0 грм.), свиньямъ и овцамъ—отъ 1 драхмы до 3 др. (4,0—12,0 грм.), собакамъ—отъ 8 грн. до 1 драхмы (0,6—4,0 грм.) заразъ; такіе приемы повторяютъ черезъ 2—3 часа. Петрушку варятъ вмѣстѣ съ ромашкой, травой бѣлены и съ слизистыми веществами. Изъ сѣмянъ петрушки, превращенныхъ въ порошокъ, вмѣстѣ съ масломъ или свинымъ саломъ дѣлаютъ мазь, которая убиваетъ насѣкомыхъ, въ особенности вшей; на 2 унца (60,0 грм.) масла берется 1 унцъ (30 грм.) сѣмянъ или-же, что лучше, изъ этого-же количества сѣмени приготавливаютъ отваръ на 12 унцій (360,0 грм.) воды; этимъ отваромъ обмываютъ животныхъ. Сѣмя дѣйствуетъ сильнѣе корней и листьевъ петрушки, потому въ ветеринарной медицинѣ и употребляется чаще. Листья крестьянами почти не употребляются, а корни разρίζаютъ и кладутъ въ кормъ животнымъ.

Петрушка полевая, см. Герань луговая (*Geranium pratense* L.).

Петрушка полевая, см. Петрушка горная (*Peucedanum Oreoselinum* Moench.).

Петрушка польная, см. Герань луговая (*Geranium pratense* L.).

Петрушка собачья (*Aethusa Cynapium* L., s. *Cynapium Rivini*). Вехъ (Влад.), Зноиха (Сл. Церк.), Кокорышъ (Малор.), Блекоть (Гродн. съ пол.), Собачница петрушечная, Омега малая, Мордовникъ (Гродн.), Морковникъ, Залевъ. Ядовитая однолѣтняя сорная трава изъ семейства «зонтичныхъ» (*Umbelliferae* Juss.), распространенная почти во всей Европѣ и почти во всей Россіи, очень похожая на петрушку, отъ которой ее легко можно отличить по листьямъ, издающимъ при растираніи ихъ неприятный запахъ, по бѣлымъ цвѣтамъ и по длиннымъ трехлиственнымъ одностороннимъ обверточкамъ при зонтикахъ. Стебель прямостоящій, выш. 7—22 $\frac{1}{2}$ вершк., съ блестящими двояко или тройко-перистыми листьями. Зонтичныя соцвѣтія образуютъ сложные на длинныхъ ножкахъ зонтики о 8—12 лучахъ, безъ обвертокъ; обверточки состоятъ изъ 2—3 линейныхъ длинныхъ, отогнутыхъ внизъ, прицѣпниковъ. Чашечка съ 5 незамѣтными зубцами. Лепестковъ вѣнчика и тычинокъ по 5; лепестки глубоко-выемчатые. Завязь нижняя 2-хлѣздная, снабженная на верхушкѣ железистымъ дискомъ. Столбиковъ 2. Плодъ—яйцевидно-шаровидная двусѣмянка, распадающаяся при созрѣваніи на 2 плодика съ 5 толстыми, острыми, сильно выдающимися ребрами. Цвѣтетъ съ іюня до октября. Растетъ на сорныхъ мѣстахъ, огородахъ и въ садахъ. (Рис. 216.)

МЕДИЦИННОЕ УПОТРЕБЛЕНІЕ собачьей петрушки неизвѣстно

въ Россіи. Въ Венгріи сокъ растенія употребляютъ отъ почечнаго песка.

Петрушка собачья, см. Вехъ ядовитый (*Cicuta virosa* L.).

Петрушка собачья, см. Болиголовъ крапчатый (*Conium maculatum* L.).

Петрушка собачья, см. Укропъ конскій (*Oenanthe Phellandrium* L.).

Петрушникъ, см. Болиголовъ крапчатый (*Conium maculatum* L.).

Печатошникъ, см. Касатикъ водяной (*Iris pseudacorus* L.).

Печенковая трава, см. Пролѣска (*Anemone Hepatica* L.).

Печеночникъ, см. Реняшокъ обыкновенный (*Agrimonia Eupatorium* L.).

Печеночникъ, см. Чистотѣль большой (*Chelidonium majus* L.).

Печеночница, см. Пролѣска (*Anemone Hepatica* L.).

Печеношникъ, см. Пролѣска (*Anemone Hepatica* L.).

Печерникъ, см. Кошачьи лапки (*Antennaria dioica* Gärtn.).

Печерникъ, см. Пшпъ (*Helychrisum arenarium* Dc.).

Печорникъ, см. Кошачьи лапки (*Antennaria dioica* L.).

Печорникъ пятилистный, см. Лапчатка ползучая (*Potentilla reptans* L.).

Печура } см. Бѣлый грибъ (*Boletus edulis* Bull.).

Печура-грибъ }

Печынникъ, см. Реняшокъ обыкновенный (*Agrimonia Eupatorium* L.).

Пивонія, см. Пионъ обыкновенный (*Paeonia officinalis* Retz.).

Пиганъ, см. Рута дикая (*Peganum Harmala* L.).

Пигва, см. Айва (*Cydonia vulgaris* Pers.).

Пигвовое дерево, см. Айва (*Cydonia vulgaris* Pers.).

Пидыйма, см. Гравилатъ водяной (*Geum rivale* L.).

Пижельникъ, см. Каділо пахучее (*Melittis Melissophyllum* L.).

Пижма, см. Желтуха (*Senecio Jacobea* L.).

Пижма (*Tanacetum vulgare* L.). Фармацевтическое названіе: *Tanacetum luteum* s. *vulgare* (Herba), *Herba Athanasiae*. Бризжанка (Курск.), Бухта (Олон.), Вротичъ, Вротичъ и изм. Вратичъ, Протычъ, Навротичъ (Малор.), Глиетникъ, Глиетница, Горлянка (Тул., Вор.), Девятильникъ (Сиб., Вят., Перм.), Девятильникъ желтый (Перм.), Девятисиль (Томск.), Девятиха, Девятиха желтая, Девятуха (Арх.), Девясиль (Каз.), Девятибратная (Вол.), Девятибратъ (Перм.), Десятинникъ, Десятильникъ, Деревей желтый (Тавр.), Душечникъ (Вор.), Козельникъ (Тамб.), Коровай (Кіев.), Кудрявецъ (Мал.), Ломотная (Нижег.), Маточникъ (Ворон.), Медвѣжье ухо, Норичная (Олон.), Папоротникъ, Пижмо (Екат., Малор.), Пижмо (Умань, Волог., Под.), Пижмы, Фижма, Полюнь (Иск.), Приворотень, Приворотень (Кіев.), Пуговичникъ, Пулавка (Алт.), Рай-цвѣтъ (Хар.), Романикъ (Арх.), Романика (Арх.), Ромешекъ (Лубны), Рябинка (весьма мног. губ. внутр. Россіи), Рябинка Богова (Костр., Галич.), Рябина дикая, Рябинка дикая, Рябинка желтая, Рябинка полевая (весьма мног. губ. внутри Россіи), Ря-

Бинникъ желтый (Вят.), Рябинчикъ (Малор.), Рябишникъ (Ворон., Тар.), Сорокобратовъ, Сорочьи лапы (Уф.), Сузиекъ, Шальникъ (Кiev.), Чашечникъ (Ворон.). Очень пахучая многолѣтняя трава изъ семейства «сложноцвѣтныхъ» (*Compositae* Adans.), распространенная во всей Европѣ и почти во всей Россіи. Стебель прямостоящій, выш. 14—22½ вершк. Листья большіе, перисто-разсѣченные, съ зубчатыми или перисто-надрѣзными, продолговато-ланцетными долями. Многочисленные золотисто-желтыя корзинки собраны на верхушкѣ стебля въ большое плоское щитковидное соцвѣтіе. Цвѣты желтые, съ краевыми трубчатыми, 3-зубчатыми женскими цвѣтами. Тычинокъ 5; завязь нижняя одногнѣздная, съ однимъ столбикомъ. Плодъ—5-тигранная сѣмянка безъ хохолка. Цвѣтетъ во второй половинѣ лѣта. Растетъ на поляхъ и между кустарниками. Всѣ части растенія отличаются сильнымъ запахомъ и горькимъ вкусомъ. Для употребленія собираютъ: одну траву—въ маѣ и въ іюнѣ, траву съ цвѣтами—когда послѣдніе начинаютъ распускаться, а сѣмена—осенью.

МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНІЕ. Всѣ части растенія имѣютъ сильный запахъ и горькій вкусъ, а особенно сѣмена, и употребляются въ медицинѣ при слабости пищеваренія, а въ особенности противъ мелкихъ дѣтскихъ глисть и отъ круглой глисты; прежде врачи давали пижму также отъ ревматизма и ипохондріи. Въ Россіи, какъ народное средство, растеніе употребляется отъ водоболзни. Траву кладутъ въ пиво вмѣсто хмеля; изрѣзанная мелко она насыпается на мясо, предохраняя его отъ мухъ, которыя кладутъ на мясо свои яйца. Въ Сибири пижма извѣстна подъ именемъ девятильника клоповнаго. Его раздѣляютъ на мужской и женскій. Послѣдній отличается ямочками на цвѣточныхъ головкахъ. Мужской считается полезнымъ отъ желтухи для мужчинъ, а женскій—отъ той-же болѣзни у женщинъ. Его парятъ и пьютъ вмѣсто чая. Во многихъ губерніяхъ онъ употребляется отъ головной боли, отъ головокруженія, отъ ломоты, желчи, падушей болѣзни и отъ остановки мѣсячныхъ кровей. Приемъ отвара вызываетъ сонъ.

Въ ветеринарной медицинѣ отваръ растенія дается отъ глистовъ. Въ Курской губерніи животнымъ даютъ отъ «порицы». Пижма, см. Шандра обыкновенная (*Marrubium vulgare* L.). Пижмо, см. Пижма (*Tanacetum vulgare* L.). Пижмочка, см. Адокса мускусная (*Adoxa moschatellina* L.). Пижмы, см. Пижма (*Tanacetum vulgare* L.). Пизмо, см. Желтуха (*Senecio Jacobea* L.). Пикана, см. Борщевикъ сибирскій (*Heracleum sibiricum* L.). Пикана, см. Шавель малый (*Rumex Acetosella* L.). Пикантъ, см. Борщевикъ сибирскій (*Heracleum sibiricum* L.). Пикульки, см. Ленъ дикій (*Linaria vulgaris* Mill.). Пикульникъ, см. Шиповникъ обыкновенный (*Rosa canina* L.). Пикульникъ, см. Смолевка ночецвѣтная (*Silene noctiflora* L.). Пикульникъ, см. Пикульникъ длинноцвѣтный (*Galeopsis Lada-*

Пикульникъ длинноцвѣтный (*Galeopsis Ladanum* L.). Жабрей, Базилика полевая (Минск.), Василекъ полевой (Малор.), Буквица лѣсная (Нижег.), Бѣлка, Бѣлавка (Яросл.), Золотникъ (Вятск.), Колосница лѣтняя (Вил.), Крапива разноцвѣтная, Крапивникъ разноцвѣтный, Ливаль, Медникъ розовый, Пупекъ отъ червей, Пѣтушникъ, Пустенька, Разноцвѣтъ, Торница дикая (Олон.), Щелкунъ (Вор.). Однолѣтнее травянистое растеніе изъ семейства «губоцвѣтныхъ» (*Labiatae* Juss.), распространенное почти во всей Европѣ и весьма обыкновенное въ Россіи. Стебель выш. $3\frac{1}{2}$ — $12\frac{1}{2}$ вершк., покрытый мягкими волосами. Листья коротко-черешковые, ланцетные или овально-ланцетные, зубчатые. Пурпуровые цвѣты по 6—10 въ мутовкахъ. Чашечка широко-колокольчатая, съ 5 маленькими зубцами и 10 жилками; вѣнчикъ съ расширенною у зѣва трубкою, двугубый, почти въ 3 раза длиннѣе чашечки; верхняя губа вогнутая въ видѣ шлема, спереди зубчатая, нижняя—3-хлопастная, съ обратнo-сердцевидною среднею лопастью. Тычинокъ 4, двусильныхъ, параллельныхъ подъ верхнею губою, боковыя 2 длиннѣе; гнѣзда пыльниковъ расходящіяся, раскрывающіяся каждое на 2 створки, изъ которыхъ меньшая рѣсничатая. Завязь верхняя 4-хлопастная, 4-гнѣздная, съ столбикомъ, оканчивающимся 2-храздѣльнымъ рыльцемъ. Плодъ по созрѣваніи распадается на 4 обратнo-сердцевидныхъ, сжатыхъ сверху, округлыхъ орѣшка. Цвѣтетъ лѣтомъ. Растетъ на поляхъ, около дорогъ и на сорныхъ мѣстахъ. (Рис. 217.)

Пикульникъ колючій, см. Медовникъ (*Galeopsis Tetrahit* L.).
Пикульникъ синій, см. Будра плющевидная (*Glechoma hederacea* L.).

Пикушечникъ, см. Ленъ дикій (*Linaria vulgaris* Mill.).

Пикушки, см. Зябра (*Galeopsis versicolor* L.).

Пильная трава, см. Серпуха красильная (*Serratula tinctoria* L.).

Пильникъ, см. Поповникъ обыкновенный (*Chrysanthemum Leucanthemum* L.).

Пимпинель, см. Черноголовникъ кровохлебковый (*Poterium sanguisorba* L.).

Пимпинникъ, см. Бедренецъ обыкновенный (*Pimpinella saxifraga* L.).

Пимпринелла, см. Черноголовникъ кровохлебковый (*Poterium sanguisorba* L.).

Пирей } см. Пирей ползучій (*Triticum repens* L.).
Пирій }

Пирожки черныя, см. Спорынья (*Sclerotium Clavus* L.).

Пискарникъ, см. Сивецъ луговой (*Scabiosa succisa* L.).

Писключок } см. Пасленъ черный (*Solanum nigrum* L.).
Писключоква }

Пискуля, см. Медовникъ (*Galeopsis Tetrahit* L.).

Пискунъ, см. Колокольчикъ персиколистный (*Campanula persicifolia* L.).

Пискунецъ, см. Ежеголовка вѣтвистая (*Sparganium ramosum* L.).

Пискуха, см. Медовникъ (*Galeopsis Tetrahit* L.).

Пистовникъ, см. Дягиль лѣсной (*Angelica silvestris* L.).

Питульникъ, см. Чистецъ прямой (*Stachys recta* L.).

Питушки красны, см. Шпажникъ черепичатый (*Gladolus imbricatus* L.).

Пихта, см. Пихта европейская, или гребенчатая (*Abies pectinata* Dc.).

Пихта, см. Пихта сибирская (*Abies sibirica* Ledeb.).

Пихта европейская, или гребенчатая (*Abies pectinata* Dc., *Pinus Abies*, *Abies vulgaris*). Пихта, Свирка, Свирковое дерево, Шмерка. Вѣчно-зеленое красное пирамидальное дерево, выши. въ нѣсколько сажень, изъ семейства «еловыхъ» (*Abietineae* Rich.), распространенное въ средней и южной Европѣ, въ прибалтійскихъ губерніяхъ. Кора сѣровая, главныя вѣтви расположены кольчато. Хвои одиночныя, короткія, плоскія, сверху темно-зеленыя, снизу съ двумя бѣлыми продольными полосками, на вѣтвяхъ хвои расправлены гребенчато на двѣ стороны. Цвѣты однодомныя. Мужскіе цвѣты одиночныя. Шишки (женское соцвѣтіе) цилиндрическія, прямостоящія, длиною до 3½ в., съ плотно-прилегающими тупыми чешуями, между которыми выступаютъ наружу острые кончики прицвѣтниковъ. Мужскіе цвѣты съ многочисленными тычинками, несущими по два пыльцевыхъ мѣшка, раскрывающихся поперекъ. По созрѣваніи шишка разсыпается, причемъ чешуи и прицвѣтники отпадаютъ, а на деревѣ остается одинъ только стержень. Сѣмя 3-хугольное, клиновидное, снабженное крылышкомъ, созрѣваетъ въ одинъ годъ. Цвѣтетъ весной. Древесина идетъ на разныя подѣлки и топливо; изъ хвой добывается лучшее хвойное масло (страсбургскій, или венеціанскій терпентинъ.) (Табл. XXXVI, фиг. 198—200.)

МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНІЕ. Пихта содержитъ въ себѣ масло. Декоктъ, сваренный изъ молоденькихъ иголъ и почекъ пихты, употребляется въ народѣ отъ цынги и ломоты въ костяхъ; также его хвалятъ, какъ мочегонное. Вытекающая изъ дерева черезъ сдѣланныя въ немъ насѣчки смола похожа по своему составу на терпентинъ. Для наружнаго употребленія изъ нея дѣлають мазь.

Пихта сибирская (*Abies sibirica* Ledeb.). Певгъ. Дерево изъ семейства «еловыхъ» (*Abietineae* Rich.), образующее лѣса въ сѣверо-восточной Россіи и Сибири, походитъ на пихту европейскую (описаніе см. выше), но шишки почти вдвое короче, прицвѣтники ихъ скрыты подъ чешуями, хвои вдвое уже и сидятъ на вѣтвяхъ очень густо.

Пичинково зилье, см. Чистотѣль большой (*Chelidonium majus* L.).

Пичужница, см. Колокольчикъ раскидистый (*Campanula patula* L.).

- Пищальникъ**, см. Бузина красная (*Sambucus racemosa* L.).
- Пищальникъ**, см. Бузина вонючая (*Sambucus ebulus* L.).
- Пищальница**, см. Бузина красная (*Sambucus racemosa* L.).
- Півники**, см. Чпна весенняя (*Orobus vernus* L.).
- Півники болотні**, см. Касатикъ водяной (*Iris pseudacorus* L.).
- Півники садовіе**, см. Касатикъ нѣмецкій (*Iris germanica* L.).
- Підбилъ**, см. Мать и мачиха (*Tussilago Farfara* L.).
- Підлистникъ**, см. Копытень европейск. (*Asarum europaeum* L.).
- Підтинникъ** } см. Норичникъ узловатый (*Scrofularia po-*
- Підтынникъ** } *dosa* L.).
- Підчасъ**, см. Спаржа обыкновенная (*Asparagus officinalis* L.).
- Пионія кусть цвѣточный**, см. Пионъ обыкновенный (*Paeonia officinalis* Retz.).
- Пионъ** } см. Пионъ обыкновенный (*Paeonia officinalis* Retz.).
- Пионъ женскій** } *nalis* Retz.).
- Пионъ обыкновенный** (*Paeonia officinalis* Retz.). Въ фармацевтическомъ назв. цвѣты наз.: *Flores Rosae benedictae* s. *reginae*. Пионъ женскій, Пионія кусть цвѣточный, Пивонія (Малор.), Пионъ, Марьяинъ корень. Многолѣтнее травянистое, съ шишковатыми продолговатыми корнями, растение изъ семейства «лютиковыхъ» (*Ranunculaceae* Juss.), родомъ изъ южной Европы, въ Россіи оно дико не встрѣчается, выш. 7—14 вершк. Листья съ пыльными или 2—3-храздѣльными листочками. Цвѣты красные. Чашечка зеленая, 5-тилистная, остающаяся; лепестковъ 5 и болѣе. Тычинокъ много; пыльники ихъ раскрываются продольными щелями. Вокругъ пестика дискъ. Плодъ состоитъ изъ 2—3 листовокъ. Цвѣтетъ весною. Разводится часто въ садахъ, преимущественно съ махровыми цвѣтами. Нѣкоторые азіатскіе виды также употребляются, какъ красивыя садовыя декоративныя растенія. (Табл. XXXVII, фиг. 205.)
- МЕДИЦИННОЕ УПОТРЕБЛЕНІЕ.** Въ народѣ корень растенія употребляется противъ коликъ у дѣтей. Въ Сибири корень сушатъ и подмѣшиваютъ въ мясную похлебку.
- Пионъ тонколистный** (*Paeonia tenuifolia* L.). Варенецъ, Воронецъ (Малор.), Воронецъ (Курск., Екат., Херс., Бесс.), Вареная трава, Воронокъ (Курск., Ворон.), Воронущко, Зеленика (Сарат.), Мошка-трава (Уф.). Многолѣтнее травянистое растение съ шишковатыми продолговатыми корнями на ножкахъ изъ семейства «лютиковыхъ» (*Ranunculaceae* Juss.), распространенное въ средней Европѣ, въ южной и средней Россіи. Листья съ листочками, раздѣченными на линейныя доли. Цвѣты крупныя кроваво-красныя. Чашечка зеленая 5-тилистная, остающаяся. Лепестковъ 5 и болѣе. Тычинокъ много, съ пыльниками, раскрывающимися продольными щелями. Пестикъ до основанія окруженъ дискомъ. Плодъ состоитъ изъ 2-3 пушисто-войлочныхъ, стогнутыхъ листовокъ. Цвѣтетъ весной. Растетъ на холмахъ. Въ Саратовской губерніи употребляется для добыванія изъ него зеленой краски.

Піяки, см. Голубика (*Vaccinium uliginosum* L.).

Плавунъ, см. Плакунъ-трава (*Lythrum salicaria* L.).

Плавунъ нимфейный (*Limnathemum nymphaeoides* Link.). Водяное многолѣтнее травянистое растение изъ семейства «горечавковыхъ» (*Gentianaceae* Juss.), распространенное въ средней Европѣ и изрѣдка встрѣчающееся въ западной и южной Россіи, съ ползучимъ корневищемъ, съ длиннымъ ползучимъ вѣтвистымъ стеблемъ, поднимающимся до поверхности воды и несущимъ на концѣ пучекъ округло-сердцевидныхъ плавающихъ листьевъ, сверху блестящихъ; верхніе листья—сближенные попарно и обыкновенно супротивные; въ углу одного изъ нихъ сидитъ кажущійся пазушнымъ, но собственно верхушечный, пучекъ крупныхъ желтыхъ цвѣтовъ на длинныхъ цвѣтоножкахъ. Чашечка колокольчатая, 5-тираздѣльная, съ ланцетными долями; вѣнчикъ колесовидный, съ 5-тираздѣльнымъ отгибомъ, съ обратно-яйцевидными тупыми долями, бахромчатыми по краямъ, и съ рѣснитчатымъ зѣвомъ. Тычинокъ 5, съ короткими нитями. Завязь верхняя одногнѣздная, съ простымъ короткимъ столбикомъ, несущимъ двулопастное рыльце. При основаніи завязи 5 малозамѣтныхъ железокъ. Плодъ—яйцевидная сжатая, не раскрывающаяся коробочка, съ сплюснутыми по краямъ рѣснитчатыми сѣменами. Цвѣтетъ во второй половинѣ лѣта. Растетъ въ стоячихъ, медленно-текущихъ водахъ. (Рис. 218.)

Плавунцы желтые, см. Кувшинка желтая (*Nuphar luteum* Smith.).

Плавутникъ, см. Турча болотная (*Hottonia palustris* L.).

Плакунъ, см. Иванъ-чай (*Epilobium angustifolium* L.).

Плакунъ, см. Плакунъ-трава (*Lythrum salicaria* L.).

Плакунъ, см. Дербенникъ прутняковый (*Lythrum virgatum* L.).

Плакунъ, см. Донникъ бѣлый (*Millilotus alba* Desf.).

Плакунъ, см. Сивецъ луговой (*Scabiosa succisa* L.).

Плакунъ-корень, см. Плакунъ-трава (*Lythrum salicaria* L.).

Плакунъ-трава, см. Кукункины слезки (*Orchis maculata* L.).

Плакунъ-трава, см. Медуница (*Spiraea ulmaria* L.).

Плакунъ-трава (*Lythrum salicaria* L.). Фармацевтическое названіе: *Salicaria s. Lythmachia purpurea*. Богородицкая трава (Вор.), Божья трава (Сарат.), Боровой бобикъ (Гродн.), Болотный борячокъ (Полт.), Дѣдова трава (Астр.), Васильки полевые (Кіев., Екат., Полт.), Васильки дикіе, или луговые (Екат.), Верба-трава (Сумы), Вербовая трава, Вербова трава, Вербовникъ, Горлевникъ (Могил.), Горчакъ (Екат.), Дербенникъ (Курск.), Дубнякъ, Дубникъ (Ставр.), Жерстель, Залізникъ черный (Малор.), Залізникъ червоный, Зелезникъ плавный (Херс.), Камышъ боровой (Ниж.), Козолчокъ (Ниж.), Коноплянка озерная, Красота дѣвичья (Ниж.), Кровавница, Левконія полевая (Минск.), Мазорка, Плавунъ, Плакунъ (Вел. Росс., Малор.), Плакунъ-корень, Подбережникъ (Малор.), Разноцвѣтъ (Ниж.), Синій цвѣтъ трава (Влад.), Скрипунъ, Скрипякъ (Тв., Ост., Пуп.), Твердыкъ (Малор.), Твердынка (Смол.), Тройчакъ, Скрышій водяной, Султанчики синіе (Ворон.),

Утробникъ, Хвостачъ красно-спій (Курск.), Чай луговой, Раковыя шейки (Могил.). Многолѣтнее травянистое растеніе изъ семейства «дербенниковыхъ» (Lythraeae Juss.), распространенное почти во всей Европѣ и почти во всей Россіи, выш. 12¹/₂—28 вершк., болѣе или менѣе пушистое. Стебель—прямой, гранистый, съ супротивными, мутовчатыми, по 3 листа въ кольцо, сидящими сердцевидно-ланцетными листьями. Пурпуровые цвѣты собраны длинною прямоюяющею колесовидною метелкой. Чашечка трубчатая, 12-тизубчатая; лепестковъ 6 ланцетныхъ, значительно превышающихъ чашечку. Тычинокъ 12; 6 изъ нихъ длиннѣе остальныхъ. Завязь свободная, 2-хлѣздная, съ простымъ длиннымъ столбикомъ съ головчатымъ рыльцемъ. Плодъ—овальная двустворчатая коробочка, вдвое короче чашечки. Цвѣтетъ лѣтомъ. Растетъ на сырыхъ мѣстахъ, болотахъ и по берегамъ рѣкъ.

МЕДИЦИННОЕ УПОТРЕБЛЕНІЕ. Плакунъ-травѣ употребляется въ народной медицинѣ отъ родимчика у дѣтей (Уфим. губ.), отъ тѣлесной слабости (Кіевской губ.), отъ колющихъ болей въ животѣ. Отваръ травы, принятый внутрь, производитъ испарину. Въ немъ купаютъ дѣтей отъ испуга и судорогъ (Орлов. губ.). Стебель употребляется въ пищу.

Пластиночникъ пальчатая, см. Капуста морская (*Laminaria digitata* Lamrx.).

Платанъ (*Platanus* L.). Сикоморъ, Яворъ, Чинаръ. Высокія деревья съ большими ланчатыми листьями. Различаютъ 2 вида платана: платанъ американскій, родомъ изъ Америки, и платанъ азіатскій, родомъ изъ Азіи, или, иначе, чинаръ. Благодаря быстрому росту платановъ, ихъ яркой зеленіи, на югѣ ими нерѣдко украшаютъ аллеи парковъ и садовъ. Блѣдно-желтая твердая и вѣжная древесина употребляется въ столярномъ дѣлѣ, какъ поделочный матеріалъ, и для постройки судовъ.

Плаунъ, см. Плаунъ булавистый (*Lycopodium clavatum* L.).

Плаунъ, см. Плаунъ сплюснутый (*Lycopodium complanatum* L.).

Плаунъ аптекарскій, см. Плаунъ булавистый (*Lycopodium clavatum* L.).

Плаунъ булавистый, или аптекарскій (*Lycopodium clavatum* L.). Фармацевтическое назв.: *Muscus clavatus* s. *terrestris* (Herba), *Semen* v. *Pulvis Lycopodii*, s. *Sulphur vegetabile* (Semen). Бронецъ (Моск.), Вѣгунъ (Кал.), Воронецъ (Гродн.), Грыжная трава (Твер.), Дереза (Малор.), Дерюза (Смол., Тамб., Кал.), Дереза (Могил., Гродн.), Дзерезъ боровой (Гродн.), Дерябка (Кал., Волог., Ниж.), Дереба, Деряба (Нижег.), Деряга (Твер., Волог., Иск.), Дзарага (Гродн.), Дерига (Арх.), Дерюга, Дерникъ, Деряжка, Заячи возжи (Арх.), Зеленька, Зеленика (Ниж.), Зеленица, Зеленичникъ (Олон.), Зелениха (Перм.), Колотинникъ, Колтунникъ, Мохъ земляной, Мохъ змѣиный, Наперстница (Олон.), Плаунъ-травѣ, Плаунъ аптекарскій, Плывунъ (Ниж.), Плувунъ слабительный (Костр.), Ползучка (Шенкурск.), Поколунка (Влад.), Порущевка, Топтунъ (Вят.), Цякунъ (Мог.). Небольшое вѣчно-зеле-

ное многолѣтнее растеніе изъ семейства «плауновыхъ» (*Lycopodiaceae* DC.), распространенное въ Азіи, въ большей части Европы, въ средней, сѣверной Россіи и въ Сибири. Стебель очень длинный, ползучій, съ восходящими вѣтвями. Размножается спорами, помѣщающимися въ особые вмѣстителища, «спорангіяхъ», которые находятся въ пазухахъ болѣе мелкихъ листьевъ и расположены въ колоскахъ на довольно длинныхъ ножкахъ. Растетъ въ хвойныхъ лѣсахъ. Споры его собираются въ августъ и сентябрь, для чего отрѣзываютъ колоски, сушатъ въ печи или на солнцѣ и выбиваютъ споры, которые отдѣляются ввидѣ пыли и представляютъ желтоватый тонкій, мягкій порошокъ, на ощупь скользкій, безъ запаха и вкуса; онъ не растворяется въ водѣ и весьма трудно въ спиртѣ, но въ соприкосновеніи съ горящимъ тѣломъ легко воспламеняется, почему употребляется въ театрахъ для воспроизведенія молніи, въ нѣкоторыхъ физическихъ опытахъ и проч. Порошокъ этотъ въ аптекахъ продается подъ именемъ «плауноваго сѣмени». Въ Норвегіи травой красятъ ткани въ синий цвѣтъ и дѣлаютъ изъ нея половики. Высушенные листья красятъ матеріи въ зеленый цвѣтъ. (Рис. 219)

МЕДИЦИННОЕ УПОТРЕБЛЕНІЕ. Въ медицинѣ плауновое сѣмя употребляется для присыпки отъ опрѣлости у дѣтей и служить для приготовления пылюбой массы. Въ народной медицинѣ оно употребляется гораздо чаще. Въ Тверской губерніи сѣмена варятъ или топятъ въ постномъ маслѣ съ воскомъ и ввидѣ мази прикладываютъ къ вередамъ и язвамъ, а сѣменной пылью кормятъ и поятъ скотъ отъ мыта и чумы. Присыпкою посыпаютъ раны и перепрѣлыя мѣста. Высушенные листья растенія даютъ лошадямъ отъ запора. Въ Вологодской губерніи существуетъ суевѣріе, что, если траву держать въ домѣ, то будетъ ссора.

Плаунъ живородящій, или Дерябникъ (*Lycopodium Selago* L.). Фармацевтическое назв.: *Selago, Muscus erectus, s. catharticus*. Баранецъ (Влад.), Воронежъ дикій, Видлакъ, Козликъ тр. Небольшое многолѣтнее вѣчно-зеленое растеніе изъ семейства «плауновыхъ» (*Lycopodiaceae* DC.) распространенное въ средней, особенно въ сѣверной Европѣ, въ Сѣв. Америкѣ и въ Сибири. Стебель вѣтвистый отъ самаго основанія, 1—3½ вершк. вышины, прямостоящій. Листья ланцетовидные, кожистые, густо покрываютъ стебель. Размножается спорами, помѣщающимися въ «спорангіяхъ» (т. е., въ особые вмѣстителища), которые находятся въ углахъ листьевъ. Растетъ въ густыхъ тѣнистыхъ, особенно еловыхъ лѣсахъ. Въ Швеціи отваромъ растенія моютъ скотъ, если на него нападаютъ насѣкомыя. Растеніе ядовитое. Въ медицинѣ не употребляется. (Рис. 220.)

Плаунъ сплюснутый (*Lycopodium complanatum* L.). Баранецъ. Боръ-зілле (Малор.). Боръ-зелье (Малор.). Боровая кислота (Пет.), Деряба (Моск.). Деряба пустая, безпыльная (Твер.), Деряжка, Зеленика (Влад., Вят.), Зеленица (Пенз., Тв., Новг., Вятск. и др.), Зеленица (Черн.), Плаунъ (Мог.), Порушникъ (Кіев.). Неболь-

шое вѣчно-зеленое многолѣтнее растеніе изъ семейства «плауновыхъ» (*Lycopodiaceae* Dc.), распространенное въ сѣверной и средней Европѣ, въ Сѣв. Америкѣ, въ сѣверной и средней Россіи и въ Сибири. Стебель ползучій, съ вверхъ-стоящими, вилкообразно сплюснутыми вѣтвистыми вѣтвями; листья мелкіе, ланцетные, острые. Въ углахъ верхушечныхъ листьевъ находятся спорангіи (особыя выѣстилища) со спорами. Растетъ на песчаной почвѣ, въ сосновыхъ лѣсахъ.

Плевелъ, см. Рисъ канадскій (*Zizania aquatica* L.).

Плевелъ, см. Райграссъ англійскій (*Lolium perenne* L.).

Плевелъ, см. Плевелъ одуряющій (*Lolium temulentum* L.).

Плевелъ многолѣтній, см. Райграссъ англійскій (*Lolium perenne* L.).

Плевелъ одуряющій (*Lolium temulentum* L.). Головня, Головоломъ, Куколь, Плевелы (Матѣ. XIII, 25 и слѣд.), Пипонецъ, Роженецъ (Сл. Церк.), Хлѣбъ пьяный, Повой въ пшеницѣ растущій, Головня въ растущемъ хлѣбѣ, Кострика-трава, или головня въ растущемъ хлѣбѣ, Цырей пьянишникъ, Торица въ растущемъ хлѣбѣ; а по слав. Волчець, Галка въ хлѣбѣ или Головня-трава. Однолѣтнее травянистое растеніе изъ семейства «злаковыхъ» (*Gramineae* Juss.), распространенное въ средней и южной Европѣ, въ западной, средней и юго-западной Россіи, на Кавказѣ, Уралѣ и въ Туркестанѣ. Стебель прямостоящій, выш. 7—22½ верш., довольно толстый; листья обыкновенно широколинейные, въ почкосложеніи свернутые; колосъ длинный, состоящій изъ довольно крупныхъ продолговатыхъ 3—8 цвѣтковыхъ колосковъ, сжатыхъ съ боковъ, сидящихъ на выступѣ стержня поодиночкѣ и обращенныхъ къ нему ребромъ. Всѣ колоски, исключая верхушечнаго, снабжены только одною створкой, одинаковой длины съ колоскомъ; цвѣточные пленки снабжены остью, выступающей ниже верхушки. Околоцвѣтникъ состоитъ изъ 2 пѣжныхъ пленочекъ. Плодъ—продолговатое зерно, съ внутренней стороны желобчатое. Цвѣтетъ лѣтомъ, принадлежитъ къ сорнымъ травамъ, произрастающимъ на поляхъ между посѣвами. Зерна растенія содержатъ наркотическое вещество, дѣйствующее, какъ дурманъ. (Рис 221.)

МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНІЕ. Сѣмена растенія плевела одуряющаго ядовиты, и случайная примѣсь ихъ къ хлѣбу можетъ вызвать потерю зрѣнія; поэтому растеніе это въ медицинѣ совершенно не употребляется, и крестьяне всѣми способами стараются вывести его съ полей. Сѣмена его, принятые внутрь, ослѣпляютъ и на нѣкоторое время помрачаютъ зрѣніе, люди падаютъ въ обморокъ, у нихъ дѣлаются бредъ, судороги, тошнота, рвота, параличъ конечностей, послѣ чего наступаетъ смерть. Оравленнымъ больнымъ даютъ рвотное и послѣ него кислое питье; укусъ считается противоядіемъ. Питье должно даваться холоднымъ.

Плевелы, см. Плевелъ одуряющій (*Lolium temulentum* L.).

Плевы травы, см. Плевелъ одуряющій (*Lolium temulentum* L.).

Пледъ-трава, см. Щирей (*Amaranthus Blitum* L.).

Плетка, см. Щавель обыкновенный (*Rumex Acetosa* L.).

- Плетникъ, см. Недотрога желтая (*Impatiens noli me tangere* L.).
- Плетняковая трава, см. Пасленъ сладкогорькій (*Solanum dulcamara* L.).
- Плетнякъ, см. Медвѣжье ухо (*Verbascum Thapsus* L.).
- Плеточка, см. Очитокъ острый (*Sedum acre* L.).
- Плетуха, см. Вьюнокъ заборный (*Convolvulus sepium* L.).
- Плетушка, см. Поповникъ непахучій (*Matricaria inodora* L.).
- Плеть женихова, см. Залникъ клубненосный (*Phlomis tuberosa* L.).
- Плеть суконная, см. Медвѣжье ухо (*Verbascum Thapsus* L.).
- Плеть татарская, см. Коровякъ черный (*Verbascum nigrum* L.).
- Плитовникъ, см. Кирказонъ обыкновенный (*Aristolochia Clematidis* L.).
- Плодовая, см. Мята полевая (*Mentha arvensis* L.).
- Плодовая, см. Вшивица болотная (*Pedicularis palustris* L.).
- Плоская трава, см. Вѣйникъ лѣсной (*Colmagrostis silvatica* Dc.).
- Плоскинъ, см. Конопля посѣвная, или обыкновенная (*Cannabis sativa* L.).
- Плосконъ, см. Конопля посѣвная, или обыкновенная (*Cannabis sativa* L.).
- Плоскуха, см. Просо колосистое (*Panicum Crus Galli* L.).
- Плоскуша, см. Щетинникъ зеленый (*Setaria viridis* Beauv.).
- Плотикъ, см. Ленъ дикій (*Linaria vulgaris* Mill.).
- Плоховецъ, см. Волчье лыко (*Daphne Mezereum* L.).
- Плоховецъ, см. Олеандръ (*Nerium Oleander* L.).
- Плоховникъ, см. Облѣиха обыкновенная (*Hippophaë rhamnoides* L.).
- Плувунъ слабительный, см. Плаунъ булавистый (*Lycopodium clavatum* L.).
- Плугодержка, см. Стальникъ пахучій (*Ononis hircina* Jacq.).
- Плывунъ, см. Плаунъ булавистый (*Lycopodium clavatum* L.).
- Плывунъ, см. Колокольчикъ сборный, или приточная трава (*Campanula glomerata* L.).
- Плѣснякъ, см. Горлецъ, раковая шейки (*Poligonum Bistorta* L.).
- Плѣшаки } см. Одуванчикъ лекарственный (*Taraxacum*
- Плѣшивецъ } *Dens Leonis* Desf.).
- Плѣшь попова }
- Плюха луговая, см. Манникъ высокій (*Glyceria spectabilis* M. et K.).
- Плюшникъ, см. Манникъ высокій (*Glyceria spectabilis* Mert. et Koch.).
- Плющевая трава, см. Легочница лекарственная (*Pulmonaria officinalis* L.).
- Плющей, см. Ежеголовка вѣтвистая (*Sparganium ramosum* L.).
- Плющей, см. Рогоза широколистная (*Typha latifolia* L.).

- Плющеперъ**, см. Бѣлозоръ болотный (*Parmassia palustris* L.).
- Плющикъ-трава** } см. Стикта, или Мохъ легочный (*Sticta*
- Плющникъ** } *pulmonacia* Ach.).
- Плющъ**, см. Будра плющевидная (*Glechoma hederacea* L.).
- Плющъ**, см. Плющ обыкновенный (*Hedera Helix* L.).
- Плющъ**, см. Барвинокъ малый (*Vinca minor* L.).
- Плющъ индѣйскій**, см. Чечевичная ягода (*Phytolacca de-*
candra L.).
- Плющъ обыкновенный** (*Hedera Helix* L.). Плющъ, Плющъ, Будра, Вилица, Повелика, Повитель, Повой, Сорочья пряжа, Змѣевникъ, Переступникъ (Гродн.), Прочитанъ (Подол.), Вре-читанъ (Бесс.), Шаленецъ (Гродн.). Вѣчно-зеленый лазящій ку-старникъ изъ семейства «араліевыхъ» (*Araliceae* Juss.), распро-страненный въ средней и южной Европѣ, въ западной Россіи, въ Крыму и на Кавказѣ, своими многочисленными придаточ-ными корнями прикрѣпляющійся къ постороннимъ предметамъ (деревьямъ, скаламъ и т. п.). Листья кожистые, сверху блестя-щіе, на безплодныхъ вѣтвяхъ сердцевидные, 3—5-тилопастные, а на цвѣтоносныхъ—цѣльные ромбически-яйцевидные, заострен-ные. Желтовато-зеленые цвѣты—въ простыхъ зонтикахъ, со-бранныхъ кистью. Окраина чашечки 5-тизубчатая; лепестковъ 5; тычинокъ по 5; завязь нижняя 5-тигнѣздная, съ 5-ю столби-ками, сросшимися между собою въ конусообразный столбочекъ, расширенный при основаніи въ широкій выпуклый надпестич-ный дискъ. Плодъ—черныя ягоды. Цвѣтетъ въ августѣ и сен-тябрь. Растетъ въ лѣсахъ и тѣнистыхъ мѣстахъ. Различныя разновидности его прекрасно культивируются въ комнатахъ. Въ Германіи случается иногда видѣть въ деревняхъ не только цѣлое окно, но чуть не весь потолокъ комнаты, застилаемый зеленью плюща, что служить доказательствомъ нетребователь-ности плюща относительно свѣта. Плющъ, посаженный въ грунтъ (что можно дѣлать только въ южной части Россіи), пе-реноситъ значительные морозы подъ самой легкой покрывкой и даже совсѣмъ безъ нея; тѣмъ не менѣе онъ легко привы-каетъ къ комнатнымъ условіямъ и не любитъ только слиш-комъ жаркихъ и малопровѣтриваемыхъ помѣщеній. При куль-турѣ плюща слѣдуетъ внимательно слѣдить за чистотой, чаще обмывать листья для удаленія съ нихъ паразитовъ. (Т а б л и-ца XXXVII, ф и г. 207.)
- МЕДИЦИННОЕ УПОТРЕБЛЕНІЕ.** Прежде растеніе употребля-лось въ медицинѣ, теперь совсѣмъ оставлено.
- Плющъ поземный**, см. Конытенъ европейскій (*Asarum euro-*
paicum L.).
- Побережникъ**, см. Вероника ключевая (*Veronica Anagallis* L.).
- Пованка**, см. Кукуруза обыкновенная (*Zea Mays* L.).
- Поваренная трава**, см. Ложечная трава (*Cochlearia officinalis* L.).
- Повелика**, см. Вьюнокъ полевой (*Convolvulus arvensis* L.).
- Повелика**, см. Повелика клеверная (*Cuscuta Epithymum* Sm.).
- Повелика**, см. Подмаренникъ цѣпкій (*Galium Aparine* L.).

Повелика, см. Подмаренникъ мареновидный (*Galium rubroides* L.).

Повелика, см. Чина луговая (*Lathyrus pratensis* L.).

Повелика, см. Гречища-вьюнокъ (*Polygonum convolvulus* L.).

Повелика европейская (*Cuscuta europaea* L.). Однолѣтняя чужеродная сорная трава изъ семейства «вьюнковыхъ» (*Convolvulaceae* Juss.), распространенная почти во всей Европѣ, въ Крыму, на Кавказѣ и встрѣчающаяся нѣрѣдко въ Россіи. Тонкій вьющійся красноватый стебель присасывается къ питающимъ растеніямъ посредствомъ маленькихъ бородавчатыхъ присосокъ. Листья мелкіе чешуйчатые, скоро опадающіе. Цвѣты мелкіе розовые, на короткихъ ножкахъ, скученные густыми пучками; при основаніи пучка—кроющій листочекъ. Чашечка до середины 5-тилопастная, почти вдвое короче вѣнчика, при основаніи мясистая, съ тупыми яйцевидными лопастями; вѣнчикъ колокольчатый, 5-тилопастный; лопасти его немного короче его трубочки, яйцевидныя, тупыя, отогнутыя и съ внутри-загнутыми верхушками; въ трубочкѣ его находятся бахромчатая чешуйки подъ основаніемъ тычинокъ. Тычинокъ 5; столбиковъ 2, нитевидныхъ, столь-же длинныхъ, какъ завязь, расходящихся. Завязь двугнѣздная. Плодъ—яйцевидно-шаровидная, раскрывающаяся поперекъ, 2-хлѣздная коробочка. Цвѣтетъ лѣтомъ. Паразитируетъ на крапивѣ, хмелѣ, зонтичныхъ и другихъ растеніяхъ. Растеніе лѣдовитое.

МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНІЕ. Въ гомеопатіи повелика употребляется отъ сыней, отъ зубной боли, отъ чиханія съ обильнымъ отдѣленіемъ слизи. По наблюденіямъ нѣкоторыхъ гомеопатовъ, повелика помогаетъ отъ болѣзненныхъ мѣсячныхъ очищеній и бѣлей. Ее также даютъ отъ головной боли. Даютъ 1—2 капли 1-го или 2-го разведенія, повторяютъ приемы по нѣскольку разъ въ день.

Повелика клеверная (*Cuscuta Epithymum* L.). Фармацевтическое названіе: *Epithymum creticum* (Herba). Забихуха (Вят.), Малина крапивная, Крапивный цвѣтъ (Кал.), Крапивная пряжа, Галочья пряжа, Повелика, Повилица, Повитель, Повитуха, Повеличка, Повитица, Повѣтница (Малор.). Подбихуха, Повойничка, Привѣтница, Привитица, Привѣтница (Малор.), Привитуха (Хар.), Трава войлочная, Трава шелковая, Шелкъ крапивный, Цвѣтъ чабрицынъ, Чабрица-трава. Чужеродная однолѣтняя трава съ краснымъ тонкимъ вьющимся стеблемъ, присасывающимся къ питающимъ растеніямъ посредствомъ маленькихъ бородавчатыхъ присосокъ, изъ семейства «вьюнковыхъ» (*Convolvulaceae* Juss.), распространенная въ средней и южной Европѣ, въ юго-западныхъ и южныхъ губерніяхъ (въ Туркестанѣ и Закавказьѣ); въ средней полосѣ и на востокѣ не встрѣчается. Листья очень маленькіе чешуйчатые, скоро опадающіе. Мелкіе, сравнительно, цвѣты, снабженные короткими ножками, собраны въ многоцвѣтковыхъ шаровидныхъ пучкахъ. Чашечка 5-тилопастная, съ яйцевидными острыми лопастями; вѣнчикъ съ ци-

линдрической, сначала, трубкой, превышающей чашечку и съ почти столь-же длинными простертыми яйцевидными заостренными 5-ю лопастями и со столькими-же бахромчатыми чешуйками, находящимися въ трубкѣ его подъ основаніемъ тычинокъ, загнутыми внутрь, заслоняя входъ въ трубочку. Тычинокъ 5, прикрѣпленныхъ нитями къ трубкѣ вѣнчика и чередующихся съ его лопастями. Столбиковъ 2, питевидныхъ, длинныхъ и выдающихся вмѣстѣ съ тычинками изъ трубочки вѣнчика. Завязь 2-хгнѣздная. Плодъ—шаровидная 2-хгнѣздная коробочка, раскрывающаяся поперекъ. Цвѣтетъ лѣтомъ; принадлежитъ къ сорнымъ травамъ, паразитируетъ на клеверѣ люцернѣ, горохѣ, тимьянѣ и друг.

МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНІЕ. Повелика клеверная древними врачами употреблялась отъ меланхоліи, теперь совсѣмъ оставлена. **Повелика льняная** (*Cuscuta Epilinum* Weihe.). Однолѣтняя чужезданная трава изъ семейства «вьюнковыхъ» (*Convolvulaceae* Juss.), распространенная въ Европѣ, въ Крыму и встрѣчающаяся въ средней и южной Россіи. Тонкій вьющійся зеленовато-желтый стебель прикрѣпляется къ питающимъ растеніямъ помощью корневыхъ маленькихъ бородавочныхъ присосочекъ и несетъ мелкіе чешуйчатые скоро опадающіе листья. Мелкіе желтовато-бѣлые цвѣты, сидячіе, расположены пучками, при основаніи которыхъ находится маленькій крошечный листочекъ. Чашечка почти столь-же длинная, какъ вѣнчикъ, до середины 5-тилопастная, съ широко-яйцевидными лопастями; вѣнчикъ кувшинкообразный; лопасти его вдвое короче его трубочки, 3-хугольные, острые, отогнутыя, бахромчатые чешуйки въ трубкѣ помѣщаются подъ основаніемъ тычинокъ и прижаты къ трубкѣ; столбиковъ 2, короче завязи, расходящихся, съ утолщенными рыльцами. Завязь двугнѣздная. Плодъ—приплюснuto-шаровидная 2-хгнѣздная коробочка, раскрывающаяся поперекъ. Цвѣтетъ лѣтомъ. Паразитируетъ на поляхъ, засѣянныхъ льномъ.

Повелика полевая, см. Подмаренникъ мягкій (*Gallium Mollugo* L.).

Повелица, см. Вьюнокъ полевой (*Convolvulus arvensis* L.).

Повелица, см. Коровякъ черный (*Verbascum nigrum* L.).

Повеличка, см. Повелика клеверная (*Cuscuta Epithimum* Sm.).

Повертень, см. Полѣска многолѣтняя (*Mercurialis perennis* L.).

Повилика, см. Вьюнокъ полевой (*Convolvulus arvensis* L.).

Повилика, см. Вьюнокъ заборный (*Convolvulus sepium* L.).

Повилика, см. Плющъ обыкновенный (*Hedera Helix* L.).

Повилика яловая, см. Гречиха-вьюнокъ (*Polygonum convolvulus* L.).

Повилица, см. Метлица полевая (*Agrostis Spica Ventii* L.).

Повилица, см. Вьюнокъ полевой (*Convolvulus arvensis* L.).

Повилица, см. Вьюнокъ заборный (*Convolvulus sepium* L.).

Повилица, см. Повелика клеверная (*Cuscuta Epithimum* Sm.).

Повилица, см. Подмаренникъ мягкій (*Gallium Mollugo* L.).

- Повилица, см. Подмаренникъ болотный (*Galium palustre* L.).
 Повитель, см. Горошекъ мышиный (*Vicia Cracca* L.).
 Повитель, см. Вьюнокъ полевой (*Convolvulus arvensis* L.).
 Позитель, см. Повелика клеверная (*Cuscuta Epithymum* Sm.).
 Повитель, см. Плющъ обыкновенный (*Hedera Helix* L.).
 Повитель, см. Гречиха-вьюнокъ (*Polygonum convolvulus* L.).
 Повитель желтая, см. Луговой чай (*Lysimachia Nummularia* L.).
 Повитица, } см. Повелика клеверная (*Cuscuta Epithymum* Sm.).
 Повитуха }
 Повитуха, см. Вьюнокъ полевой (*Convolvulus arvensis* L.).
 Повій, см. Жасминъ полевой (*Lycium barbarum* L.).
 Повійка, см. Вьюнокъ полевой (*Convolvulus arvensis* L.).
 Повітица, см. Повелика клеверная (*Cuscuta Epithymum* Sm.).
 Повнякій, см. Короставникъ полевой (*Scabiosa arvensis* L.).
 Повоень, см. Вьюнокъ полевой (*Convolvulus arvensis* L.).
 Повой, см. Плющъ обыкновенный (*Hedera Helix* L.).
 Повой, см. Плевель одуряющій (*Lolium temulentum* L.).
 Повой, см. Жасминъ полевой (*Lycium barbarum* L.).
 Повой благовонный, см. Жимолость вьющаяся (*Lonicera Periclymenum* L.).
 Повой благовонный } см. Жимолость душистая (*Lonicera Ca-
 Повой воинскій } prifolium* L.).
 Повой воловый, см. Барвинокъ малый (*Vinea minor* L.).
 Повой заборный, см. Вьюнокъ заборный (*Convolvulus sepium* L.).
 Повой малый, см. Вьюнокъ полевой (*Convolvulus arvensis* L.).
 Повой подетѣнный, см. Стѣница лекарственная (*Parietaria officinalis* L.).
 Повойка, см. Гречиха-вьюнокъ (*Polygonum convolvulus* L.).
 Повойникъ, см. Алтей лекарственный (*Althaea officinalis* L.).
 Повойничка, см. Повелика клеверная (*Cuscuta Epithymum* L.).
 Повонка, см. Кукуруза обыкновенная (*Zea Mays* L.).
 Повѣсникъ, см. Травянка (*Dianthus deltoides* L.).
 Повѣтренная трава, см. Параличная трава (*Ajuga Chamaepitys* L.).
 Погремки } см. Погремокъ обыкновенный (*Rhinanthus Crista
 Погремокъ } Galli* L.).
 Погремокъ обыкновенный, или Пѣтушій гребень (*Rhinanthus Crista Galli* L.). Братки, Братчики желтые (Волын.), Бубовникъ (Малор.), Брызготка (Черниг.), Буравецъ, Боровецъ, Буровецъ (Курск.), Гремокъ, Гремки, Громки, Гремущникъ, Дивонка (Кiev.), Денежникъ (Волог., Tob., Новг.), Звонецъ (въ больш. ч. России), Звонецъ-сковородка (Могил.), Звоница (Курск.), Звонокъ (Черняевъ, Курск.), Звонки (Ков., Вор.), Звѣнецъ (Черняевъ) и изм. Дзвонецъ (Гродн.), Золотушная (Вор.), Зябрей (Даль), Клопецъ (Менх., Волог., Олон., Твер., Ост., Пун.) и изм. Хлопецъ, Клоповникъ (Твер., Каз.), Клоповица (Ниж.), Ключникъ, Ключики (Могил.), Колколець (Ниж.), Конопляникъ (Черниг.), Конопельникъ,

Копьечникъ, Кушунникъ (Подол.), Липчица (Кiev.), Мышья трава, Пеструшникъ (Пет.), Петровъ крестъ, Погремокъ, Погремки, Погромокъ, Погремушки, Пѣтушникъ, Пѣтушникъ, Пѣтушокъ, Пѣтушій гребень, Снягъ, Свинокоска (Арх.), Талабанъ (Курск.), Телѣжникъ (Пет.), Трусть (Моск., Желѣзн.), Хмелевка (Перм.), Хмель дикій (Вор., Новг.), Хмелекъ (Влад.), Щелкунъ (Нижег.), Шелепунъ (Волын.). Однолѣтнее травянистое растение изъ семейства «норичниковыхъ» (*Scrophulariaceae* R. Br.), распространенное почти во всей Европѣ, въ сѣверной, средней, юго-западной Россіи, въ Крыму, на Кавказѣ и въ Сибири. Стебель простой или слабо-вѣтвистый, выш. $3\frac{1}{2}$ — $10\frac{1}{2}$ вершк. Листья супротивные, сидячіе, ланцетные, пильчатые, съ широкимъ основаниемъ, шероховатые. Цвѣты собраны негустою однобочною кистью; сидятъ на короткихъ цвѣтоножкахъ въ углахъ яйцевидныхъ надрѣзочно-пильчатыхъ прицвѣтниковъ. Чашечка сплюснуто-вздутая, 4-зубчатая, при плодахъ разросшаяся и окружающая плодъ. Вѣнчикъ съ цилиндрической трубкой и двугубымъ отгибомъ, желтый, съ фиолетовыми зубцами на верхней губѣ, сверху шлемообразно-выпуклой, сжатой съ боковъ; нижняя губа отогнутая 3-хлопастная. Тычинокъ 4, съ поперечными мохнатыми остроконечными пыльниками. Завязь верхняя двугнѣздная, съ однимъ столбикомъ. Плодъ—сплюснутая, округлая, раскрывающаяся гнѣздоразрывно коробочка. Цвѣтетъ съ мая до августа. Растетъ на лугахъ. Полупаразитное растеніе. Отваръ его съмыанъ служитъ для истребленія насѣкомыхъ. Въ Воронежской г. зимой для предохраненія рукъ и ногъ отъ стужи натираютъ ихъ сухой травой съ медомъ. Тамъ-же отъ залопа даютъ пить отваръ натошакъ. (Табл. XXXVII, фиг. 206.)

Погремушки } см. Погремокъ обыкновенный (*Rhinanthus Crista*
Погромокъ } *Galli* L.).

Подбережникъ, см. Плакунъ-трава (*Lythrum Salicaria* L.).

Подбилъ, см. Тысячелистникъ обыкновенный (*Achillea Millefolium* L.).

Подбилъ, см. Мать и мачиха (*Tussilago Farfara* L.).

Подбируха, см. Млечникъ лекарственный (*Glaux maritima* L.).

Подбируха, см. Будра плющевидная (*Glechoma hederacea* L.).

Подбируха, см. Гречиха-вьюнокъ (*Polygonum convolvulus* L.).

Подбилъ, см. Бѣлокопытникъ лекарственный (*Petasites officinalis* Moench.).

Подбой, см. Мать и мачиха (*Tussilago Farfara* L.).

Подбрусничникъ, см. Верескъ обыкновенный (*Calluna vulgaris* Salisb.).

Подбѣла красная } см. Тысячелистникъ обыкновенный (*Achil-*
Подбѣлка } *lea Millefolium* L.).

Подбѣлъ, см. Тысячелистникъ обыкновенный (*Achillea Millefolium* L.).

Подбѣлъ, см. Чертополохъ разнолистный (*Cirsium heterophyllum* All.).

Подбѣлъ, см. Наголоватокъ красный (*Jurinea cyanoides* Rich.).

Подбѣлъ, см. Бѣлокопытникъ лекарственный (*Petasites officinalis* Moench.).

Подбѣлъ, см. Гусиная ланка (*Potentilla anserina* L.).

Подбѣлъ, см. Мать и мачиха (*Tussilago Farfara* L.).

Подбѣлъ (*Andromeda polifolia* L.). Андромеда ушколистная, Безплодница, Болотникъ, Пьяная трава, Чахотная трава, Багульникъ, Розмаринъ дикій, Гонгобель. Вѣчно-зеленый кустарникъ изъ семейства «вересковыхъ» (*Ericaceae* Lindl.), распространенный въ сѣверной и средней Европѣ, въ сѣверной и средней Россіи, въ Малороссіи и во всей Сибири, выш. $3\frac{1}{2}$ —7 вершк., съ приподнимающимися вѣтвями и голымъ стеблемъ. Листья кожистые, линейно-ланцетные, съ загнутыми краями, голые, сверху блестящіе, зеленые, снизу бѣловатые. Цвѣты поникающіе, на длинныхъ ножкахъ, расположены почти зонтикомъ, на концахъ вѣтвей. Чашечка и цвѣтоножка розовыя. Чашечка 5-тираздѣльная; вѣнчикъ кубышчатый, 5-тизубчатый, бѣлый или розоватый. Тычинокъ 10; завязь верхняя, при основаніи окруженная железистымъ дискомъ, вокругъ котораго прикрѣпляются тычинки, 5-тигнѣздная, съ простымъ столбикомъ. Плодъ—коробочка, раскрывающаяся 5 створками. Цвѣтетъ весной и въ началѣ лѣта. Растетъ на торфяныхъ болотахъ. (Рис. 222.)

МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНІЕ подбѣла известно только въ народѣ; настой листьевъ употребляется отъ ревматизма и отъ чахотки.

Подбѣлъ лѣсовой, см. Вороній глазъ (*Paris quadrifolia* L.).

Подбѣлъ меньшій, см. Мать и мачиха (*Tussilago Farfara* L.).

Подворонникъ, см. Соколій перелетъ (*Gentiana cruciata* L.).

Подгорошникъ, см. Андреевъ крестъ (*Veronica spicata* L.).

Подгрудникъ, см. Мята полевая (*Mentha arvensis* L.).

Подгрудникъ, см. Живучка ползучая (*Ajuga reptans* L.).

Поддубравникъ, см. Астра дикая (*Aster Amellus* L.).

Подживотникъ, см. Пасленъ сладкогорькій (*Solanum dulcamara* L.).

Подковникъ, см. Подковникъ волосистый (*Hypocrepis comosa* L.).

Подковникъ волосистый (*Hypocrepis comosa* L.). Многолѣтнее вѣтвистое, съ ползучимъ корневищемъ, растение изъ семейства «мотыльковыхъ» (*Papilionaceae* L.), распространенное въ средней и южной Европѣ, въ Россіи встрѣчается въ Курляндіи. Корневище выпускаетъ многочисленные стебли, длиною 2—7 вершк. Перистые листья состоятъ каждый изъ 9—15 продолговатыхъ или обратно-яйцевидныхъ листочковъ. Желтые цвѣты по 5—8 собраны зонтиками. Чашечка 5-тизубчатая; вѣнчикъ 5-тилепестный, мотыльковый (флагъ, крылья и лодочка); тычинокъ 10; плодъ—членистый бобъ, состоящій изъ одностѣмянныхъ члениковъ, согнутыхъ ввидѣ подковы. Цвѣтетъ лѣтомъ. Растетъ на солнечныхъ склонахъ горъ и холмовъ, преимущественно на известковой почвѣ.

Подкопытникъ, см. Групанка круглолист. (*Pirola rotundifolia* L.).

Подкустная трава, см. Адокса мускусная (*Adoxa Muschatellina* L.).

Подлежница, см. Подорожникъ большой (*Plantago major* L.).

Подлѣска, см. Сердечникъ полевой (*Cardamine pratensis* L.).

Подлѣсникъ, см. Копытень европейскій (*Asarum europaeum* L.).

Подлѣсникъ, см. Гравилатъ городской (*Geum urbanum* L.).

Подлѣсникъ, см. Подлѣсникъ европейскій (*Sanicula europaea* L.).

Подлѣсникъ европейскій (*Sanicula europaea* L.). Лечуха,

Подлѣсникъ (Двиг.), Трепешникъ, Цѣлебная трава, Здоровая трава. Многолѣтнее травянистое растеніе, выш. 6—12 вершк., изъ семейства «зонтичныхъ» (*Umbelliferae* Juss.), распространенное почти во всей Европѣ, въ западной, средней Россіи, въ Крыму и на Кавказѣ. Прикорневые листья длинно-черешковые, глубоко-пальчато-5-тираздѣльные, стеблевые (всего 1—2) маленькіе, 3-храздѣльные. Вѣдно-розовые цвѣты въ головчатыхъ шарообразныхъ зонтикахъ со средними обоеполовыми и краевыми тычиночными цвѣтами. Зонтики образуютъ зонтики о 3—5 неровныхъ лучахъ. Чашечка о 5 зубчикахъ; лепестковъ и тычинокъ по 5. Завязь нижняя двугнѣздная, съ однимъ личкомъ въ каждомъ гнѣздѣ; на верхушкѣ снабжена железистымъ, выделяющимъ сладкій сокъ, дискомъ. Столбиковъ 2. Плодъ—почти шаровидная, усаженная крючковатыми шипами, двусѣмянка, распадающаяся при созрѣваніи снизу вверхъ на 2 плодика. Цвѣтеть съ мая по іюль. Растетъ лѣтомъ. (Рис. 223.)

МЕДИЦИННОЕ УПОТРЕБЛЕНІЕ. Подлѣсникъ европейскій употреблялся прежде отъ кровотеченій изъ легкихъ, въ настоящее время оставленъ совсѣмъ.

Подлѣсъ, см. Грушанка круглолистная (*Pirola rotundifolia* L.).

Подлѣшникъ, см. Копытень европейскій (*Asarum europaeum* L.).

Подмаренникъ, см. Звѣздчатка злачная (*Stellaria graminea* L.).

Подмаренникъ болотный (*Galium palustre* L.). Зборъ (Ниж.),

Липка (Гродн.), Марена (Вят.), Мокрица (Нов.), Подмаренникъ

сизый (Вил.), Полилица (Костр.), Полевица (Могил.), Урѣзная.

Многолѣтняя травка изъ семейства «маревыхъ» (*Rubiaceae* Juss.), распространенная по всей Европѣ, произрастающая въ большей части Россіи и въ Сибири, съ маловѣтвистымъ толстымъ, слабымъ, большею частью лежащимъ стеблемъ. Листья обыкновенно по 4 въ мутовкѣ, линейно-продолговатые, тупые съ одной жилкой, по краямъ съ отогнутыми назадъ щетинками. Цвѣты бѣлые, образуютъ негустые полузонтики въ углахъ листьевъ. Чашечка незамѣтная безъ зубцовъ. Вѣнчикъ колесовидный, 4-храздѣльный; тычинокъ 4; завязь нижняя, двугнѣздная; столбикъ 2-храздѣльный, съ головчатыми рыльцами. Плоды орѣхообразные, сухіе, мелко-бугорчатые. Цвѣтеть лѣтомъ. Растетъ на болотистыхъ мѣстахъ, часто въ самой водѣ (Рис. 224.)

МЕДИЦИННОЕ УПОТРЕБЛЕНІЕ. Въ народѣ отваръ подмаренника употребляется отъ удущья.

Подмаренникъ желтый (*Galium verum* L.). Фармацевтическое названіе: *Galium luteum* (Herba et Flores s. Summitates). Батошки

(Клев.), Буркунъ (Ставр.), Буркунъ-зилье (Клевск.), Гусятникъ (Ворон.), Дереза (Черн.), Дерачка (Гродн.), Дробнопѣтъ (Волин.), Донникъ (Вор.), Жолдь (Курск.), Желтая кашка (Екат.), Жовтенъка кашка (Полт.), Желтая маслянка (Гродн.), Желтый цвѣтъ (Екат., Саратов.), Зибовникъ (Вор.), Инца (Екат.), Лотай (Волин.), Ленекъ (Гродн.), Маковникъ (Уф.), Марена желтая (Волог., Костр., Влад., Сиб.), Медвяница, Медвянка (Пск., Тв.), Медунца (Смол.), Медяникъ (Малор.), Медявникъ (Малоросс.), Медовая трава (Херсон.) Медовая марена, Межовикъ (Клевск.), Миръ (Могилев.) Мужичокъ (Тамб.), Муженекъ (Сар.), Морковникъ (Сарат.), Острица (Ставр.), Перепалечникъ (Вил.), Подсосенникъ (Вор.) Полынь мелкая (Уф.), Пуволица (Смол.), Пшенка (Малор.), Рамонъ, Ризикъ-дризлякъ (Тавр.), Рѣзучая трава (Тамб.), Райзелье (Курск.), Сосенка (Курск.), Смолина (Хар.), Сухоломъ (Могил.), Сыворотень (Укр.), Сывороточная трава, Сычужникъ (Курск.), Липкая и клейкая трава, Урочникъ (Минск.), Черемича (Одесс., Луг.), Червенець (Курск.), Червишникъ (Сарат.), Червишникъ (Курск.). Многолѣтнее травянистое растение изъ семейства «маревыхъ» (*Rubiaceae* Juss.), распространенное почти во всей Европѣ и почти во всей Россіи. Стебель очень вѣтвистый, прямостоящій или восходящій, выш. 6 до 14 верш., обыкновенно коротко-пушистый, круглый, съ 4 возвышенными линіями. Листья по 6—8 или 12 въ мутовкѣ, узко-линейные, остроконечные, съ завороченными краями, съ одной жилкой, сверху блестящіе, темнозеленые, гладкіе или шероховатые, снизу сѣровато-пушистые; золотисто-желтые цвѣты собраны длинною, густою, пушистою метелкою. Чашечка незамѣтная. Вѣтчикъ 4-хлестный, съ тупыми остроконечными долями. Тычинокъ 4; завязь нижняя, двугнѣздная; столбикъ двураздѣльный, съ головчатыми рыльцами. Плодъ сухой, орѣхообразный, гладкій. Цвѣтетъ лѣтомъ. Растетъ на лугахъ, степяхъ, по дорогамъ и между кустарниками. Цвѣты его распространяютъ сильный запахъ меда. Вкусъ травы его кисловяжущій. Корни подмаренника, подобно корнямъ марены красильной, окрашиваютъ довольно хорошо въ красный цвѣтъ различные ткани, хотя не составляютъ цѣннаго красильнаго матеріала для фабрикъ и применяются чаще въ домашнемъ обиходѣ.

МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ. Свѣжій сокъ подмаренника желтаго употреблялся прежде отъ эпилепси, истерики, также отъ сыпей на кожѣ и при леченіи ранъ. Теперь средство это употребляется только въ народной медицинѣ. Растеніе кислового на вкусъ и имѣетъ вяжущія свойства; оно дается отъ поноса, отъ болей въ животѣ. Отъ кроваваго поноса дается порошокъ по 4 чайныхъ ложки въ день. Въ Смоленской губерніи растираютъ траву съ цвѣтами и, смѣшавъ съ коровьимъ масломъ, прикладываютъ мазь къ чирьямъ и застарѣлымъ язвамъ, а дѣтямъ на золотушную сыпь.

Подмаренникъ крестолистный (*Gallum Cruciata* Scop.). Фармацевтическое названіе: *Cruciata* v. *Asperula aurea* (Herba).

Многолѣтнее травянистое, выпш. $3\frac{1}{2}$ —7 вершк., растеніе изъ семейства «маревыхъ» (Rubiaceae Juss.), распространенное въ средней и южной Европѣ, въ юго-западныхъ губерніяхъ и на Кавказѣ. Стебель и листья шершаво-волосистые; листья эллиптическіе или яйцевидные, по 4 въ мутовкѣ. Мелкіе желтые цвѣты собраны короткими, рыхлыми пазушными пучками; чашечка незамѣтная; вѣнчикъ колосовидный, 4-храздѣльный; тычинокъ 4; завязь нижняя двугнѣздная; столбикъ 2-храздѣльный, съ головчатыми рыльцами. Плодъ—сухой, орѣхообразный, гладкій. Цвѣтетъ весной. Растетъ въ рощахъ и между кустарниками. Въ медицинѣ не употребляется. (Рис. 225.)

Подмаренникъ мягкій (Galium Mollugo L.). Фармацевтическое названіе Galium album (Herba et Flores). Барканникъ (Пск.), Вязель-трава (Нижег.), Гродникъ (Даль), Дерябка (Моск.), Журавникъ (Пск.), Зерновица (Нижег.), Косма-трава (Малор.). Красноцвѣтная трава (Ряз.), Марьена-корень, Марена (Пенз.), Маруна (Могил.), Матрешка (Нижег.), Маранай, Маслянка (Гродн.), Мутовочная трава (Олон.), Повелика полевая, Повилица (Вят., Мог., Кіев.), Пострѣль сухой (Олон.), Потайникъ (Полт., Екат.), Сердечная трава, Смирна (Малор.), Черная трава (Хар.), Черный метлюкъ (Курск.), Чистецъ. Многолѣтнее травянистое растеніе, выпш. 7— $22\frac{1}{2}$ в., изъ семейства «маревыхъ» (Rubiaceae Juss.), распространенное почти во всей Европѣ и во всей Россіи. Стебель приподнимающійся отъ вѣтвистаго корневища, гладкій, 4-хгранный. Листья, болѣею частью по 8 въ мутовкѣ, ланцетовидные, остроконечные, съ одной жилкой, по краямъ съ отогнутыми назадъ щетинками, сверху и снизу зеленые. Вѣтлы цвѣты въ большихъ рыхлыхъ метелкахъ. Чашечка незамѣтная. Вѣнчикъ 4-храздѣльный, съ остроконечными долями. Тычинокъ 4; завязь нижняя 2-хгнѣздная. Столбикъ 2-храздѣльный, съ головчатыми рыльцами. Плодъ—орѣхообразный сухой, голый, слегка морщинистый. Цвѣтетъ лѣтомъ. Растетъ на поляхъ, лугахъ и въ лѣсахъ. Свѣже-выжатый сокъ травы, сваренный вмѣстѣ съ квасцами, даетъ коричневою и желтую краску. Корень окрашивается въ красный цвѣтъ. (Рис. 226.)

МЕДИЦИННОЕ УПОТРЕБЛЕНІЕ. Свѣже-выжатый сокъ подмаренника мягкаго употреблялся прежде отъ эпилепсін и подагры, теперь употребленіе этого растенія оставлено.

Подмаренникъ сизый, см. Подмаренникъ болотный (Galium palustre L.).

Подмаренникъ цѣпкій (Galium Aparine L.). Геморройная трава (Курск.), Батыка или Деряка, Дерябка (Экон., Маг., Кал., Полт., Малор.), Дреза (Малор., Орл., Вор.), Дергунъ (Могил.), Кошки Собаки (Моск.), Липкая трава, Липушникъ (Вят.), Лепчица, Липчица (Укр., Черниговъ), Лепецъ (Малор.), Мокрець (Малор.), Мокрица цвѣтная (Могил.), Острица, Повелика (Эк., Маг., Нижег., Мог., Вят.), Пряжка (Вор.), Пупочное сѣмя, Смольная трава, Смоляная трава (Астр.), Смолка, Спонка, Смочная трава, Ренейная трава, Шеролиница (Орл.), Царапица (Вор., Тв., Тамб.),

Цѣлпанка, Устел-землю. Однолѣтняя сорная трава изъ семейства «маревыхъ» (*Rubiaceae* Juss.), распространенная почти во всей Европѣ и во всей Россіи, выпш. $22\frac{1}{2}$ —25 вершк., съ тонкимъ, слабымъ стеблемъ, взбирающаяся часто на сосѣднія растенія, къ которымъ она прикрѣпляется при помощи отогнутыхъ назадъ щетинокъ, находящихся на стебляхъ, на краяхъ и на нижней поверхности листьевъ вдоль жилки. Листья, по 4 въ мутовкѣ, линейно-ланцетные, остроконечные, съ одной жилкой, сверху и снизу зеленые. Цвѣты бѣлые, образуютъ болѣе или менѣе раскидистое или сжатое соцвѣтіе. Чашечка незамѣтная. Вѣнчикъ 4-храздѣльный, съ остроконечными долями. Тычинокъ 4; завязь нижняя 2-хгнѣздная. Столбикъ двураздѣльный, съ головчатыми рыльцами. Плоды орѣхообразные, покрытые крючковатыми щетинками. Цвѣтетъ лѣтомъ. Растетъ на поляхъ и между кустарниками. Съмена составляютъ суррогатъ кофе. (Рис. 227.)

МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНІЕ. Свѣжій сокъ травы подмаренника цѣлкого употреблялся прежде отъ болѣзни печени, железъ, зоба, водяной, затѣмъ отъ скорбута и рака, какъ снаружи, такъ и внутрь; теперь растеніе это почти не употребляется. Въ Орловской губерніи его даютъ овцамъ отъ осы.

Подойникъ } см. Одуванчикъ лекарственный (*Taraxacum Dens*
Подойница } *Leonis* Desf.).
Подойнички }

Подолѣшникъ } см. Копытень европейскій (*Asarum*
Подолѣшникъ } *europaeum* L.).
Подолѣшникъ лѣсной }

Подорва, см. Чина лѣсная (*Lathyrus silvestris* L.).

Подорѣшникъ, см. Копытень европейскій (*Asarum europaeum* L.).

Подорожникъ, см. Подорожникъ большой (*Plantago major* L.).

Подорожникъ, см. Подорожникъ ланцетный (*Plantago lanceolata* L.).

Подорожникъ, см. Подорожникъ средній (*Plantago media* L.).

Подорожникъ, см. Гречиха-спорышъ (*Polygonum aviculare* L.).

Подорожникъ большой (*Plantago major* L.). Фармацевтическое названіе: *Plantago latifolia* s. *major* (*Radix et Folia*). Бабка, Бабки (Вил., Под., Бесс., Гродн.), Буквица (Кіев.), Лапухъ подорожный (Астр.), Подорожникъ (повсюду въ Вел. Росс., Малор.), Придорожникъ (Кал.), Попутникъ (въ болѣею части Россіи) и изм. Путникъ (Вят., Арх.), Путикъ (Твер., Вят.), Путики, Путичное листье, Припутникъ (Могил.), Трипутникъ (Мог., Орл., Смол., Кал.), Трепутникъ (Арх.), Трипутень (Черн.), Подлежница (Арх.), Семжилыникъ (Екат.), Собачій языкъ, Кобылій стець (Вор.), Толкачики (Тамб.), Чирьевая (Олон.). Многолѣтнее травянистое растеніе изъ семейства «подорожниковыхъ» (*Plantaginaceae* Juss.), весьма обыкновенное во всей Европѣ и во всей Россіи. Корневище толстое, короткое. Листья прикорневые, собранные розеткой, длинно-черешковые, широко-яйцевидные, цѣльно-крайнѣе или слегка зубчатые, обыкновенно съ 7 продольными

жилками. Округлая цвѣточная стрѣлка, выш. $3\frac{1}{2}$ —7 верш., несетъ на верхушкѣ длинный, тонкій колосъ мелкихъ буроватыхъ цвѣтовъ. Цвѣты правильные, обоеполовые. Чашечка 4-храздѣльная, съ овальными тупыми долями. Вѣнчикъ 4-храздѣльный, спайно-лепестный, съ яйцевидными туповатыми долями. Тычинокъ 4, прикрѣпленныхъ къ трубчкѣ вѣнчика, съ 2-хгнѣздными качающимися пыльниками. Завязь верхняя 2-хгнѣздная, съ нитевиднымъ столбикомъ. Плодъ—8—16-сѣмянная коробочка, раскрывающаяся крышечкой, съ мелкими сѣменами. Цвѣтеть съ мая до поздней осени. Растетъ около дорогъ, на лугахъ, на безплодныхъ и сорныхъ мѣстахъ. (Рис. 228.)

МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ. Въ народной медицинѣ подорожникъ большой считается очень полезнымъ. Свѣжіе вымытые листья прикладываютъ къ ранамъ, вередамъ и нарывамъ. Также изъ листьевъ выжимаютъ сокъ, смачиваютъ сокомъ корпию и накладываютъ на раны; этимъ-же сокомъ смазываютъ мѣста кожи, укушенные насѣкомыми. Свѣжій корень кладутъ въ уши отъ зубной боли. Въ Саратовской губерніи листья, намазанные сметаной, прикладываютъ на нарывы между пальцами при болязни, носящей у крестьянъ названіе «расперсицы». Корень растенія принимаютъ ввидѣ отвара внутрь отъ кроваваго кашля и лихорадки, а сѣмена—отъ кроваваго поноса.

Подорожникъ водяной, см. Частуха обыкновенная (*Alisma Plantago L.*).

Подорожникъ желтоцвѣтный, см. Одуванчикъ лекарственный (*Taraxacum Dens Leonis Desf.*).

Подорожникъ ланцетный (*Plantago lanceolata L.*). Фармацевтическое названіе: *Plantago minor s. angustifolia (Radix)*. Арженикъ (Вятск.), Ржаникъ (Даль), Вольская трава (Курск.), Вышилиникъ (Хар.), Козакъ (Смол., Ельн.), Козлики (Кіев.), Острецъ, Подорожникъ Дорожникъ, Попутникъ (въ большей части Россіи), Поранникъ (Малор.), Ранникъ (Укр.), Порѣзникъ, Поризникъ (Малор.), Солонецъ (Тавр.), Кобылій стебель (Вят.), Стягачъ (Курск.), Ужикъ (Ворон.), Узикъ (Моск., Пск.), Язычки-трава, Собачи язычки (Малор.). Многолѣтнее травянистое растеніе изъ семейства «подорожниковыхъ» (*Plantaginaceae Juss.*), распространенное почти во всей Европѣ и во всей Россіи. Корневище толстое, деревянистое. Листья прикорневые, ланцетные, острые, суженные въ черешокъ, съ 3—5 продольными жилками, собранные розеткой. Цвѣточная стрѣлка выш. 7—12 $\frac{1}{2}$ вершк., бороздчатая, съ короткимъ яйцевиднымъ или овальнымъ колосомъ. Цвѣтки мелкие буроватые. Чашечка 4-храздѣльная, остающаяся; вѣнчикъ 4-храздѣльный, пленчатый, остающійся, съ яйцевидными острыми долями. Тычинокъ 4, прикрѣпленныхъ къ трубчкѣ вѣнчика, съ 2-храздѣльными качающимися желтыми пыльниками. Завязь верхняя 2-гнѣздная, съ нитевиднымъ столбикомъ. Плодъ—двусѣмянная коробочка, раскрывающаяся крышечкой. Цвѣтеть въ маѣ и въ іюнѣ. Растетъ на лугахъ и между кустарниками. (Рис. 229.)

МЕДИЦИННОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ. Подорожникъ ланцетный употребляется въ народной медицинѣ. Отваромъ изъ листьевъ подорожника ланцетнаго обмываютъ глаза отъ золотушнаго воспаления. Порошокъ изъ сушеныхъ листьевъ прикладывается на раны отъ сибирской язвы.

Подорожникъ малый, см. Подорожникъ средній (*Plantago media* L.).

Подорожникъ мелкій, см. Икотникъ сѣро-зеленый (*Berteroa incana* DC.).

Подорожникъ песчаный (*Plantago arenaria* W. K.). Бабка-трава (Укр.), Блошное сѣмя, Колосеница, Крапива вонючая, Песчець, Песочникъ, Толстуха, Товстуха (Ворон.), Трипутникъ (Екат.), Хмелекъ (Полт.). Однолѣтнее травянистое пушисто-шершавое растеніе изъ семейства «подорожниковыхъ» (*Plantaginaceae* Juss.), распространенное въ Европѣ, въ средней и южной Россіи, наверху немного железистое; стебель вѣтвистый; листья линейные; колосы яйцевидные, густые, на длинныхъ ножкахъ въ углахъ листьевъ, верхніе—собранные зонтикомъ. Цвѣты бурые; чашечка 4-храздѣльная остающаяся; вѣнчикъ 4-храздѣльный, пленчатый, спайно-лепестный; трубочка его пушистая; доли острые. Тычинокъ 4, прикрѣпленныхъ къ трубочкѣ вѣнчика, съ 2-хлѣздыми качающимися пыльниками. Завязь верхняя 2-хлѣздная. Плодъ—коробочка съ 2-мя блестящими сѣмечками, раскрывающаяся крышечкой. Цвѣтетъ лѣтомъ и осенью. Растетъ на песчаныхъ мѣстахъ.

Подорожникъ средній (*Plantago media* L.). Арженикъ (Вят.), Ржаникъ, Баба, Бабка (Бѣлор.), Бабка-плесникъ (Гродн.), Петровъ-батоги (Умань), Баранки, Войцы (Сарат.), Гусарчикъ (Орл.), Дрошянки (Черн.), Дорожникъ (Мог.), Подорожникъ (въ разн. губ.), Подорожникъ малый, Козаки (Смол., Ельн.), Кукушка (Смол.), Опухольная (Олон.), Поточки (Ворон.), Попутникъ (Яр., Ниж. и др.), Путикъ, Путики (Вят.), Припутникъ, Трипутникъ (Бѣлор., Зап. Росс.), Узикъ (Даль), Толкачики (Ставр.), Швивавки полѣви (Вол.), Венжовый язычокъ (Волын.). Многолѣтнее травянистое растеніе изъ семейства «подорожниковыхъ» (*Plantaginaceae* Juss.), распространенное во всей Европѣ и во всей Россіи. Толстое деревянистое корневище выпускаетъ розетку эллиптическихъ прикорневыхъ листьевъ, суженныхъ въ короткий широкій черешокъ и снабженныхъ 3—7 продольными жилками. Цвѣточная стрѣлка прямостоящая, выш. 7—10 вершк., съ верхушечнымъ колосомъ. Цвѣты правильные, обоеполовые. Чашечка 4-храздѣльная, остающаяся, съ яйцевидными тупыми долями. Вѣнчикъ 4-храздѣльный, спайно-лепестный, съ островатыми долями, блѣдно-розовый; тычинокъ 4, прикрѣпленныхъ къ трубочкѣ вѣнчика, свѣтло-пурпуровыя или лиловыя. Завязь верхняя, 2-хлѣздная, съ нитевиднымъ столбикомъ. Плодъ—8—16-сѣмянная коробочка, раскрывающаяся крышечкой. Цвѣтетъ съ мая до поздней осени. Растетъ на лугахъ, между кустарниками, около дорогъ и на сорныхъ мѣстахъ. Якуты изъ

сѣмянъ приготавливаютъ кашу съ молокомъ. (Таб. XXXVII, фиг. 209.)

МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНІЕ. Въ народной медицинѣ подорожникъ средний пользуется большимъ довѣріемъ, какъ средство отъ ранъ, нарывовъ, вередовъ и ушибовъ. При леченіи нарывовъ листья растираютъ съ солью, свѣчнымъ саломъ и разжеваннымъ мякишемъ чернаго хлѣба; такую кашицу на тряпочкѣ прикладываютъ на нарывъ. Отъ рожи на больное мѣсто прикладываютъ листья, посыпанные мѣломъ. Якуты изъ сѣмянъ приготавливаютъ кашу. Варятъ сѣмена на молокѣ.

Подорожника, см. Тысячелистникъ обыкновенный (*Achillea Millefolium* L.).

Подорѣшная трава, см. Копытень европейскій (*Asarum europaeum* L.).

Подорѣшникъ, см. Копытень европейскій (*Asarum europaeum* L.).

Подорѣшникъ, см. Легочница лекарственная (*Pulmonaria officinalis* L.).

Подплесникъ, см. Норичникъ узловатый (*Scrofularia nodosa* L.).

Подплешникъ, см. Герань кроваво-красная (*Geranium sanguineum* L.).

Подпоречникъ, см. Вербейникъ обыкновенный (*Lysimachia vulgaris* L.).

Подраница, см. Дягиль лекарственный (*Angelica Archangelica* L.).

Подранка, см. Дягиль лекарственный (*Angelica Archangelica* L.).

Подренникъ, см. Тростникъ обыкновен. (*Arundo Phragmites* L.).

Подсадная, см. Чертополохъ разнолистный (*Cirsium heterophyllum* All.).

Подсекольникъ, см. Амарантъ метельчатый (*Amaranthus paniculatus* L.).

Подсвиноухъ, см. Шалфей луговой (*Salvia pratensis* L.).

Подснѣжная трава, см. Звѣздчатка большая (*Stellaria Holostea* L.).

Подснѣжники синіе, см. Пролѣска (*Anemone Hepatica* L.).

Подснѣжникъ, см. Горичвѣтъ весенній (*Adonis vernalis* L.).

Подснѣжникъ, см. Сонъ (*Anemone Pulsatilla* L.).

Подснѣжникъ, см. Зимовникъ осенній (*Colchicum autumnale* L.).

Подснѣжникъ, см. Подснѣжникъ обыкновенный (*Galanthus nivalis* L.).

Подснѣжникъ, см. Пролѣска двулистная (*Scilla bifolia* L.).

Подснѣжникъ, см. Молодилъ кровельный (*Sempervivum tectorum* L.).

Подснѣжникъ обыкновенный (*Galanthus nivalis* L.). Подснѣжникъ, Подснѣжникъ (Малор.), Просерень (Малор.), Пролѣсокъ. Многолѣтнее луковичное травянистое растеніе изъ семейства «амариллисовыхъ» (*Amaryllideae* R. Br.), распространенное въ средней и южной Европѣ, въ привислянскихъ губерніяхъ, въ юго-западной Россіи и на Кавказѣ, съ прикорневыми линейными листьями и безлиственными цвѣточными стрѣлками. Луковица яйцевидная. Цвѣточная стрѣлка, вып. $1\frac{1}{2}$ —

3½ вершк., съ одиночнымъ бѣлымъ поникшимъ цвѣткомъ. Лепестковидный околоцвѣтникъ до основанія 6-тираздѣльный, съ продолговатыми, простертыми наружными и обратно-яйцевидными, вверхъ стоящими внутренними долями, на верхушкѣ зеленоватыми и короче наружныхъ. Тычинокъ 6, супротивныхъ долямъ околоцвѣтника и прикрѣпленныхъ къ ихъ основаніямъ; пыльники кончаются остроконечіемъ; завязъ нижняя 3-гнѣздная; столбикъ нитевидный, съ острымъ нераздѣльнымъ рыльцемъ. Плодъ—коробочка, раскрывающаяся гнѣздо - разрывно. Цвѣтетъ рано весной. Растетъ въ лѣсахъ. (Табл. XXXVIII, фиг. 213.)

Подснѣжница, см. Клюква болотная (*Oxycoccus palustris* L.).

Подсолнечникъ, см. Солнечникъ обыкновенный (*Helianthemum vulgare* Gärtn.).

Подсолнечникъ, см. Подсолнечникъ однолѣтній, или обыкновенный (*Helianthus annuus* L.).

Подсолнечникъ, см. Пасленъ черный (*Solanum nigrum* L.).

Посолнечникъ дикій, см. Девясилъ подсолнечный (*Inula Helenium* L.).

Подсолнечникъ однолѣтній, или обыкновенный (*Helianthus annuus* L.). Подсолнечникъ (Вел. Росс.) и изм. Подсолнухъ (Курск., Вор.), Подсолнухъ, Сонячникъ, Соняшникъ, Соляшникъ (Малор.), а сѣмена: Носѣпы, Соняшныкъ, Солончикъ (Бѣлор.), Соняшникъ, Вороты-солнце. Однолѣтняя общеизвѣстная трава. выш. 1½—3 арш., родомъ изъ Перу, изъ семейства «сложноцвѣтныхъ» (*Compositae* Adans.), съ очередными, пальчатыми листьями и очень крупными корзинками желтыхъ цвѣтовъ, изъ которыхъ внутренніе—трубчатые, обоюдовые, красные—безполовые, язычковые, однорядные. Вѣнчикъ правильный, трубчатый, 5-тизубчатый; тычинокъ 5; пыльники спаяны въ трубочку, сквозь которую проходитъ столбикъ. Завязъ нижняя одногнѣздная, односѣмянная. Плодъ—сѣмянки съ 2-мя отпадающими щетинками. Цвѣтетъ лѣтомъ. Разводится въ Россіи въ болыномъ количествѣ и во многихъ сортахъ, въ южныхъ и особенно юго-восточныхъ губерніяхъ на сѣмена, которыя употребляютъ въ пищу или какъ лакомство, или-же для добыванія масла. Стебли, обработанные, какъ ленъ, доставляютъ прочныя и тонкія волокна, годныя для приготовленія прекрасныхъ тканей и для фабрикаціи бумаги. Подсолнечное масло, добываемое изъ сѣмянъ, не только годно для освѣщенія и приготовленія топчайшихъ туалетныхъ мылъ, но и для употребленія въ пищу; кромѣ того, сѣмена составляютъ превосходный кормъ для разныхъ породъ домашнихъ птицъ, а выжатые зерна служатъ превосходнымъ средствомъ для откармливанія рогатаго скота. Цвѣты доставляютъ обильный взяткъ ичеламъ. Все растеніе имѣетъ свойство осушивать влажныя почвы.

МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНІЕ. Въ послѣднее время сѣмена подсолнечника рекомендуются, какъ хорошій суррогатъ кофе. Подсолнечное масло употребляется для приготовленія эмульсіи, по-

добно касторовой и миндальной, которая служить въ народѣ х-рошимъ обволакивающимъ средствомъ отъ болей въ желудкѣ и отъ кашля.

Подсолнечникъ степной, см. Грудничникъ (*Abutilon Avicennae* Gärtn.).

Подсолнокъ дикій, см. Девясилъ подсолнечный (*Inula Helenium* L.).

Подсолнухъ } см. Подсолнечникъ однолѣтний, или обыкновен-
Подсолнухъ } ный (*Helianthus annuus* L.).

Подсолонникъ, см. Подмаренникъ желтый (*Galium verum* L.).

Подтынникъ, см. Чистотѣль большой (*Chelidonium majus* L.).

Подтынникъ, см. Норичникъ узловатый (*Scrophularia nodosa* L.).

Подхолмовка, см. Грушанка одноцвѣтная (*Pirola uniflora* L.).

Подхрѣвникъ, см. Перечникъ широколистный (*Lepidium latifolium* L.).

Подцерникъ, см. Фіалка собачья (*Viola canina* L.).

Подчосъ } см. Спаржа обыкновенная (*Asparagus*
Подчосъ громовый } *officinalis* L.).

Подшильникъ, см. Частуха обыкновенная (*Alisma Plantago* L.).

Подыйма, см. Гравилатъ водяной (*Geum rivale* L.).

Подъемная трава, см. Лапчатка серебристая (*Potentilla argentea* L.).

Подъягодникъ, см. Земляника лѣсная (*Fragaria vesca* L.).

Подъяичникъ, см. Селезеночникъ очереднолистный (*Chrysosplenium alternifolium* L.).

Подъясенникъ, см. Синюха обыкновенная (*Polemonium coeruleum* L.).

Подъяслинокъ пахучій, см. Жасминъ дикій, или ночной (*Philadelphus coronarius* L.).

Подъячникъ, см. Грушанка круглолистная (*Pirola rotundifolia* L.).

Пожарникъ, см. Клеверъ темноцвѣтный, или Хмелекъ (*Trifolium Spadiceum* L.).

Пожарница, см. Вѣйникъ наземный (*Calamagrostis epigeios* Roth.).

Пожарница, см. Вѣйникъ лѣсной (*Calamagrostis silvatica* Dc.).

Позвопки } см. Погребомъ обыкновенный (*Rhinanthus Crista*
Позвонокъ } *Galli* L.).

Позвонокъ, см. Марьянникъ полевой (*Melampyrum arvense* L.).

Позвонокъ, см. Хлопушка (*Silene inflata* Gm.).

Позвонокъ, см. Ярутка полевая (*Thlaspi arvense* T.).

Позвоночки, см. Герань луговая (*Geranium pratense* L.).

Поздника, см. Пасленъ черный (*Solanum nigrum* L.).

Поземечникъ-трава } см. Земляника лѣсная (*Fragaria*
Поземка } *vesca* L.).

Позибника } см. Земляника лѣсная (*Fragaria vesca* L.).
Позиомка }

Позникъ-бзныка, см. Пасленъ черный (*Solanum nigrum* L.).

- Позюмки, см. Земляника лѣсная (*Fragaria vesca* L.).
- Покати-поле } см. Качимъ метельчатый (*Gypsophylla palicu-*
Покатинъ } *lata* L.).
- Покатичникъ, см. Спаржа обыкновенная (*Asparagus officina-*
lis L.).
- Покатичникъ, см. Синеголовникъ равнинный (*Eryngium campe-*
stre L.).
- Покатичникъ, см. Зольникъ калийный (*Salsola Kali* L.).
- Покатникъ } см. Качимъ метельчатый (*Gypsophylla palicu-*
Покатунъ } *lata* L.).
- Покатунъ, см. Спаржа обыкновенная (*Asparagus officinalis* L.).
- Покатунъ, см. Синеголовникъ равнинный (*Eryngium campe-*
stre L.).
- Покатунъ, см. Зольникъ калийный (*Salsola Kali* L.).
- Поколушка, см. Плаунъ булавистый (*Lycopodium clavatum* L.).
- Покринъ полевой, см. Мандрагора (*Atropa Mandragora* L.).
- Покрынъ-трава, см. Мандрагора (*Atropa Mandragora* L.).
- Покшикъ, см. Белладонна (*Atropa Belladonna* L.).
- Полая трава, см. Кульбаба осенняя (*Leontodon autumn-*
alis L.).
- Полая трава, см. Одуванчикъ лекарственный (*Taraxacum Dens*
Leonis L.).
- Полба (*Triticum Spelta* L.). Однолѣтнее и двулѣтнее травянистое растение изъ семейства «злаковыхъ» (*Gramineae* Juss.), напоминающее нѣсколько пшеницу, принадлежащее къ числу хлѣбныхъ растений и воздѣлываемое преимущественно въ западной Европѣ и въ Россіи. Колосъ почти 4-хгранный, очень рыхлый, съ ломкимъ стержнемъ. Колоски сидятъ на выступахъ стержня, не прикрывая другъ друга, и содержатъ по 2-3 плодущихъ и по 1-2 безплодныхъ цвѣтка. Створки колосковъ, или колосковые чешуйки, яйцевидныя, наверху притупленныя и большей частью съ двумя короткими зубцами. Цвѣточная наружная пленка плодущихъ цвѣтовъ съ остью или безъ ости. По созрѣваніи колосъ распадается такимъ образомъ, что каждый колосокъ отрывается отъ своего колѣна и несетъ сбоку колѣно выше стоявшаго колоска. Зрѣлыя зерна заключены въ пленкахъ. Цвѣтетъ лѣтомъ. (Табл. XXXVII, фиг. 208.)

МЕДИЦИННОЕ УПОТРЕБЛЕНІЕ. Мука, добываемая изъ зеренъ, служитъ обволакивающимъ средствомъ. Она отваривается для клистировъ при поносахъ, служитъ для составленія пилульной массы и мазей и дается при отравленіи сулемою; она разлагаетъ сулему и превращаетъ ее въ каломель.

Полденышекъ, см. Купальница европейская (*Trollius euro-*
paeus L.).

Полевая трава, см. Марьянникъ полевой (*Melampyrum arven-*
se L.).

Полевица, см. Метлица полевая (*Agrostis Spica Ventii* L.).

Полевица, см. Подмаренникъ болотный (*Galium palustre* L.).

Полевица, см. Полевица бѣлая (*Agrostis alba* L.).

Полевица бѣлая (*Agrostis alba* L.). Полевица, Полина, Метлица, Мстелица, Метелочка, Метлика, Метлина, Метлюгъ, Метлюкъ, Метлякъ, Метлица, Мятлица, Рѣзокъ (Минск.), Фіориновая трава. Многолѣтняя трава изъ семейства «злаковыхъ» (*Gramineae* Juss.), распространенная во всей Европѣ и во всей Россіи. Стебель прямостоящій, выш. 7—14 вершк., на сухихъ мѣстахъ иногда выше. Листья плоскіе, линейные, съ длиннымъ, острымъ язычкомъ. Метелка вѣтвистая, во время цвѣтенія раскидистая, а потомъ сжатая. Колоски мелкіе, одноцвѣтные, сплюснутые съ боковъ, блѣдно-зеленые или пестро-фіолетовые. Цвѣточныя пленки короче колосовыхъ чешуекъ, или створокъ. Плодъ—зерновка. Цвѣтетъ лѣтомъ. Растетъ на лугахъ и въ лѣсахъ. Хорошая кормовая трава. (Рис. 230.)

Полевичникъ } см. Земляника лѣсная (*Fragaria vesca* L.).
Полевница }

Полевница, см. Клубника (*Fragaria collina* Ehrh.).

Полевницы, см. Земляника лѣсная (*Fragaria vesca* L.).

Полей конскій, см. Чистецъ нѣмецкій (*Stachys germanica* L.).

Полей-трава (*Mentha Pulegium* L.). Фармацевт. назв.: *Pulegium* s. *Pulegium regale* (*Herba et Summit.*), s. *hortensis*, s. *carvina*. Полій, Блоховникъ, Блосота (Екат.), Блошникъ, Блохоловъ. Многолѣтнее коротко-пушистое растение изъ семейства «губоцвѣтныхъ» (*Labiatae* Juss.), распространенное въ средней и южной Европѣ, въ южной Россіи, въ Крыму и на Кавказѣ. Стебель вѣтвистый, лежачій и приподнимающійся, съ укореняющимися при основаніи вѣтвями; листья черешковые, овальные, немного зубчатопильчатые; мелкіе розовато-лиловые цвѣта собраны мутовками (кольцами) при основаніи листьевъ, отдаленными другъ отъ друга междоузліями стебля. Чашечка трубчатая, двугубая, двузубчатая, съ кольцомъ волосковъ, замыкающимъ ея трубочку; вѣнчикъ ворончатый, 4-хлопастный, подъ зѣвомъ вдругъ суженный въ трубочку, двугубый. Тычинокъ 4, съ расходящимися гнѣздами пыльниковъ. Завязь 4-хлопастная, 4-гнѣздная; столбикъ съ 2-хлопастнымъ рыльцемъ. Плодъ при созрѣваніи распадается на 4 гладкихъ овальныхъ орѣшка. Цвѣтетъ лѣтомъ. Растетъ на влажныхъ мѣстахъ, при берегахъ, между кустарниками и на болотахъ.

Поленика, см. Мамура (*Rubus arcticus* L.).

Поленица, см. Клубника (*Fragaria collina* Ehrh.).

Полетига, см. Мамура (*Rubus arcticus* L.).

Полетуха, см. Золотая роза (*Solidago Virgaurea* L.).

Полетъ соколій, см. Соколій перелетъ (*Gentiana cruciata* L.).

Ползковый цвѣтъ, см. Наперстянка крупноцвѣтная (*Digitalis grandiflora* L.).

Ползучка, см. Будра плющевидная (*Glechoma hederacea* L.).

Ползучка, см. Плаунъ булавистый (*Lycopodium clavatum* L.).

Поливникъ, см. Медовникъ (*Galeopsis Tetrabit* L.).

Полина, см. Полевица бѣлая (*Agrostis alba* L.).

Полинчикъ, см. Жабникъ пашенный (*Filago arvensis* L.).

- Пслинь, см. Полынь горькая (*Artemisia absinthium* L.).
 Полипникъ, см. Рѣзакъ степной (*Falcaria Rivini* Host.).
 Полій, см. Полей-трава (*Mentha Pulegium* L.).
 Полій, см. Мята водяная (*Mentha aquatica* L.).
 Половинникъ } см. Земляника лѣсная (*Fragaria vesca* L.).
 Половницы }
 Половница, см. Клубника (*Fragaria collina* Ehrh.).
 Полоница, см. Земляника лѣсная (*Fragaria vesca* L.).
 Полоница }
 Полоницы } см. Клубника (*Fragaria collina* Ehrh.).
 Полоница }
 Полоховецъ, см. Олеандръ (*Nerium Oleander* L.).
 Полуденица, см. Мамура (*Rubus arcticus* L.).
 Полуница, см. Земляника лѣсная (*Fragaria vesca* L.).
 Полуушникъ, см. Синеголовникъ плосколистный (*Eryngium planum* L.).
 Полуныця, см. Земляника лѣсная (*Fragaria vesca* L.).
 Полусентъ-Марія, см. Мята полевая (*Mentha arvensis* L.).
 Полуцвѣтъ }
 Полуцвѣтки } см. Анютины глазки (*Viola tricolor* L.).
 Полуцвѣтъ }
 Полушечная трава, см. Солнечникъ обыкновенный (*Hellanthemum vulgare* Gärtn.).
 Полушечная трава, см. Луговой чай (*Lysimachia Nummularia* L.).
 Полынекъ }
 Полынецъ } см. Полынь стенная (*Lynosyris villosa* Hook et Benth.).
 Полынецъ бѣлый, см. Жабникъ пашенный (*Filago arvensis* L.).
 Полынъ, см. Полынь полевая (*Artemisia campestris* L.).
 Полынъ, см. Полынь горькая (*Artemisia absinthium* L.).
 Полынь, см. Пижма (*Tanacetum vulgare* L.).
 Полынь, см. Полынь полевая (*Artemisia campestris* L.).
 Полынь, см. Полынь горькая (*Artemisia absinthium* L.).
 Полынь бѣлая (*Artemisia maritima* L.). Вѣнички бѣлые, Вѣничкѣ бѣле (Новор.), Глистникъ-трава, Нехворощъ черная. Многолѣтнее, при основаніи полукустарниковое, растеніе изъ семейства «сложноцвѣтныхъ» (*Compositae* Adans.), распространенное въ Европѣ по морскому берегу до Скандинавіи, по берегамъ Чернаго, Азовскаго и Каспійскаго морей и на солончакахъ южной Россіи, въ Туркестанѣ, западной Азіи и Сибири, было-войлочное или сѣровато-пушистое; стебли приподнимающіеся, со спиральными листьями, изъ которыхъ нижніе яйцевидные, черешковые двояко-и трояко-перисто-разсѣченные, съ линейными, тупыми расходящимися долями; верхніе листья уменьшенные, верхушечные—перасѣченные; соцветіе вѣвистое, съ поникающими или вверхъ стоячими вѣтвями; корзинки 3—5-тицвѣтковые, мелкія, продолговатыя, собранныя кистями въ углахъ верхушечныхъ листьевъ. Всѣ цвѣты обоеполовые, плодущіе. Вѣнички трубчатый, 5-тизубчатый; тычинокъ 5; завязь нижняя одно-

гнѣздная, односѣмянная, съ столбикомъ, лопасти котораго притупленныя, обыкновенно кистистыя. Плодъ—сѣмянки безъ хохолковъ. Цвѣтетъ осенью.

МЕДИЦИННОЕ УПОТРЕБЛЕНІЕ. Корзинки цвѣтовъ употребляются въ медицинѣ, какъ противоглистное средство, подъ именемъ цытварнаго сѣмени, высшій сортъ котораго собирается съ полыни, растущей въ Туркестанскомъ краѣ (особенно вблизи Ташкента и Чимкента).

Полынь бѣлая, см. Полынь горькая (*Artemisia absinthium* L.).

Полынь глухая, см. Полынь полевая (*Artemisia campestris* L.).

Полынь горькая, настоящая, или Вермуть (*Artemisia absinthium* L.). Фармацевтическое назв.: *Absinthium majus* s. *rusticanum*, s. *vulgaris* (Summitates). Полынь, Полынь (Вел. Росс.), Полинъ (Малор.), Полынь (Бѣлор.), Полынь бѣлая, полевая (Ниж.), огородная (Полт.), Палынь, Глистникъ, Горечь (Вят.), Дикій перецъ. Многолѣтнее травянистое растеніе изъ семейства «сложноцвѣтныхъ» (*Compositae* Adans.), распространенное въ Европѣ и во всей почти Россіи, сѣловатое отъ шелковистыхъ прижатыхъ волосковъ. Стебель прямостоящій, внизу деревянистый, наверху метельчато-вѣтвистый, выш. 14—28 вершк. Листья спиральныя, двояко-или трояко-перисто-разсѣченныя, съ ланцетовидными долями. Желтые цвѣты въ шаровидныхъ повислыхъ корзинкахъ въ углахъ верхушечныхъ листьевъ, собранныхъ кистями. Краевые цвѣты женскіе. Вѣнчикъ трубчатый, 5-тизубчатый; тычинокъ 5; завязь нижняя одногнѣздная, односѣмянная, съ однимъ столбикомъ, лопасти котораго притупленныя, кистистыя. Плодъ—сѣмянки безъ хохолковъ. Цвѣтетъ во второй половинѣ лѣта; растетъ на необработанныхъ мѣстахъ, на поляхъ и холмахъ. Отличается сильнымъ, неприятнымъ запахомъ и очень горькимъ вкусомъ. Для употребленія собираютъ молодую траву съ цвѣтами въ іюлѣ и августѣ. (Рис. 231.)

МЕДИЦИННОЕ УПОТРЕБЛЕНІЕ. Полынь принадлежитъ къ горчайшимъ травамъ, потому употребляется внутрь при слабомъ пищевареніи. Въ народной медицинѣ отваръ полыни пьютъ отъ лихорадки, отъ боли въ животѣ, въ печени и селезенкѣ, отъ скопленія вѣтровъ въ кишечникѣ, также для возстановленія аппетита. Траву полыни употребляютъ вмѣсто чая отъ водяной болѣзни. Отваръ очень горькій и на вкусъ пріятнѣе холодный. Полынная вода полезна при плохомъ пищевареніи; ее пьютъ, кромѣ того, отъ лихорадокъ и отъ болѣзни печени. Полынное масло разводится въ водкѣ; на бутылку водки берутъ 1 драхму (4,0 грм.) масла. Эту водку берутъ въ количествѣ 2-хъ—3-хъ капель на сахаръ отъ бессонницы, судорогъ и рвоты. Полынный сиропъ дается отъ перемежающейся лихорадки. Полынная водка приготавливается двумя путями: или въ водку наливаютъ свѣже-выжатый сокъ полыни, или-же наливаютъ водкою сухія полынные верхушки и ставятъ въ теплое мѣсто, чтобы онѣ настоялись. Полынную водку маленькими рюмочками (ежедневно по одной) принимаютъ отъ каменной болѣзни.

Въ ветеринарной медицинѣ полынь употребляется

довольно часто при слабомъ пищевареніи животныхъ и при глистахъ. Въ случаяхъ острыхъ заболѣваній полынь не должна употребляться. Дается полынь животнымъ ввидѣ каши или илюль, также имъ вливаютъ въ ротъ отваръ травы; къ полыни прибавляютъ ячмень, овесъ, отрубъ, соль, можжевельныя ягоды или другія ароматическія вещества. Количество травы берется такое-же, какъ и другихъ горькихъ веществъ (для лошадей 1 унцъ (30 грм.) полыни на 12 унцъ (360,0 грм.) воды). Отваромъ полыни обмываютъ животнымъ загрязненные раны, также имъ обмываютъ все тѣло для того, чтобы предохранить животное отъ укусовъ насекомыхъ, которыя не садятся на горечь, а также чтобы убить тѣхъ насекомыхъ, которыя живутъ на кожѣ животныхъ.

Полынь дикая, см. Сушеница лѣсная (*Gnaphalium silvaticum* L.).

Полынь желтая, см. Цминъ (*Helichrisum arenarium* L.).

Полынь каменная степная, см. Полынь полевая (*Artemisia campestris* L.).

Полынь мелкая, см. Подмаренникъ желтый (*Gallium verum* L.).

Полынь настоящая } см. Полынь горькая (*Artemisia absinthium* L.).
Полынь огородная }

Полынь однолѣтняя, см. Дымянка лекарственная (*Fumaria officinalis* L.).

Полынь полевая, см. Полынь горькая (*Artemisia absinthium* L.).

Полынь полевая (*Artemisia campestris* L.). Фармацевтическое наз.: *Artemisia rubra* s. *campestris*. Былина (Вят.), Былица (Гродн.), Вѣники или Прутяная полынь (Ок.), Вересъ межевой (Пск.), Вѣнички (Малор.), Вѣники полевые (Вор., Тар.), Вѣничикъ (Вор.), Животная (Нижег.), Костиломъ (Могил.), Нехворощъ (Моск., Яр. и др.), Нехворощъ черная (Екат.), Нехворощъ непахучая (Курск.), Нефорощи (Екат.), Нефорощъ (Малор.), Полынь каменная степная, Полынь (Орл.), Полынь глухая (Вор.), Чернобыль лѣсной (Твер.), Чернобыль бѣлая (Влад.), Чернобыль полевая (Гродн.), Чернобыльникъ, Чилига степная, Божье дерево (Нижег.), Бурьянъ (Орл., Мог.), Деревей, Чернобай. Многолѣтнее растеніе изъ семейства «сложноцвѣтныхъ» (*Compositae* Adans.), распространенное въ средней и южной Россіи, въ большей части Европы. Стебель травянистый, развѣтвленный съ самаго основанія, выш. 7—14 вершк. Цвѣтущіе стебли приподнимающіеся, красноватые; безплодные—лежащія и образуютъ дерновинки. Листья спиральныя, двояко- или трояко-перисто-разсѣченные, голые или покрыты сѣроватымъ шелковистымъ пушкомъ. Корзинки цвѣтовъ мелкія, яйцевидныя, голыя, буровато-красныя. Краевые цвѣты женскіе, срединныя—обоеполовыя. Цвѣтетъ во второй половинѣ лѣта; растетъ на песчаныхъ мѣстахъ, въ степяхъ на поляхъ и по дорогамъ. (Р и с. 232.)

МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНІЕ. Въ народѣ настойка или чай изъ травы употребляется отъ боли въ желудкѣ, въ женскихъ болѣзняхъ и для куренія около больныхъ.

Полынь прутяная, см. Полынь полевая (*Artemisia campestris* L.).
Полынь степная (*Linisiris villosa* Hook et Benth.). Вышновецъ

(Екат.), Грудница, Грудничникъ, Декоктная трава (Херс.), Жабная (Сар.), Табурица (Екат.), Полынь степная, Полынецъ, По-лынекъ (Екат.), Чахница, Шалфей дилій (Самар.), Шалфей. Многолѣтнее бѣловато-шерстисто-войлочное, съ нѣсколькими стеблями изъ горизонтальнаго корневища, растеніе изъ семейства «сложноцвѣтныхъ» (Compositae Adans.), распространенное въ южной и средней Европѣ и въ южной Россіи. Стебли прямые вѣтвистые, тѣснолиственные; листья продолговато-ланцетные, обыкновенно острые; корзинки—въ щиткообразныхъ метелкахъ безъ язычковъ цвѣтовъ. Плодъ—сѣмянки. Цвѣтетъ въ концѣ лѣта и осенью. Растетъ въ степяхъ и на холмахъ.

МЕДИЦИННОЕ УПОТРЕБЛЕНІЕ. Въ народѣ пьютъ траву отъ грудной простудной боли и отъ кашля. Отъ зубной боли дѣлаютъ припарки (Саратовская и Екатеринос. губ.).

Полъска, см. Полъска многолѣтняя (*Mercurialis perennis* L.).

Полъска многолѣтняя (*Mercurialis perennis* L.). Фармацевтическое назв.: *Mercurialis montana* s. *Cynogramme* (Herba). Важанна-трава, Собачья капуста, Зеленикъ (Вят.), Куръ-зелье (Моск.), Куръ (Двинг.), Полъска, Пролѣска (Дв.), Пролѣсная трава, Пролѣска (Малор.), Повертень (Курск.), Стебельникъ (Ниж.), Стрежней (Вят.), Синеродъ, Синеворотъ (Курск., Гродн.), Чистуха (Вят.), Щиръ. Многолѣтнее травянистое растеніе изъ семейства «молочайниковыхъ» (*Euphorbiaceae* Juss.), распространенное почти во всей Европѣ, въ западной, средней и юго-западной Россіи, въ Крыму и на Кавказѣ. Стебель прямостоящій, простой, цилиндрический, выш. $3\frac{1}{2}$ — $12\frac{1}{2}$ вершк.; листья супротивные, черешковые, эллиптическіе или ланцетовидные, у верхушки стебля сближенные. Цвѣты двудомные, въ пазушныхъ колосьяхъ; тычиночные (мужскіе) одинаковой длины съ листьями, пестичные (женскіе)—о 1—3 цвѣткахъ, значительно короче листьевъ. Околоцвѣтникъ 3-храздѣльный. Въ тычиночныхъ цвѣтахъ 9—12 тычинокъ. Въ женскихъ цвѣтахъ доли околоцвѣтника явственно ланцетныя; пестикъ 2-хгнѣздный, несущій 2 нитевидныхъ рыльца и со стороны швовъ пестика по 1 тычинкѣ безъ пыльника. Плодъ—немного морщинистая шершаво-пушистая двугнѣздная коробочка съ шаровидными сѣменами, покрытыми точечными ямочками. Цвѣтетъ весной. Растетъ между кустарниками въ лѣсахъ. Употребляется на краску въ синій цвѣтъ. (Рис. 233.)

МЕДИЦИННОЕ УПОТРЕБЛЕНІЕ. Полъска многолѣтняя—ядовитое растеніе, врачами не употребляется. При отравленіи имъ у больного появляются поносъ, рвота, головная боль, затѣмъ глубокий сонъ и конвульсіи. Какъ противоядіе, слѣдуетъ дать рвотное, которое давать заливать сначала чистою теплою водою въ обильномъ количествѣ, потомъ теплою водою съ медомъ или какимъ-нибудь растительнымъ постнымъ масломъ. Когда рвота прекратится и больному станетъ лучше, ему опять слѣдуетъ начать давать чистую воду.

Полъска однолѣтняя (*Mercurialis annua* L.). Фармацевтическое назв.: *Mercurialis* (Herba). Щиръ-трава, Щеръ-трава, Курье

зеле, Дубровникъ, Собачья капуста. Однолѣтнее травянистое растение изъ семейства «молочайниковыхъ» (*Euphorbiaceae* Juss.), распространенное въ средней и южной Европѣ, въ Припильскомъ краѣ, въ Херсонской губернии и въ Крыму. Стебель вѣтвистый, выш. 7—14 вершк., 4-хгранный. Листья супротивные, черешковые, яйцевидно-ланцетные, крупно-зубчатые. Цвѣты двудомные. въ пазушныхъ колосьяхъ; мужскіе колосья длиннѣе листьевъ; пестичные, или женскіе цвѣты на короткихъ ножкахъ, сидячіе, собраны по 2—3 пучками въ углахъ листьевъ. Околоцвѣтникъ 3-храздѣльный; тычинокъ въ мужскихъ цвѣтахъ 9—12. Пестикъ женскихъ цвѣтовъ 2-хгнѣздный, съ 2-мя нитевидными рыльцами и со сторонъ швовъ пестикъ имѣетъ по 1-ой тычинкѣ безъ пыльника. Плодъ—немного бугорчатая и усаженная волосами коробочка, съ мелко-бугорчатыми сѣменами. Цвѣтетъ весной. Растетъ на поляхъ и на сорныхъ мѣстахъ.

МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНІЕ. Медицинское употребленіе польски однолѣтней въ прежнія времена было обширное, изъ него приготовлялся «Сиропъ долгій жизни» (*Syrupus sanitatis s. longae vitae*); теперь растение совсѣмъ оставлено.

Поляника } см. Мамура (*Rubus arcticus* L.).
Поляница }

Померанецъ (*Citrus Aurantium* L.). Померанцевое дерево. Вѣчно зеленое дерево съ очередными цѣльными сочно-зелеными листьями, съ душистыми бѣлыми, съ розоватымъ оттѣнкомъ цвѣтами и сочными ярко-оранжевыми съѣдобными плодами, употребляемыми въ пищу въ сыромъ и вареномъ видѣ, родомъ изъ тропической Азіи, разводится въ южной Европѣ. Померанецъ принадлежитъ также къ числу краснѣйшихъ вѣчно-зеленыхъ растений. Плоды его при комнатной культурѣ несъѣдобны, такъ какъ остаются кислыми до опаденія, но кожица ихъ доставляетъ душистую цедру, употребляемую для настоекъ и пирожныхъ, а зеленые, т. е. еще несовсѣмъ зрѣлые плоды употребляются на превосходное варенье.

МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНІЕ. Въ аптекахъ имѣются сухіе померанцевые цвѣты, сѣмена и корки. Изъ померанцевыхъ цвѣтовъ добывается весьма душистое померанцевое масло, изъ корки померанца добывается такое-же масло. На коркахъ померанца настаивается очень душистая водка, въ аптекахъ перегонкою добывается померанцевая вода. Врачами препараты померанца предписываются рѣдко, но въ домашнемъ употребленіи они приняты. Померанцевымъ листьямъ приписывается свойство помогать отъ падучей болѣзни, для чего ихъ толкутъ въ мелкій порошокъ, или же варятъ съ водою въ закрытомъ горшкѣ. Померанцевую воду пьютъ отъ нервного разстройства; померанцевая вода въ аптекахъ продается подъ именемъ воды нафы (*aqua naphae*). Она, кромѣ того употребляется отъ головной боли, отъ кашля, прибавляется во многія микстуры, прописываемыя для успокоенія нервовъ или желудка, также отъ кашля. Померанцевую корку принимаютъ отъ гнѣть, перемежающейся лихорадки и отъ поноса. Померанцевая

корка чаще всего готовится ввидѣ винной настойки, ее также снимаютъ съ внутренней бѣлой массы, сушатъ, толкутъ и принимаютъ въ порошокъ по $\frac{1}{2}$ чайной ложки ($\frac{1}{2}$ драхма—2,0 грм.), или-же изъ корки дѣлаютъ отваръ: срѣзаютъ съ двухъ померанцевъ самый верхній слой корки, кладутъ въ горшокъ, наливаютъ бутылкой воды, закрываютъ и кипятятъ, затѣмъ процеживаютъ и пьютъ по 2—3 чашки въ день отъ задержки мочи. Сокъ свѣжихъ померанцевъ дается лихорадящимъ больнымъ, какъ пріятное и полезное прохладительное питье. Стѣмена считаются противоглистнымъ средствомъ..

Померанцевое дерево, см. Померанецъ (*Citrus Aurantium* L.).

Пометки собачьи } см. Клоповникъ (*Lepidium ruderales* L.).

Пометъ собачій }

Помидоры (*Lycopersicum esculentum* Mil.). Фармацевтическое названіе: *Malum aureum* s. *Lycopersicon Tomatoes*. Яблоко любовное, Поммъ д'амуры, Райка съѣдобная, Томатъ, Ягода волчья, бросковинная, Баклажана, Батлажаны, Бадаржанъ, Баджанъ, Баклажаны (Кіев.). Однолѣтнее травянистое коротко-железисто-пушистое, рѣдко-волосистое растеніе изъ семейства «пасленовыхъ» (*Solanaceae* Juss.), родомъ изъ южной Америки. Стебель вѣтвистый. Листья однажды- или двояко-перервано-перистые, съ продолговато-яйцевидными, надрѣзанны-крупно-зубчатыми участками. Желтые цвѣты собраны вѣтвистыми завитками; цвѣтоножки длинныя, потомъ повислыя, съ сочлененіемъ; чашечка 5—7-ми раздѣльная, съ линейно-ланцетными долями; вѣнчикъ колесовидный, крупнѣе чашечки, 5—7-ми раздѣльный, съ ланцетными долями. Тычинокъ 5—7, съ короткими нитями и со склеенными въ конусъ пыльниками, раскрывающимися изнутри щелями и удлинненными наверху въ шпоровидное окончаніе. Завязь верхняя свободная, 2-хлѣбздная, съ однимъ столбкомъ, несущимъ 2-хлопастное рыльце. Плодъ красный, сплюснуто-шаровидный, многосѣмянный. У насъ разводится ради плодовъ, употребляемыхъ въ видѣ приправы въ пищу.

Поммъ д'амуры, см. Помидоры (*Lycopersicum esculentum* L.).

Помолочникъ, см. Пастушья сумка (*Capsella Bursa pastoris* Moench.).

Помощь горляна } см. Черноголовка обыкновенная (*Prunella*

Помощь гортана } *vulgaris* L.).

Помощь очная, см. Очанка лекарств. (*Euphrasia officinalis* L.).

Помощь порченная, см. Воробьиное просо полевое (*Anagallis arvensis* L.).

Помощь порченная, см. Воробейникъ лекарственный (*Lithospermum officinale* L.).

Помощь порченная, см. Вероника ручейная (*Veronica Beccabunga* L.).

Помощь почешная, см. Воробьиное просо полевое (*Anagallis arvensis* L.).

Помурная трава, см. Стѣнница лекарственная (*Parietaria officinalis* L.).

- Поникиница** } см. Гравилатъ водяной (*Geum rivale* L.).
Пониконица }
Понокница }
Поносная трава, см. Бахта трилистная (*Menyanthes trifoliata* L.).
Поносная трава, см. Лапчатка-узикъ (*Potentilla Tormentilla* Schrenk.).
Понырѣ, см. Пырей ползучій (*Triticum repens* L.).
Попель, см. Легочница лекарственная (*Pulmonaria officinalis* L.).
Поперечникъ, см. Петрушка горная (*Peucedanum Oreoselinum* Moench.).
Попки, см. Калужница болотная (*Caltha palustris* L.).
Попки, см. Поповникъ обыкновенный (*Chrysanthemum Leucanthemum* L.).
Попки, см. Поповникъ обыкновенный (*Chrysanthemum Leucanthemum* L.).
Попки, см. Одуванчикъ лекарственный (*Taraxacum Dens Leonis* Desf.).
Попки, см. Клеверъ луговой (*Trifolium pratense* L.).
Попова, см. Одуванчикъ лекарственный (*Taraxacum Dens Leonis* Desf.).
Попова плѣшь, см. Одуванчикъ лекарственный (*Taraxacum Dens Leonis* Desf.).
Попова скуфья, см. Одуванчикъ лекарственный (*Taraxacum Dens Leonis* Desf.).
Поповка, см. Вѣлзоръ болотный (*Parnassia palustris* L.).
Поповка } см. Поповникъ обыкновенный (*Chrysanthemum Leucanthemum* L.).
Поповка полевая }
Поповникъ, см. Донникъ бѣлый (*Mellilotus alba* Desf.).
Поповникъ, см. Пастернакъ огородный (*Pastinaca sativa* L.).
Поповникъ, см. Одуванчикъ лекарственный (*Taraxacum Dens Leonis* Desf.).
Поповникъ, см. Земляные орѣшки (*Spiraea Filipendula* L.).
Поповникъ } см. Поповникъ обыкновенный (*Chrysanthemum Leucanthemum* L.).
Поповникъ бѣлый }
Поповникъ непахучій (*Matricaria inodora* L.). Бѣлоцвѣтъ (Ниж.), Бѣлый цвѣтъ полевой (Костр.), Билекекъ (Ставр.), Какорва, Желтоголовка (Арх.), Матренка (Костр.), Марашка (Сит.) Попы (Смол.), Проходъ (Вят.), Пугвена (Вятск.), Пугвина (Даль), Пуповникъ, Плетушка (Нижег.), Ромашка дикая (Ар., Пет., Ол.), мелкая (Ниж.), русская (Ниж.), собачья (Вор.), полевая (Ниж.), Романъ (Умань), Романъ бѣлый (Умань), Роменъ (Малор.), Убырь (Арх.), Ивановъ цвѣтъ, Бездушный цвѣтъ. Однолѣтнее травянистое растение изъ семейства «сложноцвѣтныхъ» (*Compositae* Adans.), распространенное во всей Европѣ и весьма обыкновенное въ Россіи. Стебель голый, прямостоящій, наверху вѣтвистый, выш. 8—14 вершк. Листья двояко-или тройко-перисто-разсѣченные, съ узко-линейными, почти нитевидными долями. Корзинка съ желтыми трубчатыми обоюполовыми и язычковыми, бѣлыми, женскими цвѣтами; общее цвѣтоложе корзинки полу-

шаровидное, внутри съ мякотью (не полое). Вѣнчикъ трубчатыхъ цвѣтовъ 5-тираздѣльный. Тычинокъ 5; завязь нижняя одногнѣздная, съ однимъ столбикомъ и раздвоеннымъ рыльцемъ. Плодъ—сѣмянки. Цвѣтеть лѣтомъ. Растетъ на сорныхъ мѣстахъ и по дорогамъ.

МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ. Въ народной медицинѣ растеніе употребляется ввидѣ припарокъ отъ мокраго лишая (въ Воронежской губ.), внутри отъ ломоты, простуды, удушья и кашля.

Поповникъ обыкновенный (*Chrysanthemum Leucanthemum* L.). Фармацевтическое названіе: *Beilis majus* (Herba et Flor.). Астра полевая (Олон.), Блохогонъ, Бѣликъ (Вятск.), Бѣлякъ (Каз.), Бѣлица-трава, Бѣлинница-трава, Бѣльца, Быльца, Бѣлюга (Олон.), Бѣлюшки (Волог.), Бѣлоголовникъ (Вор., Олон.), Бѣлоголовошникъ (Костр.), Бѣлый цвѣтъ (Вят., Ниж., Курск., Тамб.), Бѣлые цвѣтки (Влад.), Бѣлоцвѣтъ (Вят.), Бѣлопникъ, Бѣловникъ, Бѣлужникъ (Тв.), Бѣлоквѣтъ (Гродн.), Бышпникъ (Курск.), Воловье око, Дѣвочникъ (Черн.), Жабрей (Курск.), Желтушка, Золотоцвѣтъ, Зубная трава (Олон.), Запонки (Ниж.), Ивановъ цвѣтъ, Иванъ-цвѣтъ, Иванъ-трава (Курск.), Ивановы головы (Черн.), Кукишка (Устюг., Пот.), Кутки трава (Вят.), Купалка бѣлая (Курск.), Ляховка бѣлая (Вит.), Марьяна лѣсовая (Черн.), Маруна полевая (Балта), Нивникъ, Нивяникъ (Двиг.), Орѣшникъ, Парамонъ (Стар. Рукоп.) и искаж. Пороманъ (Мог.), Поповникъ, Поповникъ бѣлый (Костр.), Поповка полевая (Вил.), Поны (Кал.), Попки (Могил.), Пунавка (Кал., Вор.). Пунавка бѣлая (Кур., Вор., Кал.), Пунавка полевая (Тул.), Пестрѣль (Вил.), Пильникъ (Моск.), Поральникъ добрый (Черн.), Помашка (Олон., Пет., Ниж., Каз., Вор.), Ромашка большая (Новг.), бѣлая (Пет., Пск.), дикая (Моск., Влад., Пет., Кал.), полевая (Моск., Ниж., Пет. и друг.), Романецъ (Малор.), Романецъ бѣлый (Бесс.), Романица бѣлая (Бесс.), Романъ (Арх., Мог., Полт., Рог., Волк.), Роменъ (Малор.), Романъ бѣлый, великій, лѣсной, полевой (Юго-Зап.), Роменъ-зиллѣ (Малор.), Романки бѣлые (Пет.), Романовъ цвѣтъ (Кіев.), Румянокъ лѣсной (Гродн.), Сабуръ (Курск.), Солнешникъ (Вор.), Солнечка (Волин.), Сорочька (Яросл.), Сорочнякъ (Ниж.), Стоцвѣтъ, Топникъ бѣлый (Волин.), Тягунъ, Трава-бабушка выпусти собачекъ, Цюпки (Черн.). Многолѣтнее травянистое растеніе изъ семейства «сложноцвѣтныхъ» (*Compositae* Adans.), распространенное во всей Европѣ и почти во всей Россіи. Стебель выпш. 7—14 вершк. Нижніе листья—длинно-черешковые, лопатчатые, по краямъ городчатые, стеблевые—сидячіе, продолговатые, узкіе, пильчатые. Крупныя корзинки на длинныхъ ножкахъ, съ срединными трубчатыми обоюполовыми желтыми цвѣтами и краевыми язычковыми (женскими) бѣлыми цвѣтами. Вѣнчикъ трубчатыхъ цвѣтовъ 5-тизубчатый; тычинокъ 5; завязь нижняя одногнѣздная, односѣмянная, съ однимъ столбикомъ, оканчивающимся 2-храздѣльнымъ рыльцемъ. Плодъ—сѣмянка. Цвѣтеть въ началѣ лѣта. Растетъ на лугахъ и между кустарниками. (Табл. XXXVIII, фиг. 212.)

МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНІЕ. поповника обыкновен. известно въ народѣ. Въ Вологод. губ. растение употребляется отъ мелкихъ глисть; также оно употребляется отъ грыжи, въ Олонецкой губ. отъ ослабленія мочевого пузыря и отъ лихорадки, въ Калужской губ. отъ золотушной болѣзни глазъ. Сухую траву кладутъ подъ подушку дѣтямъ, пугающимся во снѣ. Въ Нижегородской губ. отваръ травы нѣютъ отъ кашля и простуды, въ Полтавской отъ грудной боли, въ Курской отъ боли въ животѣ и отъ головной боли. Для отвара берутъ горсть травы, которую варятъ въ 10-ти унц. (300,0 грм.) жидкости, пока не останется 6-ти унцій (180,0 грм.), процеживаютъ, подслащиваютъ медомъ и принимаютъ черезъ 2 часа по столовой ложкѣ. Толченое растение смѣшиваютъ съ свинымъ саломъ или со свѣжимъ коровьимъ масломъ, отчего образуется мазь, которою пользуютъ при чесоткѣ и другихъ сыпяхъ. **Попокъ**, см. Короставникъ полевой (*Scabiosa arvensis* L.). **Попово гуменце**, см. Одуванчикъ лекарственный (*Taraxacum Dens Leonis* Desf.).

Поплзушникъ, см. Луговой чай (*Lysimachia Nummularia* L.). **Попряслочникъ**, см. Жимолость обыкновенная (*Lonicera Xylosteum* L.).

Попутникъ, см. Подорожникъ ланцетный (*Plantago lanceolata* L.).

Попутникъ, см. Подорожникъ большой (*Plantago major* L.).

Попутникъ, см. Подорожникъ средній (*Plantago media* L.).

Попутникъ, см. Первоцвѣтъ лекарственный (*Primula officinalis* Jacq.).

Попутникъ бѣлый, см. Бѣлокрыльникъ болотный (*Parnassia palustris* L.).

Попутникъ водяной, см. Частуха обыкновенная (*Alisma Plantago* L.).

Попутникъ водяной, см. Лилія водяная (*Nymphaea alba* L.).

Попутникъ черный, см. Цикорій обыкновенный (*Cichorium Intybus* L.).

Попъ, см. Одуванчикъ лекарственный (*Taraxacum Dens Leonis* Desf.).

Попы, см. Поповникъ обыкновенный (*Chrysanthemum Leucanthemum* L.).

Попы, см. Поповникъ непахучій (*Matricaria inodora* L.).

Попы, см. Короставникъ полевой (*Scabiosa arvensis* L.).

Попы желтые, см. Пупавка красильная (*Anthemis tinctoria* L.).

Поральникъ добрый, см. Поповникъ обыкновенный (*Chrysanthemum Leucanthemum* L.).

Поранникъ, см. Подорожникъ ланцетный (*Plantago lanceolata* L.).

Порей, см. Поррей (*Allium Porrum* L.).

Пореска-травя, см. Вшивица хохлатая (*Pedicularis comosa* L.).

Поречка } см. Крыжовникъ (*Ribes crossularia* L.).
Поречникъ }

Поризникъ, см. Подорожникъ ланцетный (*Plantago lanceolata* L.).

Поричка, см. Смородина красная (*Ribes rubrum* L.).

Пороманъ, см. Поповникъ обыкновенный (*Chrysanthemum Leucanthemum* L.).

Поросянка, см. Просо колосистое (*Panicum Crus Galli* L.).

Поросятникъ, см. Пазникъ гладкій (*Hypochaeris glabra* Dc.).

Порожа, см. Василекъ перистый (*Centaurea Scabiosa* L.).

Пороховое дерево, см. Крушина мелкая (*Rhamnus frangula* L.).

Порошки, см. Лапчатка-уzyкъ (*Potentilla Tormentilla* Schrenk.).

Поррей (*Allium Porrum* L.). Фармацевтическое название: Porrum. Лукъ порей, Порей, Поръ, Порръ, Пурей, Пражъ, Празъ, Прасъ, Пырей, Пырей гишпанскій или чесночный, съ греческаго: Мангырь. Двудѣтное или многолѣтнее луковичное травянистое растение изъ семейства «лилейныхъ» (*Liliaceae* Dc.), распространенное въ южной Европѣ. Луковица простая. Стебель выш. 7—14 вершк., до половины облиственный; листья плоскіе, широко-линейные, съ влагалищами. Покрывало большое, длинно-заостренное, окружающее до цвѣтенія верхушечное зонтичное крупное шаровидное соцвѣтіе, состоящее изъ многочисленныхъ бѣловатыхъ или розовыхъ цвѣтовъ. Околоцвѣтникъ 6-тилистный, остающійся; тычинокъ 6, съ расширенными при основаніи нитями, внутреннія тычинки съ 2 зубцами. Пыльнички прикрѣплены немного выше основанія и выступаютъ изъ околоцвѣтника. Столбикъ нитевидный, съ маленькимъ 3-хлопастнымъ рыльцемъ. Плодь—3-хгнѣздная коробочка, съ многочисленными гранистыми, съ черной кожурой, сѣменами. Цвѣтетъ лѣтомъ. Разводится въ нѣсколькихъ сортахъ на огородахъ, какъ кухонная овощъ.

Порръ, см. Поррей (*Allium Porrum* L.).

Портулакъ, см. Портулакъ огородный (*Portulaca oleracea* L.).

Портулакъ огородный (*Portulaca oleracea* L.). Блошки, Ногурячья трава, Портулакъ, Бутерлакъ, Сосонка. Однолѣтнее, совершенно голое простерто-вѣтвистое мясисто-сочное, травянистое растение изъ семейства «портулаковыхъ» (*Portulacaeae* Juss.), распространенное въ средней и южной Европѣ и встречающееся нерѣдко въ южныхъ губерніяхъ Россіи. Листья супротивные, продолговато-клиновидные, тупые; желтые цвѣты по 1—3, сидяче въ развилкахъ стебля или въ углахъ листьевъ. Чашечка 4-храздѣльная, съ травянистыми, съ тупымъ килемъ, долями; лепестковъ 5, обратно-яйцевидныхъ, при основаніи сросшихся и прикрѣпленныхъ вмѣстѣ съ 8—15 тычинками къ чашечкѣ. Завязь одногнѣздная, съ центральнымъ сѣмяносомъ. Столбикъ съ 5 линейными рыльцами. Цвѣтетъ лѣтомъ и осенью. Растетъ на песчаныхъ мѣстахъ и поляхъ. Употребляется, какъ огородная овощъ. Медицинское употребленіе оставлено.

Поручейникъ, см. Рѣзакъ степной (*Falcaria Rivini* Host.).

Поручейникъ, см. Поручейникъ широколистный (*Stum latifolium* L.).

Поручейникъ широколистный (*Stum latifolium* L.). Фармацевтическое название: *Stum palustre* s. *Pastinaca aquatica* (*Herba et Radix*). Вежа (Орл.), Вехъ (Малор.), Ганусъ полевой (Екат.), Дудки моржовы, Поручейникъ, Поточникъ, Сахарникъ, Укропникъ. Многолѣтнее травянистое, съ ползучими подземными побѣгами, растение изъ семейства «зонтичныхъ» (*Umbelliferae* Juss.), распространенное почти во всей Европѣ, въ сѣверной и средней Россіи и рѣдко встрѣчающееся на югѣ. Стебель прямой вѣтвистый, гранистый и бороздчатый; листья двояко-перисто-разсѣченные, съ нитевидными участками. Бѣлые цвѣты въ зонтикахъ, снабженныхъ покрываломъ. Чашечка 5-тизубчатая; вѣнчикъ 5-тилепестный; тычинокъ 5; завязь нижняя двугнѣздная, на верхушкѣ съ железистымъ дискомъ и 2 столбиками. Плодъ состоитъ изъ 2 сѣмянокъ; ребра на спинкѣ сѣмянокъ толстыя, замѣтныя. Цвѣтетъ лѣтомъ. Растетъ на болотахъ и при берегахъ. Причисляется къ числу ядовитыхъ растений.

Порушенецъ } см. Вероника лекарственная (*Veronica officinalis* L.).

Порушенецъ жаноцій }
Порушень, см. Репяшокъ обыкновенный (*Agrimonia Eupatorium* L.).

Порушникъ, см. Гравилатъ прямой (*Geum strictum* L.).

Порушникъ, см. Земляные орѣшки (*Spiraea Filipendula* L.).

Порущевка, см. Плаунъ булавистый (*Lycopodium clavatum* L.).

Порховица } см. Дождевикъ шиповатый (*Lycoperdon gemmatum* Batsch.).
Порховка }
Порховникъ }

Порхунъ, см. Дивала многолѣтняя (*Scleranthus perennis* L.).

Порчельница } см. Вероника ручейная (*Veronica Beccabunga* L.).

Порченая немощь }
Поршинникъ, см. Горлецъ, раковыя шейки (*Polygonum Bistorta* L.).

Порѣзина, см. Чертополохъ разнолистный (*Cirsium heterophyllum* All.).

Порѣзная трава, см. Тысячелистникъ обыкновенный (*Achillea Millefolium* L.).

Порѣзная трава, см. Сушеница обыкновенная (*Gnaphalium uliginosum* L.).

Порѣзная трава, см. Бедренецъ большой (*Pimpinella magna* L.).

Порѣзникъ, см. Тысячелистникъ обыкновенный (*Achillea Millefolium* L.).

Порѣзникъ, см. Соколіи перелетъ (*Gentiana cruciata* L.).

Порѣзникъ, см. Подорожникъ ланцетный (*Plantago lanceolata* L.).

Порѣзъ, см. Тысячелистникъ обыкновенный (*Achillea Millefolium* L.).

Порѣзъ, см. Тѣлорѣзъ сабуровидный (*Stratiotes aloides* L.).

Посконникъ } см. Посконникъ конопляный (*Eupato-*
Посконникъ водяной } *rium cannabinum* L.).

Посконникъ конопляный (*Eupatorium cannabinum* L.). Фармацевтическое название: *Eupatorium v. Cannabina aquatica*, s. *S-ta Cunigunda* (Rad. et Hb.). Благородникъ конопельный, Конская грива, Конопля водяная, Конопельникъ, Крапива глухая, Мигра (Орл.), Посконникъ, Посконникъ водяной, Посконъ дикая, Пѣтишникъ, Репникъ, Репикъ (Могил.), Репяшникъ, Сѣдашъ (южн. Росс.), Сѣдачъ, Сідачъ (Малор.), Сідачъ, Собачки водяныя, Трава королевина, Трава королевская, Кунигундова трава, Туманъ, Шапошникъ (Орл.). Многолѣтнее травянистое пушистое растение изъ семейства «сложноцвѣтныхъ» (*Compositae* Adans.), распространенное почти во всей Европѣ и въ большей части Европейской Россіи. Стебель прямостоящій, отъ 1½—3 арш. Листья коротко-черешковые, слегка пушистые, раздѣленные пальчато на 3—5 ланцетовидныхъ пальчатыхъ долей. Соцвѣтіе густое; мелкія корзинки розоватыхъ цвѣтовъ собраны на верхушкѣ стебля метелкой; въ каждой корзинкѣ 4—6 цвѣтовъ. Цвѣтоложе голое. Всѣ цвѣты обоюполовые, съ трубчатымъ къ основанію суженнымъ, вѣнчикомъ. Тычинокъ 5; завязь нижняя одногнѣздная, съ однимъ столбикомъ и 2-раздѣльнымъ рыльцемъ. Лопасті столбика длинныя, тупыя. Плодъ—сѣмянки съ хохолкомъ. Цвѣтеть во второй половинѣ лѣта. Растетъ на сырыхъ лугахъ, около ручьевъ, на болотистыхъ мѣстахъ. Всѣ части растенія при раздавливаніи обнаруживаютъ сильный но очень пріятный запахъ; на вкусъ онѣ горько-пріятны. Стебель посконника можетъ быть обрабатываемъ подобно коноплѣ. (Табл. XXXVIII, фиг. 210.)

МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНІЕ. Посконникъ конопляный имѣетъ обширное примѣненіе въ народной медицинѣ. Онъ употребляется, какъ потогонное и мочегонное средство, кромѣ того, отъ поноса, желтухи, цынги и лихорадки. Отваръ приготавливаютъ съ водой или пивомъ, также съ сывороткой; горсть травы наливаютъ 12 унциями (360,0 грм.) жидкости, кипятятъ, процеживаютъ и принимаютъ черезъ 2 часа по 2 стол. ложки. Въ Швеціи отваръ травы съ сывороткою считается хорошимъ средствомъ отъ водянки. Ботаникъ Линней хвалитъ его, какъ хорошее слабительное средство. Снаружи толченая трава ввнѣ припарки кладется на цынготныя раны и застарѣлыя опухоли.

Посконъ, см. Конопля посѣвная, или обыкновенная (*Cannabis sativa* L.).

Посконъ дикая, см. Посконникъ конопляный (*Eupatorium cannabinum* L.).

Поскрытникъ, см. Ленъ дикій (*Linaria vulgaris* Mill.).

Послѣвъ, см. Пасленъ сладко-горькій (*Solanum dulcamara* L.).

Посохъ Христовъ, см. Колокольчикъ жестко-волосистый (*Campanula cervicaria* L.).

Посохъ Христовъ, см. Колокольчикъ сборный (*Campanula glomerata* L.).

- Посохъ царскій, см. Колокольчикъ крапиволистный (*Campanula Trachelium* L.).
- Посошокъ узловатый } см. Запникъ клубненосный (*Phlomis*
Посошокъ Христовъ } *tuberosa* L.).
- Постельница обыкновенная, см. Пахучка обыкновенная (*Calamintha Clinopodium* Benth.).
- Постернакъ, см. Пастернакъ огородный (*Pastinaca sativa* L.).
- Пострѣлъ, см. Борецъ синій (*Aconitum Napellus* L.).
- Пострѣлъ лѣсной, см. Борецъ желтый (*Aconitum Lycostomum* L.).
- Пострѣльная трава, см. Борецъ синій (*Aconitum Napellus* L.).
- Постырнакъ, см. Пастернакъ огородный (*Pastinaca sativa* L.).
- Постушель, см. Купырь лѣсной (*Anthriscus silvestris* Hoffm.).
- Постыльникъ, см. Дурнишникъ обыкновенный (*Xanthium Strumarium* L.).
- Посѣчная трава, см. Легочница лекарственная (*Pulmonaria officinalis* L.).
- Потаенница, см. Петровъ крестъ (*Lathraea Squamaria* L.).
- Потайникъ, см. Подмаренникъ мягкій (*Galium Mollugo* L.).
- Поташникъ, см. Зольникъ калийный (*Salsola Kali* L.).
- Потоскуйка, см. Смолевка пониклая (*Silene nutans* L.).
- Поточки, см. Подорожникъ средній (*Plantago media* L.).
- Поточникъ, см. Поручейникъ широколист. (*Sium latifolium* L.).
- Поточникъ, см. Вероника ручейная (*Veronica Beccabunga* L.).
- Похвостень } см. Кокушникъ (*Gymnadenia conopsea* Rich.).
- Похребетная }
- Початки, см. Тростникъ обыкновенный (*Arundo Phragmites* L.).
- Початки, см. Хвощъ полевой (*Equisetum arvense* L.).
- Початки, см. Рогоза узколистная (*Typha angustifolia* L.).
- Початки, см. Рогоза широколистная (*Typha latifolia* L.).
- Початки, см. Кукуруза обыкновенная (*Zea Mays* L.).
- Початокъ, см. Рогоза широколистная (*Typha latifolia* L.).
- Початокъ, см. Спякъ красный (*Echium rubrum* L.).
- Початочки, см. Земляные орѣшки (*Spiraea Filipendula* L.).
- Почечуйная трава, см. Чернокорень обыкновенный (*Cynoglossum officinale* L.).
- Почечуйная трава, см. Перець водяной (*Polygonum Hydroper L.*).
- Почечуйная трава, см. Горчакъ (*Polygonum Persicaria* L.).
- Почечуйникъ, см. Перець водяной (*Polygonum Hydroper L.*).
- Почечуйникъ, см. Горчакъ (*Polygonum Persicaria* L.).
- Почечуйникъ, см. Горлець (*Polygonum Bistorta* L.).
- Почечуйникъ, см. Вшивица болотная (*Pedicularis palustris* L.).
- Починочки, см. Живучка мохнатая (*Ajuga genevensis* L.).
- Починочки, см. Земляные орѣшки (*Spiraea Filipendula* L.).
- Пошешуй, см. Чернокорень обыкновенный (*Cynoglossum officinale* L.).
- Поясничная трава, см. Лалчатка-узикъ (*Potentilla Tormentilla* L.).

- Правильная, см. Горлець, раковыя шейки (*Polygonum Bistorta* L.).
- Правокисть, см. Окопникъ лекарственный (*Symphytum officinale* L.).
- Празъ } см. Поррей (*Allium Porrum* L.).
- Празъ }
- Празелень, см. Бородавникъ обыкновенный (*Lampsana communis* L.).
- Праскуда, см. Просвирникъ обыкновенный (*Malva rotundifolia* L.).
- Прасъ, см. Поррей (*Allium Porrum* L.).
- Праховое дерево, см. Крушина ломкая (*Rhamnus frangula* L.).
- Преграда, см. Борець синий (*Aconitum Napellus* L.).
- Преградъ, см. Лютикъ ѣдкій (*Ranunculus sceleratus* L.).
- Пржеляшки, см. Пролѣска (*Anemone Hepatica* L.).
- Пржетачникъ, см. Вероника лекарственная (*Veronica officinalis* L.).
- Привитица }
Привитница } см. Повелика клеверная (*Cuscuta Epithymum* Sm.).
Привитуха }
Привітица }
- Приворотень, см. Пижма (*Tanacetum vulgare* L.).
- Приворотень, см. Гнѣздовка обыкновенная (*Neottia nidis* Rich.).
- Приворотки, см. Дубровка (*Veronica Chamaedrys* L.).
- Приворотная трава, см. Молочай высокій (*Euphorbia procera* M. B.).
- Приворотная трава, см. Звѣздчатка большая (*Stelaria Holostea* L.).
- Приворотъ, см. Манжетка обыкновенная (*Alchemilla vulgaris* L.).
- Привяжуха, см. Липучка репейчатая (*Echinospermum Lap-pula* Lehm.).
- Пригожница, см. Незабудка болотная (*Myosotis palustris* With.).
- Пригридъ, см. Кунальница европейская (*Trollius europaeus* L.).
- Пригридъ, см. Борець синий (*Aconitum Napellus* L.).
- Придорожная трава, см. Цикорій обыкновенный (*Cichorium Intybus* L.).
- Придорожникъ, см. Цикорій обыкновенный (*Cichorium Intybus* L.).
- Придорожникъ, см. Герань луговая (*Geranium pratense* L.).
- Придорожникъ, см. Подорожникъ большой (*Plantago major* L.).
- Придорожникъ, см. Гречиха - спорышъ (*Polygonum aviculare* L.).
- Придорожь, см. Одуванчикъ лекарственный (*Taraxacum Dens Leonis* Desf.).
- Приземникъ, см. Млечникъ морской (*Glaux maritima* L.).
- Призорная трава, см. Кошачьи лапки (*Antennaria dioica* Gärtn.).
- Призорная трава, см. Герань луговая (*Geranium pratense* L.).
- Призорная трава, см. Линнея сѣверная (*Linnaea borealis* L.).
- Прикорная, см. Аютины глазки (*Viola tricolor* L.).
- Прикрыть, см. Кунальница европейская (*Trollius europaeus* L.).

- Прикрытъ, см. Борецъ желтый (*Aconitum Lycostonum* L.).
 Прикрытъ, см. Борецъ синий (*Aconitum Napellus* L.).
 Прикрытъ большой, см. Борецъ желтый (*Aconitum Lycostonum* L.).
 Прикрытъ бѣлый, см. Вѣтренница лѣсная (*Anemone silvestris* L.).
 Прилипъ, см. Смолка (*Lychnis Viscaria* L.).
 Приметова трава } см. Крестовникъ обыкновенный (*Senecio vulgaris* L.).
 Приметь-трава }
 Приметь, см. Мелколепестникъ ѣдкій (*Erigeron acris* L.).
 Примочная трава, см. Запникъ клубенос. (*Phlomis tuberosa* L.).
 Приозерникъ бѣлый, см. Чихотная трава (*Parnica vulgaris* DC.).
 Припарная трава, см. Легочница лекарственная (*Pulmonaria officinalis* L.).
 Приплюсчатка, см. Гребенникъ обыкновенный (*Cynosorus cristatus* L.).
 Припутникъ, см. Подорожникъ большой (*Plantago major* L.).
 Припутникъ, см. Подорожникъ средній (*Plantago media* L.).
 Прирѣчная трава, см. Рдестъ (*Potamogeton* L.).
 Присноцвѣтущая трава, см. Омела обыкновенная (*Viscum album* L.).
 Присовочная, см. Черноголовка обыкновен. (*Prunella vulgaris* L.).
 Присовочная, см. Копытень европейскій (*Asarum europaeum* L.).
 Пристѣнная трава, см. Стѣнница лекарственная (*Parietaria officinalis* L.).
 Пристѣнная трава, см. Дѣвний (*Pyrethrum Parthenium* Smith.).
 Приточная трава, см. Колокольчикъ сборный (*Campanula glomerata* L.).
 Приточная трава, см. Колосникъ обыкновенный (*Carlina vulgaris* L.).
 Приточникъ, см. Колокольчикъ сборный (*Campanula glomerata* L.).
 Причулъ-трава, см. Крапива глухая (*Lamium album* L.).
 Приходная трава, см. Андреевъ-крестъ (*Veronica spicata* L.).
 Прожелоть, см. Бѣлоголовка (*Trifolium montanum* L.).
 Прозорникъ см. Чистотѣль большой (*Chelidonium majus* L.).
 Проліска, см. Вѣтренница тѣнистая (*Anemone nemorosa* L.).
 Проліска, см. Полѣска многолѣтняя (*Mercurialis perennis* L.).
 Проліска, см. Пролѣска (*Anemone Hepatica* L.).
 Пролѣска (*Anemone Hepatica* L.). Фармацевтическое названіе: *Hepatica nobilis* s. *Hepatica trifoliata*, s. *Trifolium aureum*. Вѣтренница чистая, Вѣтрушка, Завитки, Легкотникъ, Перелѣска, Переліска, Проліска, Пролѣшка (Гродн.), Подсѣжники синіе (Твер.), Печеношникъ, Печенковая трава. Печеночница, Троянокъ, Утробникъ, Преляшки (Гродн.). Многолѣтнее травянистое растеніе, выш. всего 3½ вершк., съ сердцевидными трехлопастными листьями, распространенное почти во всей Европѣ, въ сѣверной и средней Россіи, изъ семейства «лютиковыхъ» (*Ranuncul-*

сеae Juss.). Цвѣты голубые, рѣже красные или бѣлые, одиночные въ углахъ нижнихъ листьевъ. Чашечка окрашенная, изъ 8—10 чашелистиковъ; вѣника нѣтъ. Плодъ состоитъ изъ сѣмянокъ съ короткимъ столбикомъ. Цвѣтетъ весной. Растетъ въ лѣсахъ. Разводится съ махровыми цвѣтами нерѣдко въ садахъ.

МЕДИЦИННОЕ УПОТРЕБЛЕНІЕ. Пролѣска извѣстна въ народной медицинѣ. Растеніе употребляется отъ лихорадки, кашля, золотухи и головной боли. Горсть травы завариваютъ, какъ чай, и пьютъ чайными чашками. Снаружи отваромъ полощатъ ротъ и обмываютъ старыя загрязненные раны, на которыя толченую траву кладутъ ввидѣ припарокъ.

Пролѣска, см. Полѣска многолѣтняя (*Mercurialis perennis* L.).

Пролѣска, см. Первоцвѣтъ лекарственный (*Primula officinalis* L.).

Пролѣска, см. Пролѣска двулистная (*Scilla bifolia* L.).

Пролѣска двулистная (*Scilla bifolia* L.). Поденѣжникъ, Пролѣска, Растъ, Рястъ (Малор.), Растъ гвоздичный (Умань), Сиротки. Многолѣтнее травянистое сучковатое растеніе изъ семейства «лилейныхъ» (*Liliaceae* DC.), распространенное въ средней и южной Европѣ, въ юго-западной и южной Россіи, выши. до 4½ вершк. Луковица величиною съ лѣсной орѣхъ, выпускаетъ два широко-линейныхъ желобчатыхъ листа, обхватывающихъ своими влагалищами почти до середины цилиндрическую цвѣточную стрѣлку. Голубые цвѣты расположены рыхлою кистью. Околоцвѣтникъ о 6 простертыхъ листочкахъ. Тычинокъ 6; пыльники прикрѣплены къ нитямъ тычинокъ въ срединѣ поперекъ. Завязь верхняя, 3-хгнѣздная, съ нитевиднымъ столбикомъ, несущимъ маленькое рыльце. Плодъ — тупо-трегранная, съ немногими почти шаровидными сѣменами, коробочка. Цвѣтетъ рано весной. Растетъ между кустарниками, въ лѣсахъ.

Пролѣсная трава, см. Полѣска многолѣтняя (*Mercurialis perennis* L.).

Пролѣсникъ ягодный, см. Копытень европейскій (*Asarum europaeum* L.).

Пролѣшка, см. Пролѣска (*Anemone Hepatica* L.).

Прорѣзная трава, см. Петрушка горная (*Peucedanum Oreoselinum* L.).

Просвирики, см. Алтей лекарственный (*Althaea officinalis* L.).

Просвирка, см. Просвирникъ сѣверный (*Malva borealis* Wallm.).

Просвирики, см. Гравилатъ водяной (*Geum rivale* L.).

Просвирики, см. Хатъма тюрингенская (*Lavatera thuringiaca* L.).

Просвирики, см. Просвирникъ сѣверный (*Malva borealis* W.).

Просвирики } см. Просвирникъ обыкновенный (*Malva rotundifolia* L.).

Просвирникъ, см. Просвирникъ сѣверный (*Malva borealis* L.).

Просвирникъ, см. Просвирникъ лѣсной (*Malva silvestris* L.).

Просвирникъ, см. Алтей лекарственный (*Althaea officinalis* L.).

Просвирникъ дикій, см. Просвирникъ лѣсной (*Malva silvestris* L.).

Просвирникъ курчавый (*Malva crispa* L.). Гордовина, Горо-

довина, Гордоводъ (Полт.), Грудашникъ, Груднишникъ, Дзиндзиверъ, Жинзиверъ большой, Раздай-зелье (Харьк.), Рожа кудрявая, Скулочникъ, Шлясъ. Однолѣтнее травянистое растение изъ семейства «просвириковыхъ» (Malvaceae R. Br.), распространенное почти по всей Европѣ, въ юго-западной и южной Россіи. Стебель почти прямой; листья 5-тиугольные, 5-тилопастные, по краямъ складчато-волнистые и мелко-городчато-зубчатые; бѣловатыя цвѣты, на короткихъ цвѣтоножкахъ, сгущены въ углахъ листьевъ. Подчашие 3-хлестное; чашечка 5-тираздѣльная; вѣнчикъ 5-тилепестный; лепестки выемчатые, немного длиннѣе чашелистиковъ. Тычинокъ много, соединенныхъ нитями въ трубочку и несущихъ почковидные пыльники, открывающіеся одной горизонтальной щелью. Пестикъ состоитъ изъ 5-ти плодолистиковъ. Столбиковъ 5, сросшихся между собою основаніями въ дискообразный или конусообразный столбчикъ, вокругъ котораго расположены кольцомъ многочисленныя односѣмянныя гнѣздышки, отдѣляющіяся при созрѣваніи отъ столбика. Плодъ—сухой, распадающійся на многочисленныя морщинистыя поперекъ сѣмянки. Цвѣтеть лѣтомъ и осенью. Растетъ на огородахъ, около домовъ и т. п.

МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНІЕ. просвирика курчаваго ничтожно. Листья, какъ размягчающее средство, прикладываются къ болячкамъ.

Просвирикъ лѣсной (*Malva silvestris* L.). Фармацевтическое название: *Malva vulgaris*, s. *major*. Василекъ (Уф.), Дзиндзиверъ (Малор.), Дзіндзівєр (Малор.), Жинзиверъ, Зензивиръ, Зензиверъ, Зензиверова трава, Зензиверъ огородный (Полт.), Кудри царскія (Ниж.), Паночка голая (Укр.), Просвирикъ или Проскурнякъ дикій, Рожа, Рожицы красныя (Вят.), Свиняча ропа (Волын.), Слязь (Волог.), Слезъ, Танцерникъ (Волын.). Однолѣтнее травянистое растение изъ семейства «просвириковыхъ» (Malvaceae R. Br.), распространенное почти во всей Европѣ, въ средней и южной Россіи, въ Сибири. Стебель шершаво-волосистый, лежащій или приподнимающійся, длиною $6\frac{1}{2}$ — $22\frac{1}{2}$ вершк. Листья длинно-черешковые, округло-сердцевидные, 5—7-милопастные. Розовыя цвѣты на вверхъ стоящихъ ножкахъ по нѣсколько въ углахъ листьевъ. Чашечка 5-тираздѣльная, остающаяся. Лепестковъ 5, глубоко-выемчатыхъ. Тычинокъ много, сросшихся нитями въ трубочку. Плодолистиковъ и столбиковъ пять или болѣе; плодъ при созрѣваніи распадается на сѣмянки. Цвѣтеть лѣтомъ. Встрѣчается на поляхъ, около дорогъ.

Просвирикъ обыкновенный, или некрасивый (*Malva rotundifolia* L.). Фармацевтическое название: *Malva vulgaris* s. *minor*, s. *pumila* (Fol. et Flor.). Василекъ (Селенг.), Грудная трава, Груднишникъ, Грудашникъ, Залонки (Приарг. кр.), Зинзивей, Зинзиверъ круглолистный, Калачики (Вел. и Мал. Росс.), Поцерки (Малор., въ Полѣсьѣ), Перепечки (Могил.), Просвирики (б. ч. губ.), Просвирики дикія (Зарайск.), Проскурки (Малор.), Проскурень (Малор.), Проскурнякъ меньшій, Проскурникъ (Малор.),

Просвиринокъ (Орл.), Праскуда трава, Пряничникъ, Пышечникъ, Пышечка (Тамб., Сам.), Свиная рѣпа, Рожа (Екат., Кіев.), Слизь-трава, Слизь меньшій, Слязь, Слязь простой (Зал. Росс.). Однолѣтнее травянистое растеніе изъ семейства «просвириновыхъ» (*Malvaceae* R. Br.), распространенное въ средней и южной Европѣ и въ большей части Россіи. Стебель лежачій или приподнимающійся, шершаво-волосистый, длиною $3\frac{1}{2}$ —7 вершк. Листья длинно-черешковые, округлые, при основаніи сердцевидные, слегка 5—7-млопастные; блѣдно-розовые, почти блѣлые пѣты на цвѣтоножкахъ въ углахъ листьевъ. Чашелистиковъ 5; лепестковъ 5, вдвое длиннѣе чашелистиковъ. Тычинокъ много, сросшихся нитями въ трубочку. Плодолистиковъ и столбиковъ 5 и болѣе. Плодъ сухой, распадающійся по созрѣваніи на нѣсколько сѣмянокъ. Цвѣтетъ съ іюня до сентября. Растетъ на необработанныхъ и сорныхъ мѣстахъ. (Рис. 234.)

МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНІЕ. Просвиринокъ обыкновенный употребляется въ народѣ, главнымъ образомъ, снаружи. Изъ него готовятъ размягчающія примочки, отваръ служитъ для полосканія горла. Въ Калужской губерніи траву парятъ въ квасу и прикладываютъ къ золотушнымъ опухольямъ.

Просвиринокъ полевой, см. Хатма тюрингенская (*Lavatera thuringiaca* L.).

Просвиринокъ раздѣльнолистный (*Malva Alcea* L.). Фармацевтическое названіе: *Alcea*. Просвирки, Рожа полевая, Слязь (Минск.), Слезюкъ (Могил.), Филя. Многолѣтнее травянистое растеніе изъ семейства «просвириновыхъ» (*Malvaceae* R. Br.), распространенное почти во всей Европѣ, въ средней, западной, юго-западной Россіи. Стебель прямостоящій, наверху, вмѣстѣ съ листьями и чашечкой, шершавый отъ звѣздчатыхъ волосковъ. Нижніе листья 5-тираздѣльные, верхніе—3-храздѣльные, съ узко-ромбическими, 3-хлопастными и перисто-надрѣзанными или зубчатыми долями. Чашечка 5-тираздѣльная; вѣнчикъ 5-тилепестный, лепестки его выемчатые, розовые. Тычинокъ много, съ нитями, сросшимися въ трубочку. Плодолистиковъ и столбиковъ по 5-ти или болѣе. Плодъ—при созрѣваніи распадается на нѣсколько голыхъ, по сторонамъ морщинистыхъ сѣмянокъ. Цвѣтетъ лѣтомъ. Растетъ между кустарниками вблизи дорогъ и около домовъ.

Просвиринокъ сѣверный (*Malva borealis* Wallm., sin. *Malva pusilla*). Василки (Уф.), Василекъ (Уф.), Калачики (Вел. и Мал. Росс.), Калачникъ, Копеешникъ (Полт., Волог., Екат.), Просвирика (Вел. Росс.), Просвирки, Проскурка, Проскурки (Курск.), Проскурникъ, Просвиринокъ, Переночка (Могил.), Расходникъ (Хар.), Рѣпа дикая (Ниж.), Рѣпа свиная (Мог.), Свиной горохъ (Уф.), Слясъ (Гродн.), Шелягъ (Гродн.). Однолѣтнее травянистое растеніе изъ семейства «просвириновыхъ» (*Malvaceae* R. Br.), распространенное въ Европѣ и почти во всей Россіи. Походитъ весьма на просвиринокъ обыкновенный (описаніе см. выше: «Просвиринокъ обыкновенный»), съ тою разницею, что лепестки

вѣнчика одинаковой длины съ чашелистиками или короче ихъ, слегка выемчатые, бѣлые. Цвѣтеть съ іюня до сентября, растеть на необработанныхъ и сорныхъ мѣстахъ, около домовъ и т. п.

МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНІЕ. СѢверный просвирникъ употребляется въ народной медицинѣ. Листья употребляютъ на клпстиры и припарки, а изъ корня дѣлають мазь. Въ Екатеринославской губ. отъ задержанія мочи траву варять съ молокомъ и даютъ пить утромъ и вечеромъ по стакану. Кромѣ того, отваръ пьютъ отъ стѣспнія въ груди (Ковенск. губ.) и отъ рѣзи въ животѣ, худобы и женскихъ болѣзней въ Гродненской губ.

Просвирнякъ, см. Просвирникъ обыкновенный (*Malva rotundifolia* L.).

Просвирнякъ, см. Хатьма тюрингенская (*Lavatera thuringiaca* L.).

Просвирнякъ, см. Алтей лекарственный (*Althaea officinalis* L.).

Просвирнякъ розовый, см. Штокъ-роза (*Althaea rosea* Cav.).

Просвирь, см. Бересклетъ европейскій (*Evonymus europaeus* L.).

Просерень, см. Первоцвѣтъ лекарственный (*Primula officinalis* Jacq.).

Просиренокъ, см. Брандушка (*Bulbocodium ruthenicum* Bunge).

Проска, см. Боръ развѣсистый (*Milium effusum* L.).

Проскурень, см. Просвирникъ обыкнов. (*Malva rotundifolia* L.).

Проскурина, см. Бересклетъ европейскій (*Evonymus europaeus* L.).

Проскурина, см. Бересклетъ бородавчатый (*Evonymus verrucosus* L.).

Проскурина, см. Крушина слабительная (*Rhamnus cathartica* L.).

Проскурка } см. Просвирникъ сѢверный (*Malva borealis* Wallm.).

Поресурки }

Проскурникъ, см. Просвирникъ обыкновенный (*Malva rotundifolia* L.).

Проскурникъ, см. Просвирникъ сѢверный (*Malva borealis* Wallm.).

Проскурникъ, см. Алтей лекарственный (*Althaea officinalis* L.).

Проскурникъ боровой, см. Дивала однолѣтняя (*Scleranthus annuus* L.).

Проскурнякъ, см. Алтей лекарственный (*Althaea officinalis* L.).

Проскурнякъ, см. Хатьма тюрингенская (*Lavatera thuringiaca* L.).

Проскурнякъ дикій, см. Просвирникъ лѣсной (*Malva silvestris* L.).

Проскурнякъ лекарственный, см. Алтей лекарственный (*Althaea officinalis* L.).

Проскурнякъ лѣсной, см. Просвирникъ лѣсной (*Malva silvestris* L.).

Проскурнякъ меньшій, см. Просвирникъ обыкновенный (*Malva rotundifolia* L.).

Прослика, см. Щетинникъ зеленый (*Setaria viridis* Beauv.).

Просо, см. Боръ развѣсистый (*Milium effusum* L.).

- Просо**, см. Просо колосистое (*Panicum Crus Galli* L.).
Просо, см. Просо настоящее (*Panicum millaceum* L.).
Просо бухарское волосистое, см. Бухарник шерстистый (*Holcus lanatus* L.).
Просо воробьиное, см. Воробьиное просо полевое (*Anagallis arvensis* L.).
Просо воробьиное, см. Воробейник лекарственный (*Lithospermum officinale* L.).
Просо воробьиное, см. Воробейник полевой (*Lithospermum arvense* L.).
Просо воробьиное } см. Просо колосистое (*Panicum Crus Galli* L.).
Просо дикое }
Просо гребенчатое }
Просо египетское, см. Дурра (*Sorghum vulgare* Pers.).
Просо каменное, см. Воробейник лекарственный (*Lithospermum officinale* L.).
Просо китайское, см. Сорго сахарное (*Sorghum saccharum* Poir.).
Просо колосистое, или гребенчатое (*Panicum Crus Galli* L., sin. *Echinochloa Crus Galli* Beauv.). Борь дикій (Нижег.), Брица (Сам., Астр.), Метличка (Сарат.), Мышій (Курск.), Мышей береговой, Плоскуха (Малор.), Просо дикое (Сарат., Сам. и др.)
 Просо воробьиное (Влад.), Просянка (Астр.), Поросянка, Пшено полевое, Пырей болотный (Ниж.), Пыринь (Мог.), Собачник (Укр.), Чижики (Тамб.), Пѣтушья голень (Могил.). Однолѣтнее травянистое растение изъ семейства «злаковыхъ» (*Gramineae* Juss.), распространенное въ средней и южной Европѣ, въ средней и южной Россіи, въ Туркестанѣ и Сибири. Стебель прямой, обыкновенно развѣтвленный, выш. 7—14 вершковъ. Листья широко-линейные, покрытые волосками. Метелка состоитъ изъ густыхъ одностороннихъ колосьевъ, отодвинутыхъ другъ отъ друга на довольно значительное разстояніе. Колоски, входящіе въ составъ колосьевъ, зеленые, часто съ фиолетовымъ отбѣнкомъ, почти сидячіе, по формѣ яйцевидно-эллиптическіе. Створки, или колосковыя чешуи, въ числѣ 2; наружная створка въ 2—3 раза короче внутренней, съ 3-ми жилками, внутренняя—одинаковой длины съ колоскомъ, съ 5-ю жилками. Цвѣточныхъ пленокъ 3, изъ которыхъ 2 принадлежатъ плодущему цвѣтку, а остальные—безплодному (безполому), заострены и продолжены въ ость. Цвѣточные чешуи бѣловатыя, блестящія. Околоцвѣтникъ состоитъ изъ 2-хъ пленочекъ; тычинокъ 3; столбика 2, длинныхъ, несущихъ красныя перистыя рыльца, выступающія близъ верхушки колосковъ. Плодъ—эллиптическое, сжатое немного со спинки. зерно. Цвѣтетъ въ іюлѣ и августѣ. Встрѣчается, какъ сорная трава, на песчаныхъ поляхъ, въ садахъ и огородахъ. (Рис. 235.)
Просо красное, см. Амарантъ метельчатый (*Amaranthus paniculatus* L.).
Просо метельчатое, см. Дурра (*Sorghum vulgare* Pers.).

Просо настоящее (*Panicum miliaceum* L.). Боръ, Буянъ (Сарат. назв. бѣлаго проса), Просо, Пшено, Текачъ (Малор. назв. желтаго проса). Однолѣтняя трава изъ семейства «злаковыхъ» (*Gramineae* Juss.), родомъ, какъ полагаютъ, изъ Остѣ-Индіи, съ прямостоящимъ, внизу нерѣдко развѣтвленнымъ стеблемъ, выш. 11—22½ вершк. Листья линейно-ланцетные, усаженные частыми оттопыренными волосками. Метелка густая; вѣтви ея у однихъ сортовъ прижаты къ главной оси и наклонены въ одну сторону, у другихъ-же онѣ равномерно раскинуты во всѣ стороны. Колоски немного сплюснуты со стороны стѣнки, сидятъ на ножкахъ и лишены остей. Створки ихъ широко-яйцевидныя, заостренныя, въ числѣ 2; наружная створка съ 7-ю выдающимися жилками. Пленокъ цвѣточныхъ 3, изъ которыхъ 2 принадлежатъ плодущему цвѣтку, а остальная (похожая на створку)—безплодному или безплодному. Цвѣточные пленки при зернахъ бѣлыя, желтыя, красно-бурыя и черноватыя, смотря по сорту. Околоцвѣтникъ состоитъ изъ 2 плечечекъ. Тычинокъ 3; столбиковъ 2, длинныхъ, несущихъ красныя перистыя рыльца. Плодъ—эллиптическое, сжатое со спинки, зерно. Разводится на поляхъ, преимущественно на песчаной почвѣ. Изъ проса готовится пшенная крупа, употребляемая въ пищу; лучший сортъ ея янтарно-желтаго цвѣта. Зерна составляютъ хорошій кормъ для домашней птицы. (Таб. XXXIX, ф. г. 217.)

Просо птичье, см. Амарантъ колосистый (*Amaranthus retroflexus* L.).

Просо разсыпное, см. Боръ развѣсистый (*Milium effusum* L.).

Просо солнечное, см. Воробейникъ лекарственный (*Lithospermum officinale* L.).

Просо татарское, см. Амарантъ колосистый (*Amaranthus retroflexus* L.).

Просо татарское } см. Дурра (*Sorghum vulgare* Pers.).

Просо турецкое }

Просовикъ, см. Боръ развѣсистый (*Milium effusum* L.).

Просорень гадючій, см. Брандушка (*Bulbocodium ruthenicum* B.).

Простовидная трава, см. Ласточникъ обыкновенный (*Vincetoxicum officinale* Münch.).

Простоволосъ, см. Частуха обыкновенная (*Alisma Plantago* L.).

Прострѣлъ, см. Сонъ (*Anemone Pulsatilla* L.).

Прострѣлъ, см. Ландышъ майскій (*Convallaria majalis* L.).

Прострѣлъ, см. Борецъ снѣгій (*Aconitum Napellus* L.).

Прострѣлъ, см. Сонъ-трава (*Anemone patens* L.).

Прострѣлъ, см. Истодъ обыкновенный (*Polygala vulgaris* L.).

Прострѣлъ боровой, см. Сонъ-трава (*Anemone patens* L.).

Прострѣлъ боровой, см. Вѣтреница тѣнистая (*Anemone nemorosa* L.).

Прострѣлъ глубокій, см. Коровякъ черный (*Verbascum nigrum* L.).

Прострѣлъ лѣсной } см. Борецъ желтый (*Aconitum Lycoct-*

Прострѣльная трава } num L.).

- Прострѣльная трава, см. Сонъ-трава (*Anemone patens* L.).
- Прострѣльная трава, см. Чертополохъ полевой (*Cirsium arvense* Scop.).
- Прострѣльникъ, см. Сонъ-трава (*Anemone patens* L.).
- Простудная трава, см. Ланчатка серебристая (*Potentilla argentea* L.).
- Простудная трава, см. Кровохлебка лекарственная (*Sanguisorba officinalis* L.).
- Простуха, см. Пшеница обыкновенная (*Triticum vulgare* L.).
- Просьянка, см. Метлица полевая (*Agrostis Spica Ventii* L.).
- Просьянка, см. Просо колосистое, или гребенчатое (*Panicum Crus Galli* L.).
- Просьянка, см. Щетинникъ зеленый (*Setaria viridis* Beauv.).
- Просьянка, см. Щетинникъ сизый (*Setaria glauca* Beauv.).
- Противудная трава, см. Ласточникъ обыкновенный (*Vincetoxicum officinale* Moench.).
- Проходъ, см. Поповникъ непахучій (*Matricaria inodora* L.).
- Прочитанъ, см. Плющъ обыкновенный (*Hedera Helix* L.).
- Прошибень, см. Кокушникъ (*Gymnadenia conopsea* Rich.).
- Прошибень болотный, см. Кукушкины слезки (*Orchis maculata* L.).
- Прутякъ, см. Перець дикій (*Vitex Agnus Castus* L.).
- Прутякъ, см. Кровохлебка лекарственная (*Sanguisorba officinalis* L.).
- Прущъ, см. Герань полевая (*Geranium pratense* L.).
- Прыворотень, см. Манжетка обыкновенная (*Alchemilla vulgaris* L.).
- Прыворотень, см. Пижма (*Tanacetum vulgare* L.).
- Прыговка } см. Недотрога желтая (*Impatiens noli me tangere* L.).
- Прыгунъ }
- Прыгунъ, см. Купена лекарственная (*Convallaria Polygonatum* L.).
- Прыточникъ, см. Жасминъ полевой (*Lycium barbarum* L.).
- Прыщеница, см. Очитокъ острый (*Sedum acre* L.).
- Прыщинецъ (*Ranunculus Flammula* L.). Фармацевтическое назв.: *Flammula*, s. *Ranunculus Flammeus minor* (Herba). Дробнолистка (Черниг.), Братъ съ сестрой, Купальница, Шавелокъ (Смол.), Ужовка (Пск.). Многолѣтнее травянистое растение изъ семейства «лютиковыхъ» (*Ranunculaceae* Juss.), распространенное во всей Европѣ и почти во всей Россіи. Стебель стелющійся, приподнимающійся, рѣдко прямой. Нижніе листья съ черешками, продолговатые или ланцетные, съ рѣдкими зубцами по краю, туповатые или острые. Цвѣты желтые. Чашелистикомъ 5, не отвороченныхъ; лепесткомъ 5, снабженныхъ при основаніи медовой ямкой. Тычинокъ и плодolistиковъ много. Плодъ состоитъ изъ сѣмянокъ, снабженныхъ маленькимъ, почти прямымъ носикомъ. Цвѣтетъ лѣтомъ и осенью. Растетъ на сырыхъ мѣстахъ и около береговъ.

МЕДИЦИННОЕ УПОТРЕБЛЕНІЕ Прыщинецъ очень ядовитое

растение, обладает острыми нарывными свойствами, почему до настоящего времени употребляется въ Швеции, какъ нарывное средство. Выжатый сокъ травы тамъ-же употребляютъ противъ скорбута. При отравленіи слѣдуетъ вызвать рвоту, давать большое количество воды для питья и затѣмъ, когда больному послѣ рвоты станетъ немного лучше, какое-нибудь кислое питье—изъ красной смородины, клюквы, шавеля или изъ воды съ уксусомъ. Употребляется растение, главнымъ образомъ, снаружи; отваромъ обмываютъ чесотку; свѣжую толченую траву кладутъ къ твердымъ опухольямъ, при этомъ необходимо слѣдить, чтобы не произошло воспаления на кожѣ, которое очень трудно излечивается. Мазь дѣйствуетъ не такъ сильно; для приготовления мази берутъ 1 часть сока на 2 части свѣжаго коровьяго масла.

Пряда, см. Щетинникъ зеленый (*Setaria viridis* Beauv.).

Пряжа

Пряжа галочья } см. Повелика клеверная (*Cuscuta Epithy-*
Пряжа крапивная } *mum* Sm.).

Пряжа сорочья

Пряжа сорочья, см. Плющъ обыкновенный (*Hedera Helix* L.).

Пряжка, см. Повелика клеверная (*Cuscuta Epithymum* Sm.).

Пряжка, см. Подмаренникъ цѣлкій (*Galium Aparine* L.).

Прянишникъ, см. Алтей лекарственный (*Althaea officinalis* L.).

Пряничникъ, см. Просвириакъ обыкновенный (*Malva rotundifolia* L.).

Пряслина венерина, см. Кервель гребневидный (*Scandix Pecten Veneris* L.).

Псиинки

Псиинки черные } см. Пасленъ черный (*Solanum nigrum* L.).

Псярка, см. Амарантъ колосистый (*Amaranthus retroflexus* L.).

Пташинецъ, см. Ласточникъ обыкновенный (*Vincetoxicum officinale* Moench.).

Птицемлечникъ, см. Птицемлечникъ зонтичный (*Ornithogalum umbellatum* L.).

Птицемлечникъ зонтичный (*Ornithogalum umbellatum* L.).

Птицемлечникъ, Птичье молоко, Пѣтушье молоко. Многолѣтнее луковичное травянистое растение изъ семейства «лилейныхъ» (*Liliaceae* Dc.), распространенное въ средней и южной Европѣ, изрѣдка встрѣчающееся въ средней и южной Россіи. Луковица маленькая, величиною съ лѣсной орѣхъ. Листья прикорневые узко-линейные, зеленые, съ бѣлой полоской по срединѣ. Цвѣточный стебель безлиственный, выш. до 6 вершк. Бѣлые цвѣты собраны рыхлою зонтикообразною кистью. Околоцвѣтникъ состоитъ изъ 6 простертыхъ бѣлыхъ, съ широкою зеленою полоской на спинкѣ, лепестковъ. Тычинокъ 6, съ линейно-шиловидными нитями; пыльники прикрѣплены къ нити въ срединѣ ихъ спинки. Завязь верхняя 3-хгнѣздная, съ нитевиднымъ столбикомъ, несущимъ треугольное рыльце. Плодъ—тупо-3-гранная коробочка съ немногими сѣменами, кожура которыхъ черная. Цвѣтетъ въ

маѣ и въ июнѣ. Растетъ на поляхъ и дугахъ. Жареныя луковицы съдобны. (Табл. XXXIX, фиг. 215.)

Птицемлечникъ поникшій (*Ornithogalum nutans* L.). Многолѣтнее травянистое растеніе изъ семейства «лилейныхъ» (*Liliaceae* DC.), распространенное въ средней и южной Европѣ, изрѣдка встрѣчающееся въ южной Россіи. Луковица величиною съ грецкій орѣхъ. Листья прикорневые, линейные, сизо-зеленые. Цвѣточный стебель безлистный, выш. 6—7 вершк., съ рыхлою однобочною кистью поникшихъ цвѣтовъ. Околоцвѣтникъ о 6 простертыхъ листочкахъ, внутри бѣлыхъ, снаружи зеленыхъ, съ бѣлыми краями. Тычинокъ 6; нити ихъ лепестковидныя, зеленныя, съ 2-мя зубцами; пыльники прикрѣплены въ серединѣ спинки нити. Завязь верхняя 3-хгнѣздная, съ нитевиднымъ столбикомъ, оканчивающимся треугольнымъ рыльцемъ. Плодь—3-гранная, съ углубленной верхушкой, коробочка. Цвѣтетъ весной. Растетъ на дугахъ и поляхъ. (Рис. 236.)

Птичій клей, см. Падубъ обыкновенный (*Ilex Aquifolium* L.).

Птичье гнѣздо, см. Гнѣздовка обыкновенная (*Neottia nidus avis* Rich.).

Птичье молоко, см. Птицемлечникъ зонтичный (*Ornithogalum umbellatum* L.).

Пуволица, см. Подмаренникъ желтый (*Gallium verum* L.).

Пугало, см. Олеандръ (*Nerium Oleander* L.).

Пугвела, см. Поповникъ непахучій (*Matricaria inodora* L.).

Пугвенникъ желтый, см. Пулавка красильная (*Anthemis tinctoria* L.).

Пугвика, см. Поповникъ непахучій (*Matricaria inodora* L.).

Пуговальникъ желтый, см. Девясиль подсолнечный (*Inula Helenium* L.).

Пуговичникъ, см. Пижма (*Tanacetum vulgare* L.).

Пуговка, см. Кувшинка желтая (*Nuphar luteum* Smith.).

Пуговки, см. Орѣхи рвотные (*Strychnos nux vomica* L.).

Пуговникъ, см. Пулавка красильная (*Anthemis tinctoria* L.).

Пуговникъ, см. Василекъ перистый (*Centaurea Scabiosa* L.).

Пуговникъ, см. Цикорій обыкновенный (*Cichorium Intybus* L.).

Пуговникъ, см. Чертополохъ полевой (*Cirsium arvense* Scop.).

Пуговникъ, см. Короставникъ полевой (*Scabiosa arvensis* L.).

Пуговникъ, см. Желтуха (*Senecio Jacobea* L.).

Пуговникъ синій, см. Чертополохъ полевой (*Cirsium arvense* Scop.).

Пудожъ, см. Осоть огородный (*Sonchus oleraceus* L.).

Пужникъ, см. Ленокъ полевой (*Turritis glabra* L.).

Пузикъ, см. Касатикъ водяной (*Iris pseudacorus* L.).

Пузырникъ, см. Пузырное дерево (*Colutea arborescens* L.).

Пузырникъ, см. Мыльнянка лекарств. (*Saponaria officinalis* L.).

Пузырникъ ломкій (*Cystopteris fragilis* Bernh.). Многолѣтній папоротникъ изъ семейства «полиподіевыхъ» (*Polypodiaceae* Br.), широко распространенный по всему сѣверному полушарію. Корневище ползучее, листья на весьма ломкихъ черешкахъ,

дважды-перисто-разсѣченные, съ зубчатыми или надрѣзными долями. Спорангіи (особыя вмѣстѣлища со спорами) расположены на протяженіи нервъ долей листа и прикрыты покрываломъ, которое прикрѣплено сбоку съ одной стороны кучки, а впоследствии дѣлается нерѣдко незамѣтнымъ. Растетъ въ тѣнистыхъ мѣстахъ, на склонахъ овраговъ или въ разсѣлинахъ утесовъ, особенно въ гористыхъ мѣстностяхъ.

Пузырница, см. Гравилатъ городской (*Geum urbanum* L.).

Пузырница, см. Пузырчатка обыкновенная (*Urticularia vulgaris* L.).

Пузырное дерево (*Coluta arborescens* L.). Фармацевтическое назв. *Senna germanica*. Мошка-дерево, Мошникъ, Пузырникъ, Чечевичное дерево, Чечевица овечья. Кустарникъ изъ семейства «мотыльковыхъ» (*Papilionaceae* L.), распространенное въ южной Европѣ, въ Крыму и на Кавказѣ, съ непарно-перистыми листьями, состоящими изъ 7—11 обратно-яйцевидныхъ или овальныхъ, на верхушкѣ выемчатыхъ, листочковъ; ярко-желтые цвѣты, по 3—6, образуютъ кисти въ пазухахъ листьевъ. Чашечка коротко-колокольчатая, съ 5-ю треугольными зубцами, изъ которыхъ верхніе короче; вѣнчикъ мотыльковый, 5-лепестный: дискъ (верхній лепестокъ) съ 2-мя бугорками, крылья (боковые лепестки) серпообразно-согнуты, лодочка (2 нижніе, сросшіеся) тупая. Тычинокъ 10: 9 изъ нихъ сросшихся, 10-я (верхняя) свободная. Столбикъ на внутренней сторонѣ вдоль пушистый, на верхушкѣ утолщенный, вдоль загнутый. Плодъ—голый или нѣсколько пушистый бобъ, замкнутый, при верхушкѣ многосѣмянный. Цвѣтетъ лѣтомъ. Разводится нерѣдко въ садахъ для живой изгороди.

МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНІЕ. Листья пузырника имѣютъ слабительное дѣйствіе, потому замѣняетъ иногда сенну (александрійскій листъ).

Пузырное сѣмя, см. Чечевица овечья (*Cicer Arletinum* L.).

Пузырчатка, см. Пузырчатка обыкновенная (*Urticularia vulgaris* L.).

Пузырчатка обыкновенная (*Urticularia vulgaris* L.). Фармацевтическое назв.: *Lentibularia*. Брюшатка, Волынчатка, Воронковидъ, Пузырница, Пузырчатка. Плавающая въ водѣ многолѣтняя трава, лишенная корней, изъ семейства «пузырчатковыхъ» (*Lentibulariaceae* Rich.), распространенная почти во всей Европѣ, въ сѣверной, средней, юго-западной Россіи и обыкновенная въ Сибири, съ мелко-разсѣченными листьями, несущими маленькіе, внутри полые пузырьки. Входъ въ пузырекъ плотно закрытъ клапаномъ, который при толчкѣ легко открывается внутрь, но, какъ только давленіе извнѣ прекратится, клапанъ, благодаря своей эластичности, снова принимаетъ первоначальное положеніе. Когда мелкое водяное животное проникнетъ въ пузырекъ, оно вскорѣ погибаетъ въ своей темницѣ, а продукты разложенія его идутъ на питаніе растенія. Довольно крупныя желтые цвѣты собраны кистью, выступающей на $3\frac{1}{2}$ —7 вершк.

надъ поверхностью воды. Чашечка двураздѣльная; вѣнчикъ двугубый, съ короткой трубочкой, снабженной при основаніи шпорой; верхняя губа округло-яйцевидная, съ отвороченными краями, столь-же длинная, какъ выпуклина на нижней губѣ, 3-лопастная, притупленная, съ внизъ отогнутыми краями и съ выпуклиной, заслоняющей входъ въ трубочку вѣнчика. Тычинокъ 2; пыльники одногнѣздные, прикрѣпленные вдоль. Завязь верхняя, одногнѣздная. Плодъ — шаровидная, разрывающаяся неправильно коробочка. Цвѣтетъ лѣтомъ. Растетъ въ стоячихъ и медленно текущихъ водахъ. Въ медицинѣ въ настоящее время не употребляется. (Рис. 237.)

Пузырчатникъ, см. Аютины глазки (*Viola tricolor* L.).

Пуколка, см. Хлопушка (*Silene inflata* Smith.).

Пупавка, см. Пупавка красильная (*Anthemis tinctoria* L.).

Пупавка, см. Ромашка римская (*Anthemis nobilis* L.).

Пупавка, см. Пупавка полевая (*Anthemis arvensis* L.).

Пупавка, см. Поповникъ обыкновенный (*Chrysanthemum Leucanthemum* L.).

Пупавка, см. Пижма (*Tanacetum vulgare* L.).

Пупавка бѣлая, см. Поповникъ обыкновенный (*Chrysanthemum Leucanthemum* L.).

Пупавка желтая, см. Пупавка красильная (*Anthemis tinctoria* L.).

Пупавка желтая, см. Кувшинка желтая (*Nuphar luteum* Smith.).

Пупавка вонючая, см. Ромашка собачья (*Anthemis Cotula* L.).

Пупавка красильная (*Anthemis tinctoria* L.). Фармацевтическое назв.: *Buphtalmum vulgare* s. *Cotula lutea* (Herba et Flores). Бадкы (Малор.), Воловье око, Гвоздики полевые, Глазъ бычій, Глазъ водовій, Желтоцвѣтъ (Вор.), Желтый цвѣтъ (Вятск.), Желтые цвѣтки (Ниж.), Желтушки (Тв.), Желтордье, Желтушка (Костр.), Жовтило (Мал.), Купальникъ (Черниговской, Таврической), Купавки, Купавочки, Лопаски (Нижегородской), Ноготокъ бычій, Ноготки полевые, Нагидки полевые (Киев.), Пупавка, Пупавка желтая (Вят.), Пуповка, Пупилки, Папавка (Бѣлор.), Пуповки лѣсныя, (Хар.), Хупавки (Малор.), Пуповникъ (Кал.), Пупавникъ (См. Ц.), Пуповникъ желтый (Екат.), Попы желтые (Влад.), Пупки (Смол.), Первенникъ желтый (Вят.), Ромашка желтая (Пет., Пск., Бесс., Екат.), Ромашка полевая (Минск.), Ромашка боровая (Пск.), Рябинка дикая (Вятск.), Ромонъ, Роменъ, Романъ красный, (Под.), Романка (Пет.), Расходникъ большой, Шанки полевые (Каз.), Шафранъ полевой (Вятск.), Цвѣтуха (Алт., Верб.), Многолѣтнее травянистое растеніе изъ семейства «сложноцвѣтныхъ» (*Compositae* Adans.), распространенное почти во всей Европѣ и въ Россіи. Стебель прямой, простой или наверху вѣтвистый, вмѣстѣ съ листьями прижато-пушистый. Листья перисто-разсѣченные, съ зубчатымъ стерженькомъ, гребенчато-раздѣльными сегментами и острыми, пильчатыми на наружномъ краю, дольками. Цвѣтоножки длинныя. Корзинки желтыя, до-

вольно крупныя. Краевые женскіе цвѣты язычковые, желтые, такъ-же, какъ и срединные обоесполовые трубчатые цвѣты. Вѣнчикъ у послѣднихъ съ сплюснутой трубкой. Тычинокъ 5; завязь нижняя одногнѣздная, съ столбикомъ, лопасти котораго на концахъ притупленныя, кистистыя. Плодъ—сѣмянки продолговатыя, 4-хгранныя, съ 5 ребрышками на каждой сторонѣ. Цвѣтеть лѣтомъ. Растетъ на поляхъ, степяхъ и холмахъ. Изъ цвѣтовъ добываютъ прекрасную лимонно-желтую краску.

МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНІЕ. Пупавка красильная употребляется въ народной medicinѣ: въ Таврической губерніи отъ желтухи, въ Кіевской отъ золотухи, тамъ-же отъ остановки очищеній послѣ родовъ, въ Псковской отъ простуды для производства испарины.

Пупавка обыкновенная, см. Пупавка полевая (*Anthemis arvensis* L.).

Пупавка полевая (*Anthemis arvensis* L.). Какорва, Ромашка кошачья, Романъ-зелье, Румянокъ, Ромашка, Ромень, Реманъ дикій, Пупавка обыкновенная. Однолѣтнее и двулѣтнее травянистое растеніе изъ семейства «сложноцвѣтныхъ» (*Compositae* Adans.), распространенное въ средней и южной Россіи, въ западныхъ губерніяхъ и въ средней полосѣ Россіи. Стебель прямостоящій или восходящій, покрытый короткими шелковистыми волосками. Листья перисто- или двояко-перисто-разсѣченные, съ ланцетовидными цѣльными, 2—3-хнадрѣзными, острыми долями. Корзинки средней величины. Цвѣтоложе коническое. Цвѣты красныя язычковые, (женскіе) бѣлыя, срединныя—обоесполовые, трубчатые. Прицвѣтники съ колючимъ остроконечіемъ. Вѣнчикъ у трубчатыхъ цвѣтовъ съ сплюснутой трубкой. Тычинокъ 5; завязь нижняя одногнѣздная, односѣмянная, съ двуллопастнымъ столбикомъ, лопасти котораго на концѣ кистистыя. Плодъ—сѣмянка. Цвѣтеть лѣтомъ. Растетъ на поляхъ и сорныхъ мѣстахъ. (Рис. 238.)

МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНІЕ. Прежде растеніе употреблялось въ medicinѣ, какъ глистогонное и разбивающее камни средство, теперь оно оставлено совсѣмъ.

Пупавка полевая, см. Поповникъ обыкновенный (*Chrysanthemum Leucanthemum* L.).

Пупавникъ }
Пупилки } см. Пупавка красильная (*Anthemis tinctoria* L.).
Пупки }

Пупки дѣвичьи, см. Тысячелистникъ обыкновенный (*Achillea Millefolium* L.).

Пупная трава, см. Лапчатка-узикъ (*Potentilla Tormentilla* L.).

Пупникъ, см. Короставникъ полевой (*Scabiosa arvensis* L.).

Пупникъ, см. Сивецъ (*Scabiosa succisa* L.).

Пуповикъ, см. Частуха обыкновенная (*Alisma Plantago* L.).

Пуповикъ, см. Запникъ клубеносный (*Phlomis tuberosa* L.).

Пуповка } см. Пупавка красильная (*Anthemis tinctoria* L.).
Пуповки лѣсныя }

- Пуповная трава, см. Сивецъ (*Scabiosa succisa* L.).
 Пуповникъ, см. Частуха обыкновенная (*Alisma Plantago* L.).
 Пуповникъ, см. Кошачьи лапки (*Antennaria dioica* Gärtn.).
 Пуповникъ, см. Пулавка красильная (*Anthemis tinctoria* L.).
 Пуповникъ, см. Арника горная (*Arnica montana* L.).
 Пуповникъ, см. Поповникъ непахучій (*Matricaria inodora* L.).
 Пуповникъ, см. Лапчатка-узикъ (*Potentilla Tormentilla* L.).
 Пуповникъ, см. Короставникъ полевой (*Scabiosa arvensis* L.).
 Пуповникъ, см. Сивецъ (*Scabiosa succisa* L.).
 Пуповникъ желтый, см. Пулавка красильная (*Anthemis tinctoria* L.).
 Пуповное коренъе, см. Лапчатка-узикъ (*Potentilla Tormentilla* Schrenk.).
 Пупочное сѣмя, см. Подмаренникъ дѣлкій (*Gallum Aparine* L.).
 Пушонникъ, см. Частуха обыкновенная (*Alisma Plantago* L.).
 Пушонникъ, см. Василекъ перистый (*Centaurea Scabiosa* L.).
 Пупчики, см. Клеверъ пашенный, или кошачій (*Trifolium arvense* L.).
 Пупыри, см. Бутень клубненосный (*Chaerophyllum bulbosum* L.).
 Пупырка, см. Кошачьи лапки (*Antennaria dioica* Gärtn.).
 Пупырникъ, см. Бедренецъ обыкновенный (*Pimpinella saxifraga* L.).
 Пупырникъ, см. Пупырникъ обыкновенный (*Torilis Anthriscus* Gärtn.).
 Пупырникъ обыкновенный (*Torilis Anthriscus* Gärtn.). Кашка (Минск.), Купырь, Пушырникъ, Опуцки (Малор.), Олений корень, Пупырнукъ, Свербигузъ, Хвостъ бѣлый, Цвѣтъ обыкновенный. Двудѣтное травянистое растеніе изъ семейства «зонтичныхъ» (*Umbelliferae* Juss.), распространенное почти во всей Европѣ, въ западной, средней и южной Россіи, вып. 14—28 вершк., покрытое прижатыми, внизъ направленными, короткими щетинками. Нижніе листья двояко-перистые, верхніе — перистые; доли ихъ продолговатыя, по краямъ пильчатыя или надрѣзанныя. Бѣлые или красноватые цвѣты въ сложныхъ зонтикахъ на длинныхъ ножкахъ, о 3—9 лучахъ. Обвертки и оберточка зонтиковъ состоятъ изъ многочисленныхъ шиловидныхъ прицвѣтниковъ. Чашечка о 5 зубчикахъ. Лепестковъ и тычинокъ по 5. Завязь нижняя, 2-хнѣздная, снабжена на верхушкѣ железистымъ дискомъ, выделяющимъ сладкій сокъ; столбиковъ 2. Плодъ — яйцевидная, усаженная многочисленными шипами, двусѣмянка, распадающаяся при созрѣваніи на 2 плодика, висѣщихъ на срединномъ столбикѣ. На синикѣ плодика выдаются 5 нитевидныхъ продольныхъ главныхъ реберъ, усаженныхъ шипами, а между ними 4 болѣе выдающіяся вторичныя ребра. Цвѣтетъ лѣтомъ. Растетъ въ рощахъ и между кустарниками. (Рис. 239.)
 Пупырниуъ, см. Пупырникъ обыкновенный (*Torilis Anthriscus* Gärtn.).

Пупырь-борщъ, см. Борщевикъ сибирскій (*Heracleum sibiricum* L.).

Пупырье, см. Бутень клубненосный (*Chaerophyllum bulbosum* L.).

Пупыши, см. Хвощъ полевой (*Equisetum arvense* L.).

Пурей, см. Поррей (*Allium Porrum* L.).

Пурхавка, см. Дождевикъ шишковатый (*Lycoperdon gemmatum* Batsch.).

Пустарнакъ, см. Пастернакъ огородный (*Pastinaca sativa* L.).

Пустоволосая трава, см. Запникъ клубненосный (*Phlomis tuberosa* L.).

Пустодомъ, см. Иванъ-чай (*Epilobium angustifolium* L.).

Пустодомъ, см. Жабникъ нашенный (*Filago arvensis* L.).

Пустодуй, см. Одуванчикъ лекарственный (*Taraxacum Dens Leonis* Desf.).

Пустеника, см. Пикulyникъ длинноцвѣтный (*Galeopsis Ladanum* L.).

Пусторосль, см. Бузина вонючая (*Sambucus Ebulus* L.).

Пусторосль } см. Бузина черная (*Sambucus nigra* L.).

Пусторылъ }

Пусторылъ, см. Жасминъ дикій, ночной (*Philadelphus coronarius* L.).

Пустосель, см. Купырь лѣсной (*Anthriscus silvestris* Hoffm.).

Пустосель, см. Чертополохъ курчавый (*Carduus crispus* L.).

Пустосель, см. Василекъ перистый (*Centaurea Scabiosa* L.).

Пустосель, см. Чертополохъ разнолиственный (*Cirsium heterophyllum* L.).

Пустосель, см. Укропъ конскій (*Oenanthe Phellandrium* L.).

Пустошель, см. Купырь лѣсной (*Anthriscus silvestris* Hoffm.).

Пустохлѣбка, см. Грыжникъ голый (*Herniaria glabra* L.).

Пустоцвѣтъ, см. Гравилатъ прямой (*Geum strictum* Alt.).

Пустоцвѣтъ, см. Золотая розга (*Solidago Virgaurea* L.).

Пустырникъ, см. Пустырникъ обыкновенный (*Leonorus Cardiac* L.).

Пустырникъ обыкновенный (*Leonorus Cardiac* L.). Фармацевтическое назван.: *Cardiaca* s. *Agripalma* (Herba). Крапива глухая (въ большей части Россіи), Крапива глуха (Малор.), Крапива дикая, Крапива собачья (въ большей части Россіи), Крапива глухая татарская, Крапивничокъ (Волин.), Курпониъ, Курпониъ лѣсный (Екат.), Мапа гусиная, Пустырникъ, Пустырнякъ, Сердечникъ, Сердечная трава (Перм.), Синдра (Полт.), Стрѣлбная (Вятск.), Хвостъ львиный. Многолѣтнее травянистое растение изъ семейства «губоцвѣтныхъ» (*Labiatae* Juss.), распространенное почти по всей Европѣ и по всей Россіи. Стебель прямостоящій, пушистый, выш. 7—22½ вершк. Нижніе листья пальчато-5-тираздѣльные, верхніе—3-хлопастные. Мוטовки (т.-е. кольца), состоящія изъ 6—15 мелкихъ розовыхъ цвѣтѣвъ, сидятъ въ углахъ листьевъ и образуютъ длинный колосъ. Чашечка трубчато-колокольчатая, съ 5 жилками и 5 отстоящими

колючими зубцами. Вѣнчикъ съ невыдающейея изъ чашечки трубочкой, снабженной внутри при основаніи волосистымъ кольцомъ. Вѣнчикъ двугубый, съ мохнатой, продолговатой вогнутой верхней губой, вдвое превышающею чашечку, и съ трехлопастной нижней губой. Тычинокъ 4, съ параллельными гнѣздами пыльниковъ; двѣ боковыя изъ нихъ длиннѣе и послѣ цвѣтенія скручены и согнуты внизъ. Завязь верхняя 4-хлопастная, 4-хгнѣздная, съ однимъ столбикомъ, оканчивающимся 2-храздѣльнымъ рыльцемъ. Плодъ по созрѣваніи распадается на остро-трехгранные орѣшки. Цвѣтетъ лѣтомъ. Растетъ на пустыряхъ, сорныхъ мѣстахъ и около дорогъ. Травой его, пчеловоды вытирають улья; мѣстами изъ травы варять щи, а въ Калужской губерніи крестьяне мажутъ ею сапоги вмѣсто дегтя. (Р и с. 240.)

МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНІЕ. Пустырникъ обыкновенный употребляется въ народной медицинѣ: трава—отъ бѣшенія сердца, тяжести желудка, катарра легкихъ, кашля (въ Калужск. губ.), отваръ корня—отъ кровотеченій (Казанск. губ.), припарки корня—отъ ломоты въ костяхъ (Подольск. губ.), отваръ—отъ боли подъ ложечкой вслѣдствіе дурного пищеваренія (Тверск. губ.). Отваромъ обмываютъ раны животнымъ. Для приготовленія отвара берутъ горсть ($\frac{1}{2}$ унціи, т. е. 15,0 грм.) травы, заливають 8-ю унціями (240,0 грм.) воды, кипятятъ, выжимають; отваръ принимаютъ нѣсколько разъ въ день по 2 стол. ложки. То-же количество травы заливають и бѣлымъ виномъ.

Пустырнякъ, см. Пустырникъ обыкновенный (*Leonorus Car-diasa* L.)

Путикъ, см. Куколь (*Lychnis Githago* Scop.).

Путикъ, см. Подорожникъ большой (*Plantago major* L.).

Путикъ, см. Подорожникъ средній (*Plantago media* L.).

Путикъ, см. Ленъ дикій (*Linaria vulgaris* Mill.).

Путникъ } см. Подорожникъ большой (*Plantago ma-*
Путничное листье } *jor* L.).

Путча, см. Дягиль лекарственный (*Angelica Archangelica* L.).

Пухарецъ полевой, см. Репашокъ обыкновенный (*Agrimonia Eupatorium* L.).

Пухлецъ, см. Кошачьи лапки (*Antennaria dioica* Gärtn.).

Пухлина, см. Пушица обыкновенная (*Eriophorum polistachium* L.).

Пухлякъ, см. Волчье лыко (*Daphne Mezereum* L.).

Пухлянка, см. Одуванчикъ лекарственный (*Taraxacum Dens Leonis* Desf.).

Пухлянка, см. Кирказонъ обыкновенный (*Aristolochia Clematidis* L.).

Пухлятика, см. Вишня жидовская (*Physalis Alkekengi* L.).

Пуховая трава, см. Клеверъ нашенный, или кошачій (*Trifolium arvense* L.).

Пуховикъ, см. Сушеница лѣсная (*Gnaphalium silvaticum* L.).

Пуховикъ боровой, см. Золотая розга (*Solidago Virgaurea* L.).

- Пуховникъ, см. Колючникъ безстебельный (*Carlina subacaulis* Dc.).
- Пуховка, см. Сушенница болотная (*Gnaphallium uliginosum* L.).
- Пуховка, см. Золотая розга (*Solidago Virgaurea* L.).
- Пуховка, см. Рогоза узколистная (*Typha angustifolia* L.).
- Пуховка, см. Рогоза широколистная (*Typha latifolia* L.).
- Пуховка-трава, см. Одуванчикъ лекарственный (*Taraxacum Dens Leonis* Desf.).
- Пуховки, см. Пушица обыкновенная (*Eriophorum polystachium* L.).
- Пуховникъ, см. Колючникъ обыкновенный (*Carlina vulgaris* L.).
- Пуховникъ, см. Колючникъ безстебельный (*Carlina subacaulis* Dc.).
- Пуховникъ, см. Иванъ-чай (*Epilobium angustifolium* L.).
- Пуховникъ, см. Мелколенестникъ ѣдкій (*Erigeron acris* L.).
- Пуховникъ, см. Олеандръ (*Nerium Oleander* L.).
- Пухоносъ } см. Пушица обыкновенная (*Eriophorum polystachium* L.).
- Пухопырей }
- Пухотѣлъ, см. Борецъ синий (*Aconitum Napellus* L.).
- Пухъ, см. Метлица полевая (*Agrostis Spica Ventii* L.).
- Пухъ, см. Кошачьи лапки (*Antennaria dioica* Sarn.).
- Пухъ, см. Земляные орѣшки (*Spiraea Filipendula* L.).
- Пухъ } см. Пушица обыкновенная (*Eriophorum polystachium* L.).
- Пухъ заячій }
- Пухъ-трава, см. Метлица полевая (*Agrostis Spica Ventii* L.).
- Пухъ травяной, см. Пушица обыкновенная (*Eriophorum polystachium* L.).
- Пучики, см. Жабникъ пашенный (*Filago arvensis* L.).
- Пучка, см. Борщевикъ обыкновенный (*Heracleum Sphondylium* L.).
- Пучка, см. Борщевикъ сибирскій (*Heracleum sibiricum* L.).
- Пучка ревневая, см. Ревень французскій (*Rheum undulatum* L.).
- Пучки, см. Дягиль лѣсной (*Angelica silvestris* L.).
- Пучки, см. Борщевикъ сибирскій (*Heracleum sibiricum* L.).
- Пучки, см. Борщевикъ обыкновенн. (*Heracleum Sphondylium* L.).
- Пучки, см. Щавель обыкновенный (*Rumex Acetosa* L.).
- Пучки вороньи, см. Щавель рѣчной (*Rumex Hydrolapathum* Huds.).
- Пушаникъ, см. Ястребника зонтичная (*Hieracium umbellatum* L.).
- Пушекъ бѣлый, см. Козелецъ приземистый (*Scorzonera humilis* L.).
- Пушекъ отъ червей, см. Пикульникъ длинно-цвѣтный (*Galeopsis Ladanum* L.).
- Пушекъ полевой, см. Гравилатъ прямой (*Geum strictum* Ait.).
- Пушица, см. Пушица обыкновенная (*Eriophorum polystachium* L.).
- Пушица влагалищная (*Eriophorum vaginatum* L.). Прострѣлъ бѣлый (Вят.), Котокъ (Нижег.), кромѣ общихъ названій съ пушицей обыкновенной. Походить на пушицу обыкновенную (*Eriophorum polystachium* L.), но стебель несетъ на верхушкѣ только одинъ колосокъ. Сѣмянный пухъ всѣхъ видовъ можетъ быть употребляемъ, какъ хлѣбчатая бумага и перья.
- Пушица круглая, см. Одуванчикъ лекарственный (*Taraxacum Dens Leonis* Desf.).

Пушица обыкновенная (*Eriophorum polystachium* L.). Бѣлоголовникъ (Вор.). Бѣлоголовка, Бѣлоголовица, Бѣлоголовецъ. (Ниж.), Бѣлоука (Ниж.), Бѣлка (Арх.), Болотный ленъ, Болотникъ, Пухъ, Пухъ травяной, Пухъ заячій. Пушки заячьи, Пушица (Двиг., Вор., Моск.), Пушля (Пск., Твер.), Пухоносъ, Пуховки (Черн.), Пушокъ, Пушникъ (Тв.), Пухопырей, Пырейникъ колосистый, Пырейникъ пушистый, Пошки. Многолѣтнее травянистое растеніе изъ семейства «осоковыхъ» (*Cyperaceae* Juss.), распространенное почти во всей Европѣ и обыкновенное въ Россіи. Стебель гладкій, во время цвѣтенія всего отъ 2½—3½ вершк., а позднѣе выш. до 7—9 вершк. Листья линейные, болѣе или менѣе 3-хгранные. Цвѣты обоополовые, въ колоскахъ, сидящихъ на длинныхъ ножкахъ и сгученныхъ на верхушкѣ стебля; колоски сперва прямостоящіе, а потомъ повислые. Въ составъ каждаго колоска входитъ нѣсколько пленокъ (прицвѣтныхъ чешуй), прикрывающихъ другъ друга на подобіе черепицы, расположенныхъ спирально и заключающихъ въ пазухѣ по одному цвѣтку. Околоцвѣтникъ состоитъ изъ многочисленныхъ короткихъ волосковъ, которые послѣ цвѣтенія значительно удлиняются, вѣдствие чего колосокъ принимаетъ видъ пушистой кисточки бѣлаго цвѣта. Тычинокъ 3; завязь одногнѣздная, съ однимъ столбикомъ и 3-мя нитевидными рыльцами. Плодъ—орѣшекъ. Цвѣтетъ весной. Растетъ на торфяныхъ болотахъ. (Табл. XXXIX, фиг. 221 и 222.)

Различаютъ три разновидности пушицы обыкновенной:

1. **Пушица тонкая** (*Eriophorum gracile* Koch.), съ 3-хграннымъ стеблемъ, узколинейными, 3-хгранными листьями и шероховатыми пушистыми ножками колосковъ.
2. **Пушица узколиственная** (*Eriophorum angustifolium* Roth.), съ цилиндрическимъ стеблемъ, узко-линейными, желобчатыми, наверху 3-хгранными листьями и вполне гладкими ножками колосковъ.
3. **Пушица широколистная** (*Eriophorum latifolium* Hoppe)—съ 3-хграннымъ стеблемъ, плоскими, широко-линейными, наверху 3-хгранными листьями и шероховатыми ножками колосковъ.

Пушка, см. Дягиль лекарственный (*Angelica Archangelica* L.).

Пушки, см. Мелколенестникъ бѣлый (*Erigeron acris* L.).

Пушки, см. Одуванчикъ лекарственный (*Taraxacum Dens Leonis* Desf.).

Пушки, см. Клеверъ пашенный, или кошачій (*Trifolium arvense* L.).

Пушки заячьи

Пушникъ } см. Пушица обыкновенная (*Eriophorum polystachium* L.).

Пушнякъ

Пушокъ

Пушникъ, см. Иванъ-чай (*Epilobium angustifolium* L.).

Пхиновникъ

Пхиховникъ

Пховникъ

} см. Кирказонъ обыкновенный (*Aristolochia Clematidis* L.).

- Пчелиная трава, см. Сиянькъ красный (*Echium rubrum* L.).
- Пчелиная трава, см. Шандра обыкновенная (*Eischooltzia cristata* Willd.).
- Пчелиная трава, см. Мелисса лекарственная (*Melissa officinalis* L.).
- Пчелолоубъ, см. Душица обыкновенная (*Origanum vulgare* L.).
- Пчельникъ, см. Кадило пахучее (*Melittis melissophyllum* L.).
- Пчельникъ-трава, см. Маточникъ (*Dracoscephalum moldavica* L.).
- Пчельникъ-трава, см. Мелисса лекарственная (*Melissa officinalis* L.).
- Пчельный листь, см. Кадило пахучее (*Melittis melissophyllum* L.).
- Пшенець, см. Плевель многолѣтній, или Рафграссъ англійскій (*Lolium perenne* L.).
- Пшеница, см. Пшеница обыкновенная (*Triticum vulgare* Vill.).
- Пшеница бѣлая, см. Кукуруза обыкновенная (*Zea Mays* L.).
- Пшеница дикая, см. Рисъ канадскій (*Zizania aquatica* L.).
- Пшеница обыкновенная (*Triticum vulgare* Vill.). Пшеница, Пшено, Пшеница русская. Проспуха, Гирка (безусая), Усатка, Озимница, Ярица. Однолѣтнее (яровая) и двулѣтнее (озимая) травянистое растение изъ семейства «злаковыхъ» (*Gramineae* Juss.), принадлежащее къ числу важнѣйшихъ хлебоныхъ растений; въ Россіи она воздѣлывается приблизительно до 60 град. сѣв. шир. Стебель выш. 14—30 вершк. Колосъ плотный, 4-х-гранный, съ гибкимъ (но ломкимъ) стержнемъ. Колоски сидятъ на выступахъ стержня поодиоцкѣ и содержать по 3—5 цвѣт-ковъ, изъ которыхъ только 2—3 даютъ зерна. Створки коло-сковъ яйцевидныя, широкія, вздутыя, на верхушкѣ притуплен-ныя и снабженныя короткимъ, широкимъ зубцомъ. Наружная пленка плодущихъ цвѣт-ковъ то съ остью, то безъ ости, смотря по сорту. Зрѣлыя зерновки легко вываливаются изъ плесокъ. Цвѣтеть лѣтомъ. Разводится въ многочисленныхъ сортахъ, ко-торыя дѣлятся на гирки, усатки, ежевки и кандіи. (Табл. XXXIX, фиг. 218 и рис. 241.)
- Пшеница черная, см. Иванъ да Марья (*Metamyrum nemoro- sum* L.).
- Пшеница шишковая) см. Кукуруза обыкновенная (*Zea*
Пшеничка) *Mays* L.).
- Пшенка, см. Подмаренникъ желтый (*Galium verum* L.).
- Пшенка, см. Одуванчикъ лекарственный (*Taraxacum dens Leonis* Desf.).
- Пшенка, см. Кукуруза обыкновенная (*Zea Mays* L.).
- Пшено, см. Просо настоящее (*Panicum miliaceum* L.).
- Пшено бухарское, см. Дурра (*Sorghum vulgare* L.).
- Пшено нѣмецкое, см. Рисъ посѣвной (*Oryza sativa* L.).
- Пшено полевое, см. Просо колосистое (*Panicum Crus Galli* L.).
- Пшено сарачинское, см. Рисъ посѣвной (*Oryza sativa* L.).
- Пшено солнечное, см. Воробейникъ лекарственный (*Lithosper- mum officinale* L.).

Пшено турецкое, см. Перловникъ поникшій (*Melica nutans* L.).

Пшено турецкое, см. Кукуруза обыкновенная (*Zea Mays* L.).

Пшинка, см. Кукуруза обыкновенная (*Zea Mays* L.).

Пшонка } см. Чистякъ (*Ficaria ranunculoides* Moench.).

Пшонка, см. Кукуруза обыкновенная (*Zea Mays* L.).

Пшонкинъ перловый, см. Перловникъ поникшій (*Melica nutans* L.).

Пятилистникъ }
Пяти-перстень } см. Гусиная лапка (*Potentilla anserina* L.).
Пятиперстникъ }

Пыжикъ, см. Дождевикъ шиловатый (*Lycoperdon gemmatum* Batsch.).

Пыжма }
Пыжмо } см. Пижма (*Tanacetum vulgare* L.).

Пыжь, см. Рогоза широколистная (*Typha latifolia* L.).

Пылевикъ, см. Дождевикъ шиловатый (*Lycoperdon gemmatum* Batsch.).

Пыльцеголовникъ, см. Пыльцеголовникъ красный (*Cephalanthera rubra* Rich.).

Пыльцеголовникъ красный (*Cephalanthera rubra* Rich.).

Дремликъ, Прострѣлъ (Могил.), Пыльцеголовникъ, Лисье ядро красное. Многолѣтнее травянистое растение изъ семейства «орхидныхъ» (*Orchidaceae* Juss.), распространенное почти по всей Европѣ, въ западной, средней, юго-западной Россіи, въ Крыму, на Кавказѣ и Уралѣ. Стебель выш. 7—14 вершк., съ ланцетовидными острыми листьями. Цвѣтки пурпурово-красные, собраны рѣдкимъ колосомъ. Прицвѣтники короче цвѣтовъ. Листочки околоцвѣтника заостренные, сложены продолговатымъ колоколомъ. Одинъ изъ внутреннихъ листочковъ образуетъ узкую бѣлую губу. Тычинка одна; нить ея срастается съ столбикомъ завязи въ одну колонку; пылевцы массы порошковатыя. Завязь нижняя одногнѣздная, пушистая, скрученная. Плодъ—коробочка, сидячая и вверхъ стоячая. Цвѣтетъ лѣтомъ. Растетъ обыкновенно въ лѣсахъ, главнымъ образомъ на известковой почвѣ. (Рис. 242.)

Пыльцеголовникъ крупноцвѣтный (*Cephalanthera grandiflora* Bab.). Многолѣтнее травянистое растение изъ семейства «орхидныхъ» (*Orchidaceae* Juss.), распространенное въ средней Европѣ и изрѣдка встрѣчающееся въ Литвѣ, въ привислянскихъ губерніяхъ, въ юго-западной Россіи, въ Крыму и на Кавказѣ. Листья яйцевидно-заостренные, съ рѣзко-выдающимися жилками. Крупные молочно-бѣлые цвѣты собраны рѣдкимъ колосомъ. Прицвѣтники длиннѣе цвѣтовъ. Листочки околоцвѣтника (3 внутреннихъ и 3 наружныхъ) сложены колоколомъ; наружные—тупые, овальные, длиннѣе внутреннихъ; одинъ изъ послѣднихъ образуетъ округлую, съ желтымъ пятномъ, губу. Тычинка одна, срастается съ столбикомъ завязи въ одну колонку. Завязь нижняя одногнѣздная, скрученная, голая. Плодъ—сидя-

чая, вверхъ стоящая коробочка. Цвѣтеть въ маѣ и въ юнѣ.

Растетъ въ рощахъ.

Пыреекъ, см. Пырей ползучій (*Triticum repens* L.).

Пыреечикъ, см. Тимофеевка (*Phleum pratense* L.).

Пырей, см. Поррей (*Allium Porrum* L.).

Пырей, см. Лисохвостъ луговой (*Alopecurus pratensis* L.).

Пырей, см. Тростникъ обыкновенный (*Arundo Phragmites* L.).

Пырей, см. Костеръ безостный (*Bromus inermis* Leyss.).

Пырей, см. Вѣйникъ наземный (*Calamagrostis epigeios* Roth.).

Пырей, см. Иванъ-чай (*Epilobium angustifolium* L.).

Пырей, см. Канарейникъ тростниковый (*Phalaris arundinacea* L.).

Пырей, см. Тимофеевка (*Phleum pratense* L.).

Пырей, см. Мятликъ обыкновенный (*Poa trivialis* L.).

Пырей, см. Пырей ползучій (*Triticum repens* L.).

Пырей болотный, см. Просо колосистое (*Panicum Crus Gal-*
ii L.).

Пырей болотный, см. Триостренникъ болотный (*Triglochin pa-*
lustre L.).

Пырей большой, см. Костеръ безостный (*Bromus inermis* L.).

Пырей водяной, см. Ежеголовка вѣвистая (*Sparganium ramo-*
sum L.).

Пырей гишпанскій, см. Поррей (*Allium Porrum* L.).

Пырей житникъ, см. Пырей ползучій (*Triticum repens* L.).

Пырей красный, см. Осока мохнатая (*Carex hirta* L.).

Пырей луговой, см. Лисохвостъ луговой (*Alopecurus praten-*
sis L.).

Пырей луговой, см. Тростникъ обыкновенный (*Arundo Phrag-*
mites L.).

Пырей луговой, см. Ежа сборная (*Dactylis glomerata* L.).

Пырей осечный, см. Осока мохнатая (*Carex hirta* L.).

Пырей ползучій (*Triticum repens* L. sin. *Agropyrum repens*).

Фармацевтическое названіе: Gramen, Gramen album s. caulinum.

Бороноволоть (Тв., Преобр.), Гришиность (Ниж.), Житвиць (Могил.),

Житець (Орл.), Собачій зубъ, въ Моск. губ. корни—Понырѣ,

Нырокъ, а трава—Оржанецъ, Пырей, Пырій, Пірій (Малор.), Пи-

рей, Пыреекъ (Ниж.), Пырникъ, Пырникова борода (Мог.),

Пырей житникъ (Мог.), Ржанецъ (Олм.), Ржанъ (Нижег.), Тре-

ста (Пек.). Трудно искореняемая многолѣтняя сорная трава изъ

семейства «злаковыхъ» (*Gramineae* Juss.), распространенная по

всей Европѣ и весьма обыкновенная въ Россіи, съ длинными

ползучими побѣгами. Листья плоскіе, на верхней сторонѣ остро-

шероховатые. Колосъ двурядный, съ сплюснутыми многоцвѣтко-

выми колосками, сидящими поодиночкѣ на выступахъ стер-

жня. Створки колосковъ узкія, ланцетовидныя; наружныя цвѣ-

точные пленки безъ ости или съ короткою (короче пленки)

остью. Цвѣтеть лѣтомъ. Растетъ на поляхъ, лугахъ, около жи-

лищъ и между кустарниками. Хорошая кормовая трава.

МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНІЕ. Корни растенія даются въ на-
родной медицинѣ внутрь, какъ кровоочистительное средство.

Пырей пояснишный, см. Плевель многолѣтний, или Райграссъ англійскій (*Lolium perenne* L.).

Пырей пьянишникъ, см. Плевель одуряющій (*Lolium temulentum* L.).

Пырей собачій (*Triticum sativum* L.). Муравьиная трава. Многолѣтняя трава изъ семейства «злаковыхъ» (*Gramineae* Juss.), распространенная почти во всей Европѣ, въ средней, юго-западной Россіи, на Кавказѣ, Уралѣ и Алтаѣ. Походитъ на пырей ползучій (описание см. выше), но листья его съ обѣихъ сторонъ остро-шероховатые и ости длиннѣе пленокъ. Цвѣтетъ лѣтомъ. Растетъ въ лѣсахъ.

Пырей столбоватый, см. Тимофеевка (*Phleum pratense* L.).

Пырей чесночный, см. Поррей (*Allium Porrum* L.).

Пырейникъ колосистый } см. Пушица (*Eriophorum polystachium* L.).

Пырейникъ пушистый } *chium* L.).

Пыренка, см. Птицемлечникъ зонтичный (*Ornithogalum umbellatum* L.).

Пырецъ луговой, см. Костеръ безостный (*Bromus inermis* L.).

Пырій, см. Райграссъ франц. (*Arrhenatherum avenaceum* Beauv.).

Пырій, см. Пырей ползучій (*Triticum repens* L.).

Пырникова борона, см. Пырей ползучій (*Triticum repens* L.).

Пырникъ, см. Звѣздчатка большая (*Stellaria Holostea* L.).

Пырникъ, см. Пырей ползучій (*Triticum repens* L.).

Пырѣ, см. Лисохвостъ луговой (*Alopecurus pratensis* L.).

Пырѣ, см. Горичникъ болотный (*Peucedanum palustre* Moench.).

Пышечка } см. Просвирникъ обыкновенный (*Malva rotundifolia* L.).

Пышечникъ } *disfolia* L.).

Пыщалка, см. Аиръ обыкновенный (*Acorus Calamus* L.).

Пьяная трава, см. Ленъ дикій (*Linaria vulgaris* Mill.).

Пьяная трава, см. Рододендръ ржавчинный (*Rhododendron ferrugineum* L.).

Пьяная трава, см. Подбѣлъ (*Andromeda polifolia* L.).

Пьяная ягода, см. Голубика (*Vaccinium uliginosum* L.).

Пьяника } см. Голубика (*Vaccinium uliginosum* L.).

Пьяница } *disfolia* L.).

Пьяница, см. Очитокъ острый (*Sedum acre* L.).

Пьянишникъ, см. Рододендръ ржавчинный (*Rhododendron ferrugineum* L.).

Пьянишникъ, см. Азалея желтая (*Azalea pontica* L.).

Пьянишникъ бороной, см. Рододендръ даурскій (*Rhododendron dahuricum* L.).

Пьянишница } см. Голубика (*Vaccinium uliginosum* L.).

Пьянка } *disfolia* L.).

Пьяный хлѣбъ, см. Плевель одуряющій (*Lolium temulentum* L.).

Пѣвники дубняковые, см. Купена лекарственная (*Convallaria Polygonatum* L.).

Пѣвникъ, см. Касатикъ водяной (*Iris pseudacorus* L.).

Пѣвникъ, см. Чина весенняя (*Orobis vernus* L.).

- ПѢВНИКЪ БОЛОТНЫЙ, см. Ятрышникъ шлемовидный (*Orchis militaris* L.).
- ПѢНА-ЛУПЕНА, см. Купена лекарственная (*Convallaria Polygonatum* L.).
- ПѢСТУНЬЕ, см. Хвощъ полевой (*Equisetum arvensis* L.).
- ПѢТИШНИКЪ, см. Посконникъ конопляный (*Eupatorium cannabinum* L.).
- ПѢТУШИННИКЪ, см. Погребокъ обыкновенный (*Rhinanthus Crista Galli* L.).
- ПѢТУШКИ, см. Бѣлокрыльникъ болотный (*Calla palustris* L.).
- ПѢТУШКИ, см. Купена лекарственная (*Convallaria Polygonatum* L.).
- ПѢТУШКИ, см. Колокольчикъ крапиволистный (*Campanula Trachelium* L.).
- ПѢТУШКИ, см. Кокунникъ (*Gymnadenia conopsea* L.).
- ПѢТУШКИ, см. Пиккульникъ длинноцвѣтный (*Galeopsis versicolor* L.).
- ПѢТУШКИ, см. Марьянникъ гребенчатый (*Melampyrum cristatum* L.).
- ПѢТУШКИ, см. Чина весенняя (*Orobus vernus* L.).
- ПѢТУШКИ, см. Макъ-самосѣйка (*Paraver Rhoeas* L.).
- ПѢТУШКИ СИВІЕ, см. Соколій перелетъ (*Gentiana cruciata* L.).
- ПѢТУШНИКЪ, см. Погребокъ обыкновенный (*Rhinanthus Crista Galli* L.).
- ПѢТУШНИКЪ, см. Эспарсеть кормовой (*Onobrychis sativa* Lam.).
- ПѢТУШНИКЪ, см. Пиккульникъ длинноцвѣтный (*Galeopsis Ladanum* L.).
- ПѢТУШОКЪ, см. Погребокъ обыкновенный (*Rhinanthus Crista Galli* L.).
- ПѢТУШОКЪ, см. Касатикъ водяной (*Iris pseudacorus* L.).
- ПЯСЛИКЪ, см. Пасленъ сладкогорькій (*Solanum dulcamara* L.).
- ПЯТЕРНИКЪ, см. Лопчатка ползучая (*Potentilla reptans* L.).
- ПЯТИЛИСТКА-КУПЕНА, см. Купена лекарственная (*Convallaria Polygonatum* L.).
- ПЯТИЛИСТНИКЪ, см. Лопчатка ползучая (*Potentilla reptans* L.).
- ПЯТИЛИСТНИКЪ, см. Лопчатка серебристая (*Potentilla argentea* L.).
- ПЯТИЛИСТНИКЪ БОЛЬШОЙ, см. Сабельникъ болотный (*Comarum palustre* L.).
- ПЯТИПАЛИЧНИКЪ, см. Сабельникъ болотный (*Comarum palustre* L.).
- ПЯТИПАЛИЧНИКЪ, см. Кукушкины слезки (*Orchis maculata* L.).
- ПЯТИПАЛОШНАЯ ТРАВА, см. Сабельникъ болотный (*Comarum palustre* L.).
- ПЯТИПАЛОШНАЯ ТРАВА, см. Кукушкины слезки (*Orchis maculata* L.).
- ПЯТИПАЛОШНИКЪ, см. Жабникъ пашенный (*Filago arvensis* L.).
- ПЯТИПАЛОШНИКЪ, см. Соколій перелетъ (*Gentiana cruciata* L.).
- ПЯТИПАЛОШНИКЪ, см. Лопчатка ползучая (*Potentilla reptans* L.).

- Пятипалошникъ**, см. Лапчатка серебристая (*Potentilla argentea* L.).
- Пятиперстная трава**, см. Сабельникъ болотный (*Comarum palustre* L.).
- Пятиперстникъ**, см. Лапчатка ползучая (*Potentilla reptans* L.).
- Пятлина**, см. Рпсъ канадскій (*Zizania aquatica* L.).
- Пятюнникъ**, см. Валериана лекарственная (*Valeriana officinalis* L.).

Р.

- Радовикъ**, см. Кровохлебка лекарственная (*Sanguisorba officinalis* L.).
- Радость-трава**, см. Цминъ (*Helychrisum arenarium* DC.).
- Радость-тразка**, см. Горошекъ мышиный (*Vicia Cracca* L.).
- Развей**, см. Вьюнокъ заборный (*Convolvulus sepium* L.).
- Развивная**, см. Гречиха птичья, гречиха-спырьшъ (*Polygonum aviculare* L.).
- Разгозилъ**, см. Короставникъ полевой (*Scabiosa arvensis* L.).
- Разгуляй**, см. Василестникъ желтый (*Thalictrum flavum* L.).
- Раздай-зелье**, см. Просвирникъ курчавый (*Malva crispa* L.).
- Раздулла**, см. Укропъ конскій (*Oenanthe Phellandrium* L.).
- Разлапушникъ**, см. Сонъ-трава (*Anemone patens* L.).
- Разлогъ**, см. Ряска маленькая (*Lemna minor* Schl.).
- Разломъ**, см. Коровякъ черный (*Verbascum nigrum* L.).
- Разметка-трава**, см. Торица полевая (*Spergula arvensis* L.).
- Разнолепестка**, см. Разнолепестка горькая (*Ibris amara* L.).
- Разнолепестка горькая** (*Ibris amara* L.). Перечникъ, Тарасникъ. Однолѣтнее травянистое растение изъ семейства «крестоцвѣтныхъ» (*Cruciferae* Juss.), выш. $3\frac{1}{2}$ —7 вершк., распростр. въ средней Европѣ и изрѣдка встрѣчающееся въ юго-западной Россіи. Листья продолговатые, по краямъ съ немногими крупными, тупыми зубцами. Вѣтвы мелкіе цвѣты расположены верхушечными кистями, собранными въ одно общее цитковидное соцвѣтіе. Чашечка 4-хлестная, вѣнчикъ 4-хлепестный; два наружные лепестка у краевыхъ цвѣтовъ крупнѣе 2-хъ остальныхъ. Плодъ—узкоперегородчатые стручки, округлые, на верхушкѣ выемчатые; створки лодочкообразныя, съ узкимъ треугольнымъ крыломъ на спинѣ. Цвѣтетъ лѣтомъ. Встрѣчается изрѣдка на сорныхъ мѣстахъ. (Рис. 243.)
- Разплетъ**, см. Тысячелистникъ обыкновенный (*Achillea Millefolium* L.).
- Разрывъ-трава**, см. Живучка ползучая (*Ajuga reptans* L.).
- Разрывъ-трава**, см. Недотрога желтая (*Impatiens noli me tangere* L.).
- Разрѣзъ-трава**, см. Лапчатка серебристая (*Potentilla argentea* L.).
- Разстрѣль**, см. Горечавка крупная (*Gentiana pneumonanthe* L.).
- Разстрѣль**, см. Касатикъ водяной (*Iris pseudacorus* L.).

Разсрѣлъ, см. Окопникъ лекарственный (*Symphytum officinale* L.).

Разсрѣльная, см. Золотая розга (*Solidago Virgaurea* L.).

Разѣдъ, см. Зимовникъ осенній (*Colchicum autumnale* L.).

Разумъ бабій, см. Спаржа обыкновен. (*Asparagus officinalis* L.).

Разумъ бабій, см. Качимъ стѣнной (*Gypsophila paniculata* Led.).

Разынки, см. Виноградъ обыкновенный (*Vitis vinifera* L.).

Раина, см. Тополь пирамидальный (*Populus pyramidalis* Spach.).

Рай-дерево, см. Кленевина (*Ricinus communis* L.).

Рай-дерево, см. Тополь пирамидальный (*Populus pyramidalis* Spach.).

Рай-дерево, см. Тополь душистый (*Populus balsamifera* L.).

Рай-дерево, см. Скомнія (*Rhus Cotinus* L.).

Рай-цвѣтъ, см. Пижма (*Tanacetum vulgare* L.).

Райграссъ англійскій (*Lolium perenne* L.). Конкаль, Плевель,

Плевель многолѣтній. Пшенець, Куколь мышій трава, Пырей поясничный, или поясничникъ, Житвица (Могил.). Многолѣтняя трава, образующая дерновинки, изъ семейства «злаковыхъ» (*Gramineae* Juss.), распространенная почти во всей Европѣ и во всей Европейской Россіи. Стебель приподнимающійся, гладкій, выш. 4—22½ вершк. Листья линейные, молодые сложены вдоль. Колоски многоцвѣтковые, съ 8—10 цвѣтками, сплюснутые, собраны рѣдкимъ колосомъ, сидятъ на выступахъ стержня поодиночкѣ и обращены къ нему не широкою стороною, какъ у пшеницы, а ребромъ. Всѣ колоски, исключая верхушечнаго, снабжены только одною створкою, длина которой не достигаетъ длины колоска. Наружная цвѣточная пленка ланцетовидная острая, безъ ости. Плодь—зерновка. Растетъ на лугахъ, поляхъ и около дорогъ. Хорошая кормовая трава, пригодная для газоновъ въ садахъ и паркахъ. (Табл. XXXVI. фиг. 201.)

Райграссъ французскій (*Avena elatior* L. sin. *Arrhenatherum avenaceum* Beauv.). Пырей (Умань), Галка овсяная (Даль). Многолѣтняя трава изъ семейства «злаковыхъ» (*Gramineae* Juss.), распространенная почти по всей Европѣ, въ западной, средней и юго-западной Россіи и на Кавказѣ. Стебель прямостоящій, выш. 14—22½ вершк. Метелка длинная, во время цвѣтенія раскидистая, потѣмъ сжатая. Колоски заключаюгъ по 2 цвѣтка: верхній—обоеполовый, съ короткою прямою остью, выходящей близъ верхушки наружной цвѣточной пленки, а нижній—тычинчатый, съ длинною кѣлочкою, внизу скрученною, остью, выступающею изъ середины спинки наружной цвѣточной пленки. Тычинкъ 3. Завязь одногнѣздная, односѣмянная, болѣею частью съ 2-мя столбиками. Плодь—зерновка. Растетъ на лугахъ. Причисляется къ числу хорошихъ кормовыхъ травъ.

Райграссъ французскій, см. Овсяница высокая (*Festuca elatior* L.).

Райское дерево, см. Кленевина (*Ricinus communis* L.).

Раквица, см. Вероника лекарственная (*Veronica officinalis* L.).

Ракита, см. Ива бѣлая (*Salix alba* L.).

Ракита, см. Черноталъ (*Salix pentandra* L.).

Ракита, см. Лоза (*Salix viminalis* L.).

Ракита-бредина, см. Ива козья (*Salix caprea* L.).

Ракита итальянская, см. Тополь пирамидальный (*Populus pyramidalis* Sprach.).

Ракитникъ, см. Облѣпиха обыкновенная (*Hippophaë rhamnoides* L.).

Ракитникъ, см. Ива ушастая (*Salix aurita* L.).

Ракитникъ, см. Лоза (*Salix viminalis* L.).

Ракитникъ, см. Спирея городчатолѣстная (*Spiraea crenata* L.).

Ракитникъ, см. Облѣпиха обыкновенная (*Hippophaë rhamnoides* L.).

Ракитникъ золотой дождь (*Cytisus Laburnum* L.). Волгочѣтѣе дерево, вѣроятно: Волкоцвѣтъ, Акація красная (у сад. на югѣ). Кустарникъ или дерево, выш. до 3 саж., изъ семейства «мотыльковыхъ» (*Papilionaceae* L.), распространенный въ горахъ южной Европы, съ тройчатыми листьями и лимонно-желтыми цвѣтами въ висячихъ кистяхъ. Чашечка колокольчатая, съ верхней двузубчатой и нижней цѣльной губой. Вѣнчикъ мотыльковый, 5-тилепестный: верхній лепестокъ образуетъ флагъ, 2 боковые—крылья, нижнѣе 2, сросшіеся вмѣстѣ—тупую лодочку). Тычинокъ 10, съ нитями, сросшимися въ трубочку; пыльники поочередно одни короче, капающіеся, другіе длиннѣе и прикрѣплены основаніемъ. Столбикъ шиловидный, съ головчатымъ рыльцемъ. Плодъ—серебристо-пушистые бобы, двустворчатые, сжатые съ боковъ, продолговатые; швы ихъ, въ особенности верхній, утолщенные. Цвѣтетъ весной. Разводится въ садахъ, какъ декоративный кустъ. Сѣмена ядовиты. (Табл. XXXIX, фиг. 216.)

Раковникъ, см. Сабельникъ болотный (*Comarum palustre* L.).

Раковыя шейки, см. Горлець (*Polygonum Bistorta* L.).

Ракуцки, см. Ханьки (*Cucurbita ovifera* L.).

Ракъ, см. Иванъ-чай (*Epilobium angustifolium* L.).

Ракъ-трава, см. Горлець, раковыя шейки (*Polygonum Bistorta* L.).

Раменный корень, см. Молочай лозный (*Euphorbia virgata* L.).

Рамень, см. Ромашка (*Matricaria Chamomilla* L.).

Раминовъ корень, см. Молочай лозный (*Euphorbia virgata* L.).

Рамонъ, см. Пупавка красильная (*Anthemis tinctoria* L.).

Рамонъ, см. Подмаренникъ желтый (*Galium verum* L.).

Рамонъ

Рамонъ собачій } см. Ромашка собачья (*Maruta Cotula* Dc.).

Ранникъ, см. Румянка лекарственная (*Anchusa officinalis* L.).

Ранникъ, см. Василекъ луговой (*Centaurea jacea* L.).

Ранникъ, см. Ландышъ майскій (*Convallaria majalis* L.).

Ранникъ, см. Синякъ обыкновенный (*Echium vulgare* L.).

Ранникъ, см. Соколій перелетъ (*Gentiana cruciata* L.).

Ранникъ, см. Вербейникъ обыкновен. (*Lysimachia vulgaris* L.).

Ранникъ, см. Чина весенняя (*Orobis vernus* L.).

Ранникъ, см. Вороній глазъ (*Paris quadrifolia* L.).

Ранникъ, см. Сивецъ (*Scabiosa succisa* L.).

- Ранникъ**, см. Козелецъ приземистый (*Scorzonera humilis* L.).
- Ранникъ**, см. Норичникъ водяной (*Scrophularia aquatica* L.).
- Ранникъ**, см. Норичникъ узловатый (*Scrophularia nodosa* L.).
- Ранникъ**, см. Ласточникъ обыкновенный (*Vincetoxicum officinale* Moench.).
- Ранникъ**, см. Фиалка собачья (*Viola canina* L.).
- Ранникъ луговой**, см. Вербейникъ обыкновенный (*Lysimachia vulgaris* L.).
- Ранникъ синий**, см. Синякъ обыкновенный (*Echium vulgare* L.).
- Ранныкъ**, см. Мать и мачиха (*Tussilago Farfara* L.).
- Ранняя**, см. Запникъ клубненосный (*Phlomis tuberosa* L.).
- Раповникъ**, см. Медунница (*Spiraea ulmaria* L.).
- Рапонтикъ**, см. Ослиникъ двулѣтній (*Oenothera biennis* L.).
- Рапсъ**, см. Сурѣлица (*Brassica Rapa* L.).
- Рапсъ**, см. Рапсъ озимый (*Brassica Napus olifera biennis* L.).
- Рапсъ озимый** (*Brassica Napus olifera biennis* L.). Озимая кольза, Сурѣлица, Сурѣпа, Рапсъ, Сурѣница, Свирипа. Представляетъ разновидность «брюквы» (описание см. выше), съ тонкимъ корнемъ. Разводится на кормъ скоту и называется скотскою, кормовою капустою.
- Рапсъ яровой** (*Brassica Napus olifera annua* L.). Масляничная брюква. Какъ и рапсъ озимый, представляетъ разновидность брюквы, съ тонкимъ корнемъ. Разводится, какъ маслячное растеніе, преимущественно въ западной Европѣ.
- Рапункуль**, см. Рапунцель (*Campanula Rapunculus* L.).
- Рапунцель** (*Campanula Rapunculus* L.). Колокольчикъ съѣдобный, Рапункуль. Однолѣтнее травянистое голое или короткомохнатое растеніе изъ семейства «колокольчиковыхъ» (*Campanulaceae* Juss.), распространенное въ средней и южной Европѣ, въ южной и юго-западной Россіи, съ толстымъ, мясистымъ корнемъ. Листья тупо-городчатые, нижніе—продолговатые, суженные въ короткій черешокъ, стеблевые—сидячіе, ланцетные, верхніе—линейно-ланцетные, заостренные; голубые цвѣты одиночныя, по 2—3 на короткихъ вѣточкахъ, собранныхъ узкою кистеобразною рѣдко-вѣтвистою метелкою. Чашечка глубоко-5-тираздѣльная, съ длинными линейно-шиловидными, внизу зубчатыми долями. Вѣничикъ ворончатый, болѣе или менѣе глубоко-5-тилопастный; тычинокъ 5, свободныхъ, съ расширенными при основаніи нитями. Столбикъ нитевидный, съ 3-храздѣльнымъ рыльцемъ. Завязь нижняя 3-хгнѣздная; плодъ—3-хгнѣздная коробочка, коническая, прямостоячая, раскрывающаяся по сторонамъ отверстиями. Цвѣтетъ лѣтомъ. Растетъ по дугамъ, между кустарниками и при дорогахъ. Воздѣлывается въ садахъ. Сладкіе и питательные корни прежде употреблялись въ медицину, теперь совершенно оставлены. (Табл. XXXIX, фиг. 220.)
- Рапунцель**, см. Ослиникъ двулѣтній (*Oenothera biennis* L.).
- Рапунцель**, см. Кольникъ колосистый (*Phyteuma spicatum* L.).
- Рапунцель**, см. Рапунцель обыкновенный (*Valerianella olitoria* Moench.).

Рапунцель обыкновенный (*Valerianella oleria* Moench.). Мауница. Однолѣтняя травка, выш. $2\frac{1}{2}$ —5 см., изъ семейства «валериановыхъ» (*Valerianaceae* Dc.), распространенная почти во всей Европѣ, встрѣчающаяся въ юго-западной Россіи и на Кавказѣ. Стебель вѣлообразно-развѣтвленный; листья ланцетные; цвѣты голубовато-бѣлые въ полузонтикахъ, скученныхъ головчато на концахъ развѣтвленія стебли. Чашечка съ мало-замѣтными зубчиками. Вѣнчикъ правильный, ворончатый, 5-лопастный; тычинокъ 3, прикрѣпленныхъ къ трубчкѣ вѣнчика; столбикъ нитевидный, на верхушкѣ 3-храздѣльный; завязь нижняя 3-гнѣздная, съ однимъ плодущимъ и 2-мя пустыми гнѣздами. Плодъ сухой, односемянный. Цвѣтетъ въ началѣ лѣта. Растетъ на поляхъ и на сорныхъ мѣстахъ. Листья употребляются въ пишу, какъ салатъ.

Ряска, см. Ряска маленькая (*Lemna minor* Schl.).

Раскидникъ, см. Очитокъ острый (*Sedum acre* L.).

Расперстная трава, см. Лапчатка ползучая (*Potentilla reptans* L.).

Расперстникъ, см. Герань луговая (*Geranium pratense* L.).

Расперстница, см. Листникъ цыкутный (*Erodium cicutarium* L.).

Расперстница, см. Звѣздчатка большая (*Stellaria Holostea* L.).

Распечатная, см. Володушка золотистая (*Bupleurum aureum* Fisch.).

Распустилка, см. Конячьи лапки (*Antennaria dioica* Gärtn.).

Растеніе св. Іосифа, см. Дубровка (*Veronica Chamaedrys* L.).

Растъ, см. Кирказонъ обыкновенный (*Aristolochia Clematidis* L.).

Растъ, см. Хохлатка плотная (*Corydalis solida* Smith.).

Растъ, см. Первоцвѣтъ лекарственный (*Primula officinalis* Jacq.).

Растъ, см. Пролѣска двулистная (*Scilla bifolia* L.).

Растъ бѣлый, см. Истодъ хохлатый (*Polygala comosa* Schk.).

Растъ геозичный, см. Пролѣска двулистная (*Scilla bifolia* L.).

Растъ пегрушковый, см. Хохлатка плотная (*Corydalis solida* Smith.).

Растъ подзорунный, см. Гусятникъ желтый (*Gagea lutea* Schult.).

Растъ шпараговый, см. Петровъ крестъ (*Lathraea Squamaria* L.).

Растигоръ, см. Дубровникъ обыкновен. (*Teucrium Chamaedrys* L.).

Растиральникъ, см. Тысячелистникъ обыкновенный (*Achillea Millefolium* L.).

Растопша, см. Остропестрая трава (*Silybum Marianum* Gärtn.).

Растопырка, см. Сабельникъ болотный (*Comarum palustre* L.).

Растопырникъ, см. Короставникъ полевой (*Scabiosa arvensis* L.).

Растопыръ, см. Перецъ водяной (*Polygonum Hydropiper* L.).

Расторопша, см. Остропестрая трава (*Silybum Marianum* Gärtn.).

Растрепа, см. Правилатъ водяной (*Geum rivale* L.).

Растрогъ, см. Кольникъ колосистый (*Phyteuma spicatum* L.).

Растрогъ, см. Дубровникъ обыкновенный (*Teucrium Chamaedrys* L.).

- Расходникъ**, см. Горлицѣтъ весенній (*Adonis vernalis* L.).
- Расходникъ**, см. Толокнянка обыкновенная (*Arctostaphylos officinalis* Moench.).
- Расходникъ**, см. Копытень европейскій (*Asarum europaeum* L.).
- Расходникъ**, см. Пахучка обыкновенная (*Calamintha Clinopodium* Benth.).
- Расходникъ**, см. Будра плющевидная (*Glechoma hederacea* L.).
- Расходникъ**, см. Ленъ дикій (*Linaria vulgaris* Mill.).
- Расходникъ**, см. Просвирникъ сѣверный (*Malva borealis* Wallm.).
- Расходникъ**, см. Котовикъ кошачій (*Nepeta cataria* L.).
- Расходникъ**, см. Шлемникъ обыкнов. (*Scutellaria galericulata* L.).
- Расходникъ**, см. Золотая розга (*Solidago Virgaurea* L.).
- Расходникъ**, см. Стикта (*Silene pulmonaria* L.).
- Расходникъ**, см. Ярутка полевая (*Thlaspi arvense* L.).
- Расходникъ**, см. Дубровка (*Veronica chamaedrys* L.).
- Расходникъ большой**, см. Пулавка красильная (*Anthemis tinctoria* L.).
- Расходникъ большой**, см. Молодиъ кровельный (*Sempervivum tectorum* L.).
- Расходникъ боровой**, см. Асрагалъ солодколистный (*Astragalus glycyphyllos* L.).
- Расходникъ малый**, см. Очитокъ острый (*Sedum acre* L.).
- Расходникъ обложный**, см. Луговой чай (*Lysimachia Nummularia* L.).
- Расходникъ польный**, см. Вероника лекарственная (*Veronica officinalis* L.).
- Ратанія** (*Krameria triandra* R. P.). Кустарникъ родомъ изъ Перу и Бразиліи.

МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНІЕ. Корень его, извѣстный подъ названіемъ «*Radix Rathaniae peruviana*, *Radix Krameriae* s. *Rathaniae*», перувианской ратаніи, употребляется въ медицинѣ, какъ вяжущее средство, благодаря присутствію въ корнѣ дубильнаго вещества. Корень растенія дорогъ и можетъ быть вполне замѣненъ танниномъ. Употребляется растеніе въ случаяхъ заболѣванія слизистыхъ оболочекъ съ усиленнымъ выдѣленіемъ слизи изъ нихъ или при кровоизліціяхъ изъ слизистыхъ оболочекъ. Настойка дается внутрь по 10-ти—20-ти капель 3 — 4 раза въ день отъ поносовъ. Вытяжка ратаніи входитъ въ составъ противогеморроидальныхъ свѣчей. Чистою настойкою ратаніи или смѣшанной пополамъ съ настойкою черничныхъ орѣховъ смазываютъ десна при ихъ кровоточивости и припухлости. Толченныи корень ратаніи служитъ для приготовленія зубного порошка. Вывезена ратанія въ Европу 100 лѣтъ тому назадъ и въ первое время пользовалась большою извѣстностью среди врачей, теперь она почти что оставлена ими.

Ратафія, см. Жминла лозная (*Bitum virgatum* L.).

Рачекъ степной	} см. Горлецъ, раколюя шейки (<i>Polygonum bistorta</i> L.).
Рачешейки	
Рачики	
Рачки	

- Рашпоръ**, см. Скерда кровельная (*Crepis tectorum* L.).
- Рвотная трава**, см. Стальникъ пахучій (*Ononis hircina* Jacq.)
- Рвотный корень**, см. Копытень европейскій (*Asarum europaeum* L.).
- Рвотный корень**, см. Ипеакауана (*Cephaelis Ipecacuanha* Rich.).
- Рвотный корень полосатый**, см. Ипеакауана черная (*Psychotria emetica* Mat.).
- Ргай**, см. Кизильникъ обыкновенный (*Cotoneaster vulgaris* Lindl.)
- Рдестъ**, см. Горчакъ (*Polygonum Persicaria* L.).
- Рдестъ**, см. Рдестъ плавающая (*Potamogeton natans* L.).
- Рдестъ блестящій** (*Potamogeton lucens* L.). Водная многолѣтняя трава изъ семейства «найядовыхъ» (*Najadaceae* Benth.), съ цилиндрическимъ вѣтвистымъ стеблемъ, распространенная почти по всей Европѣ и по всей Россіи. Листья коротко-черешковые, ланцетовидные, остроконечные, по краямъ остро-шероховатые, всѣ погруженные въ воду. Цвѣтки обоюполовые, мелкіе, въ верхушечныхъ колосьяхъ на ножкахъ, наверху утолщенныхъ. Околоцвѣтникъ травянистый, 4-хлестный; пыльниковъ 4, сидящихъ при основаніи листочковъ околоцвѣтника; пестикъ состоитъ изъ 4 плодolistниковъ, съ почти сидящими 4-мя рыльцами. Плодъ состоитъ изъ нѣскольکو сжатыхъ съ боковъ костянокъ, раскрывающихся при преростаніи на спинкѣ продолговатой крышечкой. Цвѣтетъ лѣтомъ. Растетъ въ стоячихъ и медленно-текущихъ водахъ. (Р и с. 244.)
- Рдестъ бѣлый**, см. Горчакъ (*Polygonum Persicaria* L.).
- Рдестъ курчавый** (*Potamogeton crispus* L.). Многолѣтняя трава изъ семейства «найядовыхъ» (*Najadaceae* Benth.), распространенная почти во всей Европѣ и во всей Россіи. Вѣтвистое ползучее корневище выпускаетъ вѣтвистые, сплюснuto-4-хгранные, большею частью красноватые стебли. Листья линейно-продолговатые, по краямъ волнистые, мелко-пильчатые, сидячіе, съ округлымъ основаніемъ. Мелкіе обоюполовые цвѣты собраны въ верхушечныхъ короткихъ колосьяхъ, состоящихъ изъ 6—9 цвѣтковъ. Околоцвѣтникъ травянистый, 4-хлестный. Пыльниковъ 4, прикрѣпленныхъ къ основанію листочковъ околоцвѣтника. Пестикъ состоитъ изъ 4 свободныхъ плодolistниковъ съ 4-мя почти сидящими рыльцами. Плодъ-же состоитъ изъ 4-хъ костянокъ съ тупымъ килемъ на спинкѣ, снабженныхъ длиннымъ согнутымъ носикомъ. Цвѣтетъ лѣтомъ. Произрастаетъ въ стоячихъ и медленно-текущихъ водахъ. Зимуетъ помощью луковицъ, состоящихъ изъ 4—6 яйцевидныхъ, толстыхъ, гребенчато-зубчатыхъ чешуй. (Р и с. 245.)
- Рдестъ маленький** (*Potamogeton pusillus* L.). Мелкая многолѣтняя травка изъ семейства «найядовыхъ» (*Najadaceae* Benth.), распространенная почти во всей Европѣ и во всей Россіи, съ нитевиднымъ стеблемъ и узко-линейными, 3—5-тинервными, погруженными въ воду, листьями. Мелкіе обоюполовые цвѣты отъ 4—8 собраны верхушечными короткими прерванными колосьями. Околоцвѣтникъ травянистый, 4-хлестный. Пыльниковъ

4, прикрѣпленныхъ къ основанію листочковъ околоцвѣтника. Плодолистиковъ 4, съ почти сидячими рыльцами. Плодъ состоитъ изъ 4-хъ костянокъ, ромбически-обратно-яйцевидныхъ, съ короткими прямыми носикомъ. Цвѣтеть лѣтомъ. Растетъ въ рвахъ, прудахъ и болотахъ. (Р и с. 246.)

Рдестъ плавающий (*Potamogeton natans* L.). Водяная капуста Жолга плавучая, Жолга, Жилига, Водяница, Кушуръ, Рдестъ, Медвѣжье ухо. Многолѣтнее травянистое растеніе изъ семейства «найдовыхъ» (*Najadaceae* Benth.), распространенное во всей Европѣ и весьма обыкновенное въ Россіи. Стебель выш. $1\frac{1}{2}$ —3 арш., не вѣтвистый. Листья длинно-черешковые, дуго-нервные; нижніе—ланцетовидные, погружены въ воду, а верхніе—овальные, плавающие на поверхности воды. Обоеполовые цвѣты, лишенные околоцвѣтника, собраны верхушечными плотными колосьями, сидящими на длинныхъ ножкахъ. Тычинокъ 4; спавище на спинкѣ каждой изъ тычинокъ переходитъ въ чешуевидный придатокъ. Лестикъ состоитъ изъ 4 свободныхъ плодолистиковъ съ 4-мя почти сидячими рыльцами. Плодъ-же состоитъ изъ 4-хъ немного морщинистыхъ, съ тупымъ килемъ на спинкѣ, костянокъ. Цвѣтеть лѣтомъ. Растетъ въ стоячихъ и медленно-текущихъ водахъ. Корни въ Сибири употребляются въ пищу. (Р и с. 247.)

Рдестъ сквознолистный (*Potamogeton perfoliatus* L.). Многолѣтнее травянистое растеніе изъ семейства «найдовыхъ» (*Najadaceae* Benth.), распространенное во всей Европѣ и во всей Россіи. Ползучее корневище выпускаетъ длинные цилиндрическіе густо-облиственные стебли. Листья округло-яйцевидные, стеблеобъемлющіе, прозрачные, по краямъ шершавые, всѣ погруженные въ воду. Мелкіе травянистые цвѣты собраны въ маленькіе зеленоватые колосья, рѣдко болѣе $\frac{1}{4}$ вершк. длины, на ножкахъ длиннѣе листьевъ и одинаковой толщины на всемъ своемъ протяженіи. Околоцвѣтникъ 4-хлестный; пыльниковъ 4, прикрѣпленныхъ къ основанію листочковъ околоцвѣтника; плодолистиковъ 4, съ почти сидячими рыльцами. Плодъ состоитъ изъ 4-хъ костянокъ съ тупыми спинками. Цвѣтеть лѣтомъ. Растетъ въ рѣкахъ и прудахъ. (Р и с. 248.)

Ребица, см. Анисникъ цикутный (*Erodium cicutarium* L.).

Ребра Христо-вы, см. Василекъ перистый (*Centaurea Scabiosa* L.).

Ребро Адамово, см. Воронецъ колосистый (*Actaea spicata* L.).

Ребро бісозе, см. Валеріана лекарственная (*Valeriana officinalis* L.).

Ребро чертове, см. Горичникъ болотный (*Peucedanum palustre* L.).

Ребро чертове, см. Валеріана лекарственная (*Valeriana officinalis* L.).

Ребро чертово, см. Дурнишникъ колючій (*Xanthium spinosum* L.).

Ребро чорне, см. Ярутка полевая (*Thlaspi arvense* L.).

Ревенка, см. Иванъ-чай (*Epilobium angustifolium* L.).

Ревень, см. Ревень французскій (*Rheum Rhabarbarum* L.).

Ревень французскій (*Rheum Rhabarbarum* L., sin. *Rheum undulatum* L.). Многолѣтнее травянистое вѣтвистое растеніе съ толстымъ, мясистымъ корневищемъ и большими дланевидными листьями изъ семейства «Polygonaceae», родомъ изъ Сибири и Китая. Растеніе разводится и во Франціи ради своихъ корней, употребляемыхъ въ медицину. Обыкновенно въ апрѣлѣ или въ маѣ выкапываютъ корни, разрѣзываютъ ихъ на большіе куски, нанизываютъ на нитки и сушатъ. Въ торговлю ревень поступаетъ ввидѣ небольшихъ, длиною до $2\frac{1}{4}$ вершк., кусочковъ.

МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНІЕ. Корень ревеня издавна употребляется въ медицину. Произрастаетъ ревень въ Сибири, въ Туркестанѣ, на Гималайскомъ хребтѣ и въ Китаѣ. Собирается онъ и высушивается лѣтомъ. Онъ содержитъ въ себѣ слабительно-дѣйствующую катартиновую кислоту, щавелево-кислую известъ и, кромѣ того, дубильную кислоту, которая дѣйствуетъ, какъ закрѣпляющее средство. Дубильной кислоты въ ревень гораздо меньше, чѣмъ катартиновой, дѣйствіе ея сказывается не сразу, а гораздо медленнѣе и выражается въ томъ, что послѣ пріемовъ ревеня появляется склонность къ запорамъ. Послабляющія вещества ревеня переходятъ въ кровь, чѣмъ объясняется послабляющее дѣйствіе молока кормилицъ, употребляющихъ ревень. Врачи различаютъ малые и большіе пріемы ревеня.

Малые пріемы ревеня усиливаютъ аппетитъ и улучшаютъ пищевареніе, уменьшая чувство вздутія въ животѣ; они также помогаютъ отъ изжоги и обильнаго отдѣленія кислотъ въ желудкѣ. Малыми пріемами ревеня считаются пріемы отъ $\frac{1}{2}$ грана до 2-хъ, 3-хъ гранъ (0,05—0,1 грм.). Кромѣ истолченного корня, ревень принимаютъ въ формѣ спиртной или водяной настойки (*tinct. Rhei vinosa* или *tinct. extract. Rhei composit.*, *Rhei aquosa*)—сложнаго экстракта, въ составъ котораго входитъ экстрактъ сабура и яланны, и ввидѣ ревеннаго сиропа, приготовляемаго въ аптекахъ вмѣстѣ съ корицею и углекислымъ калиемъ. Настойку ревеня взрослые принимаютъ отъ 20-ти, 30-ти капель до чайной ложки 2—3 раза въ день. Хорошее соединеніе представляютъ капли элексира Гофмана съ винной настойкой ревеня и ромашки. Принятые по 20-ти капель передъ ѣдой, капли эти уменьшаютъ чувство вздутія въ животѣ и улучшаютъ аппетитъ.

Дѣтямъ ревень дается болѣею частью ввидѣ нѣсколькихъ капель чистой спиртной настойки или въ микстуру съ содой; при вздутомъ животѣ, отрыжкѣ, безпокойствѣ ребенка рекомендуется микстура, состоящая изъ 1 скрупула (1,2 грам.) соды, 20-ти капель ревенной настойки и 2-хъ унцъ (60,0 грам.) воды, такую микстуру даютъ черезъ 2 часа по чайной ложкѣ.

Кромѣ того, въ аптекахъ продается весьма пзвѣстный «дѣтскій порошокъ», состоящій изъ 3-хъ частей ревеня, 12-ти частей углекислой магнезии и 8-ми частей укропнаго сахара.

Такой порошок многія матери и акушерки даютъ даже новорожденнымъ дѣтямъ во крещенной икотѣ отъ вздутія живота. Особой пользы отъ этого излюбленнаго средства наблюдать не приходилось, напротивъ, сильныя и рядомъ бывающія отъ него боли въ животѣ: вышеназванная микстура дѣйствуетъ на дѣтей гораздо благотворнѣе.

Большіе приемы ревеня—отъ 5-ти до 30-ти гранъ (0,4—2,0 грм.)—дѣйствуютъ слабительно, вызывая кашпцеобразный, почти безболѣзненный стулъ черезъ 5—8 часовъ послѣ приема лекарства. Приемъ въ 5 гранъ дѣйствуетъ рѣдко, его приходится повторять, для чего берутъ по 5-ти гранъ передъ завтракомъ и обѣдомъ или на ночь и утромъ на тощій желудокъ. По мѣрѣ привыканія къ средству его приходится принимать все больше и больше. Нѣкоторые врачи не совѣтуютъ принимать ревеня людямъ, имѣющимъ склонность къ геморрою, такъ какъ принятый въ слабительныхъ приемахъ ревенъ производитъ увеличеніе геморроидальныхъ узловъ. Ревенъ, какъ легкое слабительное, рекомендуютъ въ тѣхъ случаяхъ, когда надо щадить силы больного и вызвать только одно или два полужидкихъ стула: его назначаютъ старикамъ, дѣтямъ, малокровнымъ людямъ, выздоравливающимъ отъ тяжелой болѣзни, и т. п. Принимать ревенъ изо дня въ день, какъ то дѣлаютъ многіе, для чего существуютъ въ продажѣ готовые нарѣзанные кусочки ревеня, не рационально, именно ввиду свойства ревеня давать послѣ себя запоры.

На западѣ, въ Швеціи и Германіи, стебли ревеня отвариваютъ и приготавливаютъ изъ нихъ сладкое блюдо. Ѣдятъ отваренные въ сахарѣ стебли ревеня вмѣстѣ со сливками.

Въ гомеопатіи ревенъ дается въ тѣхъ-же случаяхъ заботѣванія желудочно-кишечнаго канала. Въ особенности онъ рекомендуется дѣтямъ, страдающимъ вздутіемъ живота и болями въ животѣ въ періодъ прорѣзыванія зубовъ. Даютъ 1—2 капли 1-го, 2-го, 3-го разведенія по нѣсколько разъ въ день, черезъ каждыя 4, 6 или 12 часовъ, смотря по обстоятельствамъ.

Въ ветеринарной практикѣ малые приемы ревеня даются, какъ средство противъ хроническихъ катарровъ желудка и кишекъ, при кровавомъ поносѣ въ особенности молодымъ животнымъ, какъ-то телятамъ и ягнятамъ, причемъ къ ревеню прибавляютъ еще магнезіи и опія. Малыми дозами для лошадей и рогатаго скота считается отъ 7-ми до 15-ти граммъ (отъ 2-хъ драхмъ до $\frac{1}{2}$ унца); овцамъ, козамъ и свиньямъ даютъ отъ 1,5 до 7,5 гр. (1 скрупула до 4-хъ драхмъ), собакамъ и кошкамъ—отъ 0,25 до 1,0 грм. (3-хъ гр. до 5 гранъ). Такіе приемы даютъ по разу въ день въ порошокъ или кашкѣ чистыми, или-же съ примѣсью другихъ веществъ, какъ-то: сахара, магнезіи или опія, смотря по тому, какое дѣйствіе требуется.

Слабительные приемы ревеня большимъ животнымъ не назначаются, собакамъ и кошкамъ дается отъ 3,0 до 11,0 граммъ (1 $\frac{1}{2}$ драхмы до 3 $\frac{1}{2}$ драхмъ).

Редька дикая, см. Рѣдка дикая (*Raphanus Raphanistrum* L.).
Редька дикая, см. Горчица дикая (*Sinapsis arvensis* L.).

Редюха лѣсная, см. Гулявникъ лекарственный (*Sisymbrium officinale* L.).

Режь, см. Рожь обыкновенная (*Secale cereale* L.).

Резеда, см. Резеда душистая (*Reseda odorata* L.).

Резеда дикая, см. Майникъ двулистный (*Maianthemum bifolium* L.).

Резеда душистая (*Reseda odorata* L.). Резеда (повсюду), Розета (Волог.), Малиновый цвѣтъ, Малиновый цвѣтъ (Малор.), Малинка. Извѣстное по своему душистому запаху однолѣтнее травянистое растение, родомъ изъ Египта, изъ семейства «резедовыхъ» (*Resedaceae* Dc.), съ лежащимъ сильно вѣтвистымъ стеблемъ. Листья по краямъ шероховатые, нижніе—цѣльные, верхніе—3-храздѣльные, съ линейными или ланцетными долями. Мелкіе зеленовато-желтые или бѣлые цвѣты собраны длинными кистями. Чашелистикомъ и лепесткомъ 6; чашелистики линейные, при плодахъ разрастающіеся; верхніе лепестки съ 6 участками съ каждой стороны. Тычинокъ 10 — 30, прикрѣпленныхъ къ подпестичной ножкѣ, расширенной на верхней сторонѣ въ железистый дискъ. Столбикомъ 3—4, короткихъ. Плодъ—шаровидная, обратно-яйцевидная коробочка. Разводится часто въ садахъ.

Резеда желтая (*Reseda lutea* L.). Фармацевтическое назв. *Reseda vulgaris* (Herba). Однолѣтнее травянистое растение изъ семейства «резедовыхъ» (*Resedaceae* Dc.), распространенное въ средней и южной Европѣ, встрѣчающееся въ юго-западныхъ губерніяхъ Россіи, въ Крыму и на Кавказѣ. Стебель шероховатый, простерто-вѣтвистый, выш. 7—12½ вершк., съ приподнимающимися вѣтвями. Листья по краямъ шероховатые, средніе стеблевые—двойко-перисто-раздѣльные, верхніе—3-храздѣльные. Зеленовато-желтые цвѣты собраны длинными кистями. Чашелистикомъ и лепесткомъ по 6; чашелистики почти линейные, изъ лепесткомъ — верхніе раздѣльные. Тычинокъ 10 — 24, прикрѣпленныхъ къ подпестичной ножкѣ, расширенной на верхней сторонѣ въ железистый дискъ; столбикомъ 3—4. Плодъ—продолговатая трехгранная коробочка, 3-хлоная и вверхъ стоячая. Цвѣтетъ съ мая до октября. Встрѣчается на поляхъ. (Табл. XXXIX, фиг. 219.)

Резеда красная (*Reseda luteola* L.). Фармацевтическое названіе: *Luteola*, s. *Theriaca* (Herba et Radix). Вау (съ нѣм.), Желтая трава, Желтоцвѣтъ, Желтянка, Желтяница, Желтуха, Церва, Хаврашокъ (Екат.). Двулѣтнее травянистое растение изъ семейства «резедовыхъ» (*Resedaceae* Dc.), распространенное въ южной и средней Европѣ, изрѣдка встрѣчающееся въ южной и юго-западной Россіи. Стебель прямой; листья узко-ланцетные, снабженные при основаніи однимъ зубцомъ. Желтовато-зеленые цвѣты почти сидячіе, мелкіе, собраны длинною кистью. Чашелистикомъ и лепесткомъ по 4. Чашелистики продолговатые; изъ лепесткомъ верхній крупнѣе и, не доходя до середины, 5—7-мираздѣльный; два боковые лепестка 2—3-храз-

дѣльные, а нижній, обыкновенно, глубоко-2-храздѣльный. Тычинокъ 20—30, прикрѣпленныхъ къ подпестичной ножкѣ, расширенной наверху въ железистый дискъ. Столбиковъ 3—4, короткихъ. Плодъ—не крупная, шаровидно-обратно-яйцевидная, вверхъ стоячая коробочка. Цвѣтетъ лѣтомъ. Растетъ на поляхъ и при дорогахъ.

Резинное дерево, см. Смоковница каучуковая (*Ficus elastica* Roxb.).

Рекогизъ, см. Рогоза широколистная (*Typha latifolia* L.).

Реманъ дикій, см. Пупавка полевая (*Anthemis arvensis* L.).

Репеекъ, см. Гравилатъ водяной (*Geum rivale* L.).

Репеекъ, см. Гравилатъ прямой (*Geum strictum* Ait.).

Репей, см. Репяшокъ обыкновенный (*Agrimonia Eupatorium* L.).

Репей, см. Чернокорень обыкновенный (*Cynoglossum officinale* L.).

Репей, см. Липучка репейчатая (*Echinospermum Lappula* Lehm.).

Репей, см. Лопушникъ большой (*Lappa major* Gärtn.).

Репей, см. Вшивица болотная (*Pedicularis palustris* L.).

Репей, см. Дурнишникъ обыкновенный (*Xanthium Strumarium* L.).

Репей, см. Гравилатъ водяной (*Geum rivale* L.).

Репей глухой, см. Чертополохъ разнолистный (*Cirsium heterophyllum* All.).

Репей дикій, см. Гравилатъ прямой (*Geum strictum* Ait.).

Репей дикій, см. Гравилатъ водяной (*Geum rivale* L.).

Репей дикій, см. Гравилатъ городской (*Geum urbanum* L.).

Репей колкій, см. Чертополохъ поникшій (*Carduus nutans* L.).

Репей колкій } см. Дурнишникъ колючій (*Strumarium spinosum* L.).

Репей польскій } см. L.).

Репей щедровитый, см. Чертополохъ поникшій (*Carduus nutans* L.).

Репейная трава, см. Подмаренникъ цѣпкій (*Gallium Aparine* L.).

Репейникъ, см. Репяшокъ обыкнов. (*Agrimonia Eupatorium* L.).

Репейникъ, см. Чертополохъ курчавый (*Carduus crispus* L.).

Репейникъ, см. Чертополохъ разнолистный (*Cirsium heterophyllum* All.).

Репейникъ, см. Лопушникъ большой (*Lappa major* Gärtn.).

Репейникъ, см. Дурнишникъ обыкновенный (*Xanthium Strumarium* L.).

Репейникъ дикій, см. Колокольчикъ сборный, или Приточная трава (*Campanula glomerata* L.).

Репейникъ дикій, см. Козлунъ-трава (*Circaea lutetiana* L.).

Репейникъ дятоговникъ, см. Василекъ луговой (*Centaurea jacea* L.).

Репейникъ овечій, см. Дурнишникъ обыкновенный (*Xanthium Strumarium* L.).

Репецъ, см. Лопушникъ большой (*Lappa major* Gärtn.).

Репешки, см. Репяшокъ обыкновенный (*Agrimonia Eupatorium* L.).

- Репешки, см. Череда трехраздѣльная (*Bidens tripartita* L.).
- Репешки, см. Липучка репейчатая (*Echinospermum Lappula* Lehm.).
- Репешки, см. Гравилатъ городской (*Geum urbanum* L.).
- Репешки, см. Дурнишникъ колючій (*Xanthium spinosum* L.).
- Репешки-колючки, см. Дурнишникъ колючій (*Xanthium spinosum* L.).
- Репешки полевые, см. Репяшокъ обыкновенный (*Agrimonia Eupatorium* L.).
- Репешникъ)
- Репикъ) см. Репяшокъ обыкновенный (*Agrimonia Eupato-*
- Репій) *rium* L.).
- Репникъ)
- Репникъ, см. Репяшокъ обыкновенный (*Agrimonia Eupatoria* L.).
- Репникъ, см. Посконникъ конопляный (*Eupatorium cannabinum* L.).
- Репникъ, см. Лопушникъ большой (*Lappa major* Gärtn.).
- Репяшки полевые) см. Репяшокъ обыкновенный (*Agrimonia*
- Репяшникъ) *Eupatorium* L.).
- Репяшникъ, см. Посконникъ конопляный (*Eupatorium cannabinum* L.).
- Репяшокъ, см. Липучка репейчатая (*Echinospermum Lappula* Lehm.).
- Репяшокъ, смотри Воробейникъ полевой (*Lithospermum arvense* L.).
- Репяшокъ, см. Дурнишникъ обыкновенный (*Xanthium Strumarium* L.).
- Репяшокъ обыкновенный (*Agrimonia Eupatorium* L.). Фармацевтическое название: *Agrimonia Lappula* *Hepatica* v. *Eupatorium veterum* (Herba). Гладшникъ, Воронье сало, Донна, (Тамб.), Дона, Дѣди тр. (Могил.), Земляничникъ (Курск.), Земляничный цвѣтъ (Тамб.), Конка (Укр., Малор.), Кажушка (Хар., Курск., Вор.), Кажучечки (Умань). Кудри (Вят.), Лепилки, Лепильникъ (Иск., Тв., Дон. обл.), Линникъ (Поэт.), Липучки (Перм.), Парило (Мал.), Парыло (Ум.), Парникъ (Подол., Бесс.), Порухень (Укр.), Рѣликъ, Рѣникъ (Даль), Репей, Репій (Вор.), Рѣшникъ тр., Рѣшникъ (Под.), Репейникъ (Моск. и др.), Репешникъ, Репяшникъ, Репяшки полевые (Екат., Харьк.), Собачки. Сороконодужникъ (Сарат.). Судопоръ. Содопаръ (Вор., Дон. обл.), Орешій цыкій или цыпучій (Вор.). Червечникъ. Щербъ (Могил.), Печеночникъ. Пичыныкъ (Вол., Пол.), Королевина трава, Завитки, Череда (Ниж.), Буквица (Тавр.). Капшникъ (Тул.), Капшникъ (Тамб., Сит. Горн.). Колючка (Кал.). Кожучка, Рышка (Тавр.), Репей, Баибакъ полевой (Курск.), Висивецъ (Орл.), Водяная трава, Грудникъ (Курск.), Елочка, Елошничекъ (Иж.), Комаръ желтый (Вятск.), Ластовникъ (Могил.), Пухарець полевой (Киев.), Сметанникъ (Могил.), Джакъ тiана (Ставр.). Многолѣтнее травянистое растение изъ семейства «розоцвѣтныхъ» (*Rosaceae* Нок et Venth.), распространенное почти во всей Европѣ и во всей

Россіи. Стебель прямостоящій, выш. $1\frac{1}{2}$ —5 верш., шершаво-волосистый; листья прерывчато-перистые. Золотисто-желтые цвѣты расположены колосомъ. Чашечка 5-тираздѣльная; лепестковъ 5. Тычинокъ много. Сѣмянки (1 или 2) замкнуты въ отвердѣвшемъ цвѣтоложѣ, усаженномъ цѣпкими, крючковатыми шипами. Цвѣтеть лѣтомъ. Растетъ на холмахъ и между кустарниками. Употребляется для выпариванія молочной посуды и имѣетъ примѣненіе въ народной медицинѣ.

МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНІЕ. Цвѣтущее растеніе собирается въ іюль и августъ, толстые стебли отрѣзаются, а мелкіе высушиваются въ тѣнистомъ мѣстѣ. Изъ 7-ми частей растенія послѣ высушивания получаютъ только 2 части. Сберегается сушеное растеніе въ эмалированной посудѣ. Изъ него добывается душистое пріятное масло. Растеніе обладаетъ горькими вяжущими свойствами, благодаря которымъ прославлялось греками и римлянами, какъ чудесное средство; позднѣе его рекомендовали противъ болѣзней печени, противъ желтухи, болѣзней легкихъ, поносовъ и впутреннихъ кровоизліяній, снаружи его давали для полосканія горла при катаррахъ горла и для вяжущихъ примочекъ. По суевѣрнымъ преданіямъ, для того, чтобы быть любимымъ женщинами, надо носить корень репьяшка на груди. Въ настоящее время въ медицинѣ корень этотъ никогда не употребляется. Крестьяне выпариваютъ имъ молочную посуду, откуда и существуетъ его названіе *парило*.

Репѣяхи собачи	} см. Череда трехраздѣльная (<i>Bidens tripartita</i> L.).
Репѣехи собачьи	
Репѣи собачи	

Репѣякъ	} см. Лопушникъ большой (<i>Lappa major</i> Gärtn.).
Репѣяхи	

Репѣяхи полевые, см. Чертополохъ поникшій (*Carduus nutans* L.).

Репѣяшки	} см. Дурнишникъ обыкновенный (<i>Xanthium Strumarium</i> L.).
Репѣяшокъ	

Репѣякъ шубный, см. Дурнишникъ колючій (*Xanthium spinosum* L.).

Репѣякъ, см. Дурнишникъ обыкновенный (*Xanthium Strumarium* L.).

Репѣяшка, см. Чистецъ прямой (*Stachys recta* L.).

Ретисъ, см. Брюква (*Brassica Napus* L.).

Реутъ, см. Дягиль лѣсной (*Angelica silvestris* L.).

Рещевникъ, см. Дрема кукушкинъ цвѣтъ (*Lychnis flos cuculi* L.).

Ржанецъ, см. Пырей ползучій (*Triticum repens* L.).

Ржанецъ, см. Ежа сборная (*Dactylis glomerata* L.).

Ржанецъ, см. Аржанецъ степной (*Phleum Boeumeri* Wib.).

Ржанецъ, см. Спорынья (*Sclerotium Clavus* Dc.).

Ржанецъ луговой	} см. Тимофеевка (<i>Phleum pratense</i> L.).
Ржаникъ	

Ржаникъ, см. Лисохвостъ колѣчатый (*Alopecurus geniculatus* L.).

Ржанъ, см. Пырей ползучій (*Triticum repens* L.).

- Ржина** } см. Рожь обыкновенная (*Secale cereale* L.).
Ржица }
Ржица, см. Спорынья (*Sclerotium Clavus* Dc.).
Ржичка, см. Рожь обыкновенная (*Secale cereale* L.).
Ржонецъ песочный, см. Арижанецъ песчаный (*Pbleum arenarium* L.).
Ржочки, см. Земляные орѣшки (*Spiraea Filipendula* L.).
Ржикъ, см. Рыжикъ (*Agaricus deliciosus* L.).
Рижій, см. Рыжикъ посѣвной (*Camelina sativa* Crantz.).
Рижуха, см. Пастушья сумка (*Capsella Bursa pastoris* Moench.).
Рижуха, см. Крупка весенняя (*Draba verna* L.).
Рижъ } см. Рисъ посѣвной (*Oryza sativa* L.).
Рижъ }
Ризецъ, см. Шпажникъ черепчатый (*Gladiolus imbricatus* L.).
Ризикъ-дризлякъ, см. Подмаренникъ желтый (*Galium verum* L.).
Рипакъ, см. Сурѣница (*Brassica Rapa campestris* L.).
Рипей, см. Монушникъ большой (*Lappa major* Gärtn.).
Рипецъ, см. Свербига восточная (*Bunias orientalis* L.).
Рипяхъ, см. Чертополохъ поникшій (*Carduus nutans* L.).
Рипяшки, см. Острица лежачая (*Asperugo procumbens* L.).
Ризакъ, см. Тѣлорѣзь сабуровидный (*Stratiotes aloides* L.).
Ризакъ } см. Ризакъ степной (*Falcaria Rivini* Host.).
Ризакъ степной }
Ризачка, см. Ризакъ степной (*Falcaria Rivini* Host.).
Рипа, см. Рѣпа огородная (*Brassica Rapa* L.).
Рипа волоська, см. Земляная груша (*Helianthus tuberosus* L.).
Рипьяшокъ, см. Липучка репейчатая (*Echinospermum Lappula* Lehm.).
Рипьяшокъ овечій, см. Дурнишникъ обыкновенный (*Xanthium Strumarium* L.).
Рипякъ, см. Чертополохъ поникшій (*Carduus nutans* L.).
Рисъ, см. Рисъ посѣвной (*Oryza sativa* L.).
Рисъ индѣйскій, см. Рисъ канадскій (*Zizania aquatica* L.).
Рисъ канадскій (*Zizania aquatica* L.). Плевель, Овесъ водяной, Пятлина, Рисъ индѣйскій, Иппеница дикая. Злаковое растение, произрастающее въ затопляемыхъ водой мѣстахъ южной части Сѣв. Америки. Трава составляетъ превосходный кормъ для скота, а зерна употребляются въ пищу индѣйцами и на кормъ домашнимъ птицамъ.
Рисъ посѣвной (*Oryza sativa* L.). Пшено нѣмецкое. Пшено сарацинское. Рисъ (Вел. Росс.), Рысь, Рыжъ, Рижъ, Рижъ, Рисъ (Малор.), Салтыкъ (Астр.), Чалтыкъ. Однолѣтнее травянистое растение изъ семейства «злаковыхъ» (*Gramineae* Juss.), родомъ изъ Остѣ-Индіи, выш. болѣе 1½ ари. Листья линейно-ланцетные, длинно-заостренные. Одноцвѣтные колоски расположены на вѣтвяхъ метелки кистями. Цвѣтки обоюполовые, съ 6 тычинками и 2-мя столбиками. Зрѣлыя зерновки заключены въ пленки, изъ которыхъ наружная то съ остію, то безъ ости, смотря по сорту. Рисъ воздѣлывается преимущественно на низкихъ, за-

топляемыхъ водою, мѣстахъ, не только во всей южной Азій, но также и въ южной Европѣ, въ сѣверной Африкѣ и въ жаркихъ странахъ Америки; въ Россіи онъ разводится въ нѣсколькихъ сортахъ въ Закавказьѣ, въ Туркестанѣ и въ южной части восточной Сибири. Зерна риса составляютъ важный предметъ торговли и служатъ для народонаселенія южной Азій однимъ изъ главныхъ пищевыхъ продуктовъ; они употребляются на приготовленіе водки (аракъ), рисоваго крахмала, пудры и т. п.; употребляются и въ медицинѣ. Изъ соломы приготовляютъ рисовую бумагу. (Табл. XL, фиг. 223.)

МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНІЕ. Рисовыя зерна содержатъ въ себѣ около 80% крахмала, 1—2% бѣлковыхъ веществъ. Употребляется рисъ въ видѣ отвара, какъ питье, отъ разстройства желудка и при дезинтеріи; для этого рисъ немного подсушиваютъ, толкутъ и чайную ложку толченаго риса кипятятъ со стаканомъ воды, процеживаютъ, студятъ и пьютъ глотками, для вкуса прибавляютъ сахара и немного краснаго прокипяченнаго вина. Мелко истолченный рисъ идетъ для приготовленія всевозможной пудры для лица; въ особенности рекомендуется пудра, состоящая изъ рисовой муки съ висмутомъ, она называется пудрой August Obée изъ Франкфурта «Eukonia Rowlands». Турки вывариваютъ изъ риса напитокъ, похожій по вкусу на пиво. Въ Германіи рисъ также идетъ въ дѣло при приготовленіи пива.

Рисъ, см. Рисъ посѣвной (*Oryza sativa* L.).

Рицина } см. Клещевина (*Ricinus communis* L.).

Рицинь } см. Клещевина (*Ricinus communis* L.).

Ришточникъ, см. Колокольчикъ сборный, или Приточная трава (*Campanula glomerata* L.).

Робингія, см. Акація бѣлая (*Robinia Pseudo-Acacia* L.).

Рогатка, см. Сусакъ зонтичный (*Butomus umbellatus* L.).

Рогатка, см. Гулявникъ струйчатый (*Sysimbrium Sophia* L.).

Рогатки } см. Орѣхи водяные (*Trapa natans* L.).

Рогатникъ } см. Орѣхи водяные (*Trapa natans* L.).

Рогачка, см. Гулявникъ струйчатый (*Sysimbrium Sophia* L.).

Рогачъ желтый (*Glaucium luteum* Scop.). Фармацевтическое названіе: *Papaver corniculatum*, s. *Glaucium luteum* (*Radix et Herba*), *Chelidonium corniculatum*. Макъ рогатый или лѣсной, Макъ вороній, Мачокъ (Новор., Екат.), Рожечникъ. Однолѣтняя и двулѣтняя трава изъ семейства «маковыхъ» (*Papaveraceae* Dc.), распространенная въ средней и южной Европѣ, встрѣчающаяся кое-гдѣ на югѣ Россіи, покрытая сизымъ налетомъ, выш. 7—22½ вершк. Стебель почти голый; верхніе листья стеблеобъемлющіе, нижніе—черешковые. Цвѣты золотисто-желтые, одиночные, верхушечные, съ 2-мя опадающими чашелистиками, 4 лепестками и многочисленными тычинками. Рыльце широкое двураздѣльное. Плодъ—длинная стручковидная двугнѣздная коробочка, раскрывающаяся двумя створками. Цвѣтетъ въ началѣ лѣта. Попадаетъ на сорныхъ мѣстахъ.

Рогизъ, см. Камышъ озерной (*Scirpus lacustris* L.).

Рогізъ, см. Рогоза узколистная (*Typha angustifolia* L.).

Рогізъ, см. Рогоза широколистная (*Typha latifolia* L.).

Роговикъ, см. Кизикъ обыкновенный (*Cornus mas* L.).

Рогожникъ, см. Рогоза узколистная (*Typha angustifolia* L.).

Рогоза, см. Рогоза широколистная (*Typha latifolia* L.).

Рогоза, см. Рогоза узколистная (*Typha angustifolia* L.).

Рогоза, см. Касатикъ водяной (*Iris pseudacorus* L.).

Рогоза, см. Камышъ озерной (*Scirpus lacustris* L.).

Рогоза узколистная (*Typha angustifolia* L.). Вадья, Кяхъ, Кяхшокъ (Мал.), Клобуки, Клобуки поповскіе (Твер., Ост.), Оробинецъ, Горобинецъ, Палочникъ (Вят., Малор.), Початки (Приар. кр.), Чертопалочникъ (Вят.), Пуховка (Могил.), Рогожникъ (Вятск.), Рогоза (повсюду), Рогозъ, Рогізъ (Мал.), Тырличъ рѣчной (Вятск.) Султанчикъ (Малор.), Филатика, Чаканъ (земл. Войск. Донск.), Многолѣтняя болотная трава изъ семейства «рогозовыхъ» (*Typhaceae* Juss.), распространенная почти во всей Европѣ почти во всей Россіи, съ ползучимъ подземнымъ корневищемъ. Листья узколинейные, внизу желобчатые, сѣровато-зеленые. Однополые, однодомные цвѣты скучены въ цилиндрическія соцветія; внизу женское бурое,верху мужское, отдѣленное отъ женскаго голымъ стеблемъ колѣномъ. При основаніи всего соцветія и въ мужскомъ есть рано отваливающіеся верхушечные листья; мужскіе цвѣтки находятся между многочисленными волосками и состоятъ изъ 3-хъ тычинокъ со сросшимися внизу нитями и 4-хлѣбными пыльниками. Околоцвѣтники у женскихъ цвѣтовъ тоже замѣняютъ волоски; при женскихъ цвѣтахъ есть тонкіе при основаніи, лопатчатые наверху прицѣпники, столь же длинныя, какъ и волоски. Пестикъ продолговатый, поднимающійся на ножкѣ и несущій длинный столбикъ съ линейнымъ рыльцемъ. Плодъ—орѣшекъ. Цвѣтетъ въ началѣ лѣта. Растетъ на болотахъ и при берегахъ.

Рогоза широколистная (*Typha latifolia* L.). Вадья, Бобы (молодые стебли, которые ѣдятъ только сырыми) и Чагалъ (корни, которые ѣдятъ только печеными) (около Уральска), Вочарная трава, Куга (названіе травы) и Цвѣтуха (названіе початка) (Кал.), Кивухъ (Курск.), Кіевка (Вѣлор.), Кяхи (Малор.), Кубысъ (Екат.), Куга (Кал., Сар.), Коловай (Вил. съ пол.), Моралка (початокъ на Иртышѣ выше Омска), Мячка (Малор.), Купорная или Осока тростниковая (Арханг., Костр.), Осока озерная (Костр.), Оробинецъ (Сл. Церк.), Горобинникъ (трава, Умань), Палки (цвѣты), Палочникъ, Палощникъ, Чернопалка (Перм.), Чертова палочка (Перм.), Чертопалочникъ (Вят.), Чердунъ, Плющей (Вил.), Початокъ (Кал.), Початки (Курск., Ряз. и др.), Пуховка (Могил.), Пшеничка, Пыжъ, Чижъ (Ряз.), Рагоза, Рогоза, Рогозъ (Мал. и Сред. Росс.), Рогізъ (Срд.), Рогошъ и искаж. Рекогизъ, Султанъ, Султанчики (Мал., Рог.), Тырличъ, Тырликъ, Чаканъ, Чаконы, Чакопъ, Чортъ (Вятск.). Многолѣтняя болотная трава изъ семейства «рогозовыхъ» (*Typhaceae* Juss.), распространенная почти во всей Европѣ и почти во всей Россіи, съ короткимъ ползу-

чимъ корневищемъ. Стебель выш. $1\frac{1}{2}$ —3 арш. Листья очень длинные, широколинейные, плоскіе, при основаніи влагалищныя. Мелкіе однодомныя цвѣты образуютъ длинный, отъ 7—14 вершк., цилиндрической, сомкнутой (непрерванный) початокъ; верхняя часть его состоитъ изъ тычиночныхъ (мужскихъ) цвѣтовъ, а нижняя—изъ пестичныхъ (женскихъ). Околоцвѣтникъ замѣненъ мягкими темно-бурыми волосками. Мужскіе цвѣты состоятъ изъ 3 тычинокъ со спаянными внизу нитями и 4-хгнѣздными тычинками; женскіе—изъ пестика на ножкѣ, несущаго длинный столбикъ. Завязь верхняя одногнѣздная, съ однимъ яичкомъ. Плодъ—орѣшекъ. Цвѣтетъ лѣтомъ. Растетъ въ стоячихъ и медленно текущихъ водахъ.

Рогозъ, см. Рогоза узколистая (*Typha angustifolia* L.).

Рогозъ, см. Рогоза широколистная (*Typha latifolia* L.).

Рогошъ, см. Рогоза широколистная (*Typha latifolia* L.).

Рогулешный видъ

Рогули чертовы

Рогулки

Рогульки

Рогульникъ

Родимецъ-травя, см. Вороній глазъ (*Paris quadrifolia* L.).

Родимная трава, см. Очанка лекарственная (*Euphrasia officinalis* L.).

Родимцевая трава, см. Истодъ обыкновенный (*Polygala vulgaris* L.).

Родина, см. Анютины глазки (*Viola tricolor* L.).

Рододендръ, см. Рододендръ понтіійскій (*Rhododendron ponticum* L.).

Рододендръ даурскій (*Rhododendron dahuricum* L.). Багульникъ, Багульникъ, Багунт, Даурское розовое дерево, Кашкара, Клоповникъ, Пьянишникъ боровой. Вѣчно-зеленый кустарникъ съ кожистыми листьями, произрастающій въ Китаѣ, Тибетѣ и около Байкальскаго озера. Употребляется туземными жителями, какъ лекарство, а по одуряющимъ свойствамъ своимъ на ловлю рыбъ.

Рододендръ понтіійскій (*Rhododendron ponticum* L.). Рододендръ. Вѣчно-зеленый раскидистый кустарникъ изъ семейства «вересковыхъ» (*Ericaceae* Lindl.), произрастающій на Кавказѣ, выш. въ нѣсколько сажень. Листья кожистые, продолговато-ланцетные, голые съ загнутыми краями. Фиолето-пурпуровые цвѣты въ щиткахъ; вѣтчикъ колокольчато-воронковидный, 5-тилопестный. Тычинокъ 10; завязь верхняя. Плодъ—коробочка. Разводится въ садахъ какъ декоративное растеніе. Медъ съ его цвѣтовъ ядовитъ.

Рододендръ ржавчинный (*Rhododendron ferrugineum* L.). Пьяная трава, Пьянишникъ. Альпійскій кустарникъ, выш. отъ $3\frac{1}{2}$ —7 вершк., съ лежащимъ стеблемъ, изъ семейства «вересковыхъ» (*Ericaceae* Lindl.). Листья кожистые, ланцетовидные, съ загнутыми краями, снизу ржавчинно-войлочные. Розовые или

пурпуровые цвѣты собраны на концахъ вѣтвей щиткомъ; вѣнчикъ воронковидный, слегка неправильный, 5—7-милопастный; тычинокъ 10; завязь верхняя. Плоды—коробочка. Цвѣтеть съ юня до сентября.

МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНІЕ. Всѣ виды рододендра обладаютъ мочегоннымъ и потогоннымъ дѣйствіемъ и для этой цѣли иногда въ настоящее время (крайне рѣдко) употребляются въ медицинѣ отъ ревматизма и подагры. Въ Швейцаріи листья рододендра ржавчиннаго даются отъ каменной болѣзни: доза отъ 0,5 до 1,0 и 1,5 грам. (отъ 8-ми гранъ до 1 скрупула) отъ трехъ до 4-хъ разъ въ день въ порошокъ или отварѣ.

Листья рододендра собираются, рѣжутся на мелкие кусочки и сохраняются въ хорошо закрытыхъ стеклянныхъ сосудахъ безъ доступа свѣта. Дѣйствующее вещество содержится въ легко испаряющемся маслѣ растений.

Въ гомеопатіи растение это употребляется гораздо чаще. Оно назначается отъ отравленія ртутью, отъ подагры и ревматизма, при заболѣваніяхъ слизистыхъ оболочекъ, также отъ головныхъ болей, головокруженія, склонности къ поносамъ, при болѣзненномъ мочепусканіи, при насморкѣ, катарральномъ состояніи слизистой оболочки глотки и дыхательныхъ путей, при боляхъ въ крестцѣ и при различнаго вида ревматическихъ заболѣваніяхъ. Даютъ отъ 1-ой до 2-хъ капель чистой настойки или 1-го, 2-го и 3-яго разведенія отъ 1-го до 2-хъ разъ въ день.

Въ Швейцаріи изъ почекъ рододендра ржавчиннаго, настоенныхъ на маслѣ, сапеныры приготавливаютъ очень цѣнное масло, такъ называемое «oleo di margotta», втираніемъ котораго они лечатся отъ ревматизма.

Роевникъ, см. Мелисса лекарственная (*Melissa officinalis* L.).

Рожь, см. Просвирникъ лѣсной (*Malva silvestres* L.).

Рожь, см. Просвирникъ обыкновенный (*Malva rotundifolia* L.).

Рожь, см. Шиповникъ обыкновенный (*Rosa canina* L.).

Рожь бордовая, см. Герань кроваво-красная (*Geranium sanguineum* L.).

Рожь дикая, см. Хатьма тюрингенская (*Lavatera thuringiaca* L.).

Рожь дикая, см. Алтей лекарственный (*Althaea officinalis* L.).

Рожь косматая, см. Шиповникъ обыкновенный (*Rosa canina* L.).

Рожь кошачья, см. Алтей лекарственный (*Althaea officinalis* L.).

Рожь красная, см. Штокъ-роза (*Althaea rosea* Cav.).

Рожь кудрявая, см. Просвирникъ курчавый (*Malva crispa* L.).

Рожь лѣсная, см. Алтей лекарственный (*Althaea officinalis* L.).

Рожь лѣсная, см. Хатьма тюрингенская (*Lavatera thuringiaca* L.).

Рожь огородная, см. Штокъ-роза (*Althaea rosea* Cav.).

Рожь полевая, см. Хатьма тюрингенская (*Lavatera thuringiaca* L.).

Рожь полевая, см. Шиповникъ обыкновенный (*Rosa canina* L.).

Рожь собачья } см. Хатьма тюрингенская (*Lavatera thuringiaca* L.).

Рожь собачья }

Рожь собачья, см. Алтей лекарственный (*Althaea officinalis* L.).

Рожа черная, см. Хатма тюрингенская (*Lavatera thuringiaca* L.).
Рожальница, см. Кирказонъ обыкновенный (*Aristolochia Clematidis* L.).

Роженецъ, см. Борщевикъ сибирскій (*Heracleum sibiricum* L.).

Роженецъ, см. Плевель одуряющій (*Lolium temulentum* L.).

Роженецъ, см. Тимофеевка (*Phleum pratense* L.).

Рожечникъ, см. Стручки царградскіе (*Ceratonia seliqua* L.).

Рожечникъ, см. Рогачъ желтый (*Glaucium luteum* Scop.).

Рожицы красныя, см. Просвирникъ лѣсной (*Malva silvestris* L.).

Рожки, см. Стручки царградскіе (*Ceratonia seliqua* L.).

Рожки } см. Спорынья (*Sclerotium Clavus* Dc.).
Рожки житныя }

Рожки козы, см. Череда трехраздѣльная (*Bidens tripartita* L.).

Рожки сахарныя, см. Стручки царградскіе (*Ceratonia seliqua* L.).

Рожки черныя, см. Спорынья (*Sclerotium Clavis* Dc.).

Рожникъ, см. Тимофеевка (*Phleum pratense* L.).

Рожь, см. Рожь обыкновенная (*Secale cereale* L.).

Рожь дикая, см. Колоснякъ песчаный (*Elymus arenarius* L.).

Рожь дикая, см. Тимофеевка (*Phleum pratense* L.).

Рожь загозья, см. Кукункинь ленъ (*Polytrichum commune* L.).

Рожь индѣйская, см. Рыжикъ полевнй (*Camelina sativa* Crantz.).

Рожь обыкновенная (*Secale cereale* L.). Рожь, Ржи, Режь, и изм. Ржина, Ржица, Ржичка, Жито (Малор.), Оводъ (яров. рожь въ Твер.), Оводъ (яров. рожь въ Пек. губ.), Зетка (Влад. Козл.), Пива (Твер., Вятск.). Мука смолотая—Борашно (Малор.). Сизо-зеленое однолѣтнее (яровая рожь) и двулѣтнее (озимая рожь) растение изъ семейства злаковыхъ (Gramineae Juss.), родомъ, вѣроятно, изъ юго-восточной Европы (Венгрии и южной Россіи) и западной Азии. Стеблей обыкновенно нѣсколько, собранныхъ пучкомъ. Колосъ длинный (до 3½ вершк.), поникающій, 4-хгранный. Колоски сидятъ на выступахъ стержня поодиночкѣ и заключаютъ въ себѣ по два цвѣтка. Створки колосковыхъ узкія, шиловидныя, короче колоска. Пленки цвѣточные—ланцетовидныя; наружная пленка обоихъ цвѣтковъ продолжена въ длинную ость. Зерно немного сжатое съ боковъ. Цвѣтетъ въ началѣ лѣта. Рожь, какъ и пшеница, относится къ важнѣйшимъ хлебнымъ растениямъ; въ Россіи она разводится почти повсемѣстно. Озимую рожь сѣютъ въ концѣ лѣта или въ началѣ осени, а убираютъ на слѣдующій годъ въ іюль или въ августѣ; посѣвъ-же яровой ржи производится весной, и жатва ея наступаетъ обыкновенно нѣсколькими недѣлями позжѣ жатвы озимой ржи. (Табл. XI, фиг. 224.)

МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНІЕ. Ржаная мука служить для прибавленія къ горчичной муцѣ при приготовленіи легко дѣйствующихъ горчичниковъ. Для этого берутъ той и другой муки по-ровну, заливаютъ ее холодною водою, хорошо размѣшиваютъ и намазы-

ваютъ на бумагу или на полотняную тряпку. Изъ сушенанаго чернаго хлѣба, въ особенности изъ корокъ, варятъ хлѣбный квасъ и готовятъ водяной отваръ корокъ, который съ прибавкою сахара многими употребляется, какъ пріятный, освѣжающій и здоровый напитокъ. Изъ ржаныхъ отрубей дѣлаютъ припарки.

Роза, см. Шиповникъ обыкновенный (*Rosa canina* L.).

Роза болотная, см. Сабельникъ болотный (*Comarum palustre* L.).

Роза водяная астраханская, см. Бадма (*Nelumbium caspicum* Fisch.).

Роза дамасская (*Rosa damascena* Mill.). Роза, произрастающая въ Индіи. Изъ нея получается розовое масло. Цвѣты сушеные употребляются, какъ чай, а свѣжіе въ варенья.

Роза дикая, см. Шиповникъ обыкновенный (*Rosa canina* L.).

Роза желтая, см. Купальница европейская (*Trollius europaeus* L.).

Роза кирпичная (*Rosa rubiginosa* L.). Кустарникъ изъ семейства «розоцвѣтныхъ» (*Rosaceae* Hook et Benth.), распространенный въ западной и южной Россіи, въ средней и южной Европѣ, весьма похожій на шиповникъ, отъ котораго отличается присутствіемъ на листьяхъ многочисленныхъ железистыхъ волосковъ, содержащихъ душистое эфирное масло; при трѣніи листья распространяютъ ароматный запахъ; листья перистые, состоящіе изъ 5—7 листочковъ, сверху темнозеленыхъ, по краямъ съ острыми отстоящими зубчиками; листья сложены прилистниками. Цвѣты красные одиночные. Чашечка простая, 5-тираздѣльная. Лепестковъ 5; лепестки и многочисленные тычинки прикрѣплены къ краю кувшинчатаго цвѣтоложа. Ложные плоды округлые, желтовато-красные, состоящие изъ сѣмянъ, заключенныхъ въ мясистомъ цвѣтоложѣ. Цвѣтетъ лѣтомъ. Растетъ между кустарниками и на каменистыхъ мѣстахъ. (Рис. 249.)

Роза мелколистная (*Rosa pimpinellifolia* Dc.). Низкій кустарникъ изъ семейства «розоцвѣтныхъ» (*Rosaceae* Hook et Benth.), распространенный въ средней и южной Европѣ, въ юго-западной и южной Россіи, въ южной Сибири и Туркестанѣ, выш. 7—26½ вершк.; вѣтви его густо покрыты многочисленными шипами неравной длины. Листья состоятъ изъ 5—11 мелкихъ округлыхъ или продолговатыхъ, остропильчатыхъ листочковъ. Цвѣты бѣлые, одиночные. Чашечка 5-тираздѣльная, съ шиловидно-заостренными, остающимися при плодахъ, долями; лепестковъ — 5. Лепестки и многочисленные тычинки прикрѣплены къ краямъ кувшинчатаго цвѣтоложа, на днѣ котораго сидятъ многочисленные односѣмянные плодники съ длинными столбиками. Плодъ сборный (состоитъ изъ сѣмянокъ, заключенныхъ въ мясистомъ цвѣтоложѣ), почти черный, приплюснуто-шаровидный. Цвѣтетъ въ маѣ и юнѣ. Растетъ въ лѣсахъ и между кустарниками. (Рис. 250.)

Роза мускусная (*Rosa moschata* Mill.). Произрастаетъ въ сѣв. Африкѣ и южной Азій. Изъ ея цвѣтовъ готовится настоящее розовое масло (*Oilum Rosarum aetherum*), высокоцѣнное (изъ 600 фунтовъ розовыхъ лепестковъ получается только одинъ унцъ, т.-е. 8 золотниковъ масла).

Роза повна, см. Роза центифольная (*Rosa centifolia* L.).

Роза полевая, см. Василек луговой (*Centaurea jacea* L.).

Роза ползучая (*Rosa arvensis* L.). Кустарникъ изъ семейства «розоцвѣтныхъ» (*Rosaceae* Hook et Benth.), распространенный въ западной и средней Европѣ, съ лежащими вѣтвями, усаженными разбѣянными загнутыми шипами. Листья сложные, состояще изъ листочковъ, сверху блестящихъ, снизу тусклыхъ и болѣе свѣтлыхъ. Цвѣты бѣлые, безъ запаха. Плоды красные. Цвѣтеть въ июлѣ. (Табл. XL, фиг. 225.)

Роза пущистая (*Rosa tomentosa* Sm.). Кустарникъ выш. 1½, до 3 арш., изъ семейства «розоцвѣтныхъ» (*Rosaceae* Hook et Benth.), распространенный въ сѣверной и средней Европѣ, въ западной Россіи, на Кавказѣ и Сибири, съ крѣпкими прямыми шиповидными шипами. Листья сложные, состояще изъ продолговато-эллиптическихъ, двояко-пильчатыхъ, съ обѣихъ сторонъ сѣрыхъ, густо-пушистыхъ листочковъ. Цвѣты одиночные, красные. Чашечка 5-тираздѣльная. Вѣнчикъ 5-тилепестный. Плодъ красный, овальный или шаровидный, усаженный шипами. Цвѣтеть въ маѣ и въ июлѣ. Растетъ въ лѣсахъ и между кустарниками. (Рис. 251.)

Роза століственная, см. Роза центифольная (*Rosa centifolia* L.).

Роза французская (*Rosa gallica* L.). Невысокій кустарникъ изъ семейства «розоцвѣтныхъ» (*Rosaceae* Hook et Benth.), распространенный въ южной и юго-западной Россіи, въ южной Европѣ, въ Крыму, на Кавказѣ и въ Малой Азіи. Вѣтви и побѣги его покрыты многочисленными короткими щетинками, несущими по железѣ, и болѣе рѣдкими шиповидными, при основаніи расширенными, внизъ загнутыми шипами; черешки, прилистники и края листочковъ усажены железками. Листья состоятъ изъ 5—7 эллиптическихъ или яйцевидно-округлыхъ листочковъ, обыкновенно голыхъ и снизу блѣдно-зеленыхъ. Пуширо-красные цвѣты сидятъ по 1—3 на концахъ вѣтвей. Чашечка 5-тираздѣльная, съ перистыми, послѣ цвѣтенія отвороченными, позже опадающими, долями. Вѣнчикъ 5-тилепестный. Многочисленные тычинки, вмѣстѣ съ лепестками, прикрѣплены къ краямъ кувшинчатаго цвѣтоложа, на двѣ котораго находятся многочисленные плодики, несущіе по одному столбику. Плодъ сборный (состоитъ изъ нѣсколькихъ сѣмянокъ), шаровидный и твердый. Цвѣтеть въ началѣ лѣта. Растетъ между кустарниками и въ рощахъ.

Роза центифольная (*Rosa centifolia* L.). Роза століственная, Роза повна, Троянда. Кустарникъ вышепредыдущаго вида (Роза французская), изъ семейства «розоцвѣтныхъ» (*Rosaceae* Hook et Benth.), съ красными пушистыми, поникающими, розовыми махровыми крупными цвѣтками; вѣтви его обильно покрыты железистыми щетинками и крупными серповидными шипами. Листья состоятъ изъ 5—7 эллиптическихъ или яйцевидно-округлыхъ однажды или двояко-городчато-пильчатыхъ листочковъ, снизу блѣдно-зеленыхъ. Плодъ шаровидный, твердый, со-

стоящий изъ многочисленныхъ сѣмянокъ, заключенныхъ въ мясистомъ цвѣтоложѣ. Разводится въ многочисленныхъ сортахъ въ садахъ. Цвѣтетъ въ первой половинѣ лѣта.

МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНІЕ. Нѣкоторые виды розъ, какъ-то *Rosa centifolia*, *Rosa gallica* и *Rosa damascena*, употребляются въ медицинѣ. Розы собираются въ юнѣ въ самую сухую погоду, листочки обрываются и высушиваются на горячемъ солнцѣ. При быстромъ высушиваніи лепестки сохраняютъ свой цвѣтъ, при медленномъ они темнѣютъ и дѣлаются даже совсѣмъ коричневыми. Сохраняются сушеные листья въ хорошо закупоренныхъ банкахъ. Листья содержатъ въ себѣ дубильное вещество съ примѣсью желѣза, сахаръ, слизь, душистое масло и известковыя соли.

Розовые листья по своему влиянію на организмъ принадлежатъ къ числу слизистыхъ, слегка вяжущихъ средствъ. Врачами внутрь розовые листья не выписываются, въ народѣ же они имѣютъ обширное примѣненіе при поносахъ, боляхъ въ животѣ и страданіяхъ легкихъ. Мелко истолченнымъ порошкомъ розовыхъ листьевъ крестьяне посыпаютъ язвы и его-же пакладываютъ на мѣста, пораженные рожистымъ воспаленіемъ.

Въ аптекахъ изъ розовыхъ лепестковъ готовятъ розовую воду, консервы, розовый медъ, розовый сиропъ и розовое масло. Розовое масло готовится только изъ сильно пахучихъ розъ изъ породы *Rosa damascena*, стоитъ оно очень дорого, въ медицинѣ почти что не употребляется и служитъ для приготовленія различныхъ парфюмерныхъ веществъ, жидкостей для обмыванія лица и рукъ и помадъ для смягченія кожи.

Отваръ розовыхъ листьевъ дѣйствуетъ слегка вяжущимъ образомъ, потому рекомендуется при кашлѣ и чувствѣ щекотанія въ горлѣ. Для этого 2 стол. ложки розовыхъ сушеныхъ листьевъ заливаютъ 2-мя стаканами воды и ставятъ въ эмалированной кастрюлѣ на плиту, чтобы листья хорошо прокипѣли; въ остуженный и процеженный отваръ прибавляютъ 1 чайн. ложку борной кислоты и 2 чайн. л. глицерина, и, если раздраженіе горла сильное, отъ 30-ти капель до чайной ложки воды горькихъ миндалей или лавровишневой воды; этою смѣсью полощатъ горло нѣсколько разъ въ день, слегка ее подогревая, прибавленіемъ горячей воды или тѣмъ, что стаканъ съ небольшимъ количествомъ жидкости ставить въ горячую воду.

Розовымъ медомъ съ бурою (на 1 унцѣ (30,0 грм.) меда кладется 1 драхма (4,0 грм.) буры) смазываютъ ротъ маленькимъ дѣтскимъ отъ молочницы, также большимъ тяжелою формою лихорадки, у которыхъ сохнетъ и трескается слизистая оболочка рта и губъ. Розовая вода употребляется для глазныхъ примочекъ.

Розалія, см. Штокъ-роза (*Althaea rosea* Cav.).

Розга

Розга золотая } см. Золотая розга (*Solidago Virgaurea* L.).

Розета, см. Резеда душистая (*Reseda odorata* L.).

Розета полевая, см. Незабудка болотная (*Myosotis palustris* With.).

Розка дикая, см. Звѣздчатка большая (*Stellaria Holostea* L.).

Розлопасть, см. Чистотѣль большой (*Chelidonium majus* L.).

Розмаринъ (*Rosmarinus officinalis* L.). Вѣчно-зеленяющій кустарникъ, съ сидящими линейными кожистыми листьями, снизу бѣловато-пушистыми, и съ синими цвѣтами, изъ семейства «губоцвѣтныхъ» (*Labiatae* Juss.), произрастающій на югѣ Европы. Культивируется часто въ садахъ, какъ декоративное растение. Листья его, отличающіеся сильнымъ ароматическимъ, напоминающимъ камфору, запахомъ, и цвѣты употребляются въ медицинѣ.

МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНІЕ. Листья розмарина содержатъ въ себѣ большое количество душистаго масла, немного горькаго и дубильнаго вещества.

Листья розмарина употребляются крайне рѣдко. Врачи выписываютъ ихъ для ароматическихъ ваннъ, а въ домашней медицинѣ отваръ листьевъ розмарина пьютъ, какъ средство, облегчающее боли при менструаціяхъ.

Розмариновое масло — сильное возбуждающее средство и употребляется только снаружи; масло ядовито, приемъ въ 40—60 капель можетъ повлечь за собою тяжелые припадки отравленія и даже смерти.

Розмариновое масло входитъ въ составъ жидкихъ втираній, мазей, пластырей, употребляется для ваннъ, какъ средство противъ ревматизма и противъ паралича, также употребляется для втираній отъ чесотки. Запахъ растертаго ладонями масла, попадая въ глаза, дѣйствуетъ на нихъ раздражающимъ образомъ и, по нѣкоторымъ наблюденіямъ, увеличиваетъ зрительную способность. Розмариновое масло въ большомъ употребленіи для приготовленія косметическихъ средствъ; оно входитъ въ составъ многихъ эссенцій и мазей, рекомендуемыхъ, какъ универсальныя средства отъ нервныхъ болѣй, ревматизма и подагры.

Въ ветеринарной практикѣ розмариновое масло употребляется только въ тѣхъ-же случаяхъ, какъ и масло лавендулы.

Розмаринъ лѣсной, см. Багульникъ болотный (*Ledum palustre* L.).

Розмаринъ полевой, см. Ленъ дикій (*Linaria vulgaris* Mill.).

Рознопасть, см. Чистотѣль большой (*Chelidonium majus* L.).

Розовое дерево (*Convolvulus scorpiarius* L.). Кустарникъ, произрастающій на Канарскихъ островахъ. Изъ древесины добывается розовое масло (*Oleum Rhodii*), которое часто подмѣшиваютъ къ настоящему розовому маслу. Древесина-же, издающая при треніи запахъ розы, употребляется на токарныя издѣлія.

Розопасль, см. Аютины глазки (*Viola tricolor* L.).

Розопасль }

Розопасль } см. Чистотѣль большой (*Chelidonium majus* L.).

Розопасль }

Розопасль, см. Недотрога желтая (*Impatiens noli me tangere* L.).

Розторопша, см. Остро-пестрая трава (*Silybum Marianum* Gärtn.).

Розходникъ, см. Толокнянка обыкновенная (*Arctostaphylos officinalis* Moench.).

Ройникъ дикій, см. Заячья капуста (*Sedum Telephium* L.).

Рокетъ, см. Рокетъ блестящій (*Hypnum splendens* Hedw.).

Рокетъ блестящій (*Hypnum splendens* Hedw.). Волосовая ручейная трава, Мохъ болотный, Мохъ сучковый, Рокетъ. Одинъ изъ самыхъ крупныхъ и красивыхъ мховъ, съ сильно развѣтвленнымъ стеблемъ и перисто-расположенными вѣточками. Распространенъ въ лѣсахъ.

Романецъ, см. Цминъ (*Helichrysum arenarium* DC.).

Романекъ-зеле, см. Ромашка собачья (*Matuta Cotula* DC.).

Романецъ, см. Ромашка обыкновенная (*Matricaria Chamomilla* L.).

Романецъ бѣлый, см. Поповникъ обыкновенный (*Chrysanthemum Leucanthemum* L.).

Романина, см. Тысячелистникъ обыкновенный (*Achillea Millefolium* L.).

Романица бѣлая, см. Поповникъ обыкновенный (*Chrysanthemum Leucanthemum* L.).

Романка, см. Пунавка красильная (*Anthemis tinctoria* L.).

Романки бѣлые, см. Поповникъ обыкновенный (*Chrysanthemum Leucanthemum* L.).

Романникъ, см. Цинна (*Tanacetum vulgare* L.).

Романова трава, см. Ромашка обыкновенная (*Matricaria Chamomilla* L.).

Романовъ цвѣтъ, см. Поповникъ обыкновенный (*Chrysanthemum Leucanthemum* L.).

Романовъ цвѣтъ, см. Чихотная трава (*Ptar mica vulgaris* DC.).

Романокъ, см. Поповникъ обыкновенный (*Chrysanthemum Leucanthemum* L.).

Романъ (*Anacyclus officinarum* Hayne). Фармацевтическое названіе: *Purethrum commune* s. *germanicum*. *Dentaria*. Иванъ головастый. Однолѣтнее травянистое растение изъ семейства «сложноцвѣтныхъ» (*Compositae* Adans.), происхожденіе неизвѣстно, разводится въ Германіи, въ нѣкоторыхъ мѣстахъ южной и юго-западной Россіи, немного пушистое; стебель простой или вѣтвистый; листья продолговатые, двояко перисто-разсѣченные, съ пальными или 2—3-раздѣльными сегментами. Корзинки цвѣтовъ довольно крупныя, на немного къверху утолщенныхъ ножкахъ; обертка перистико-пушистая. Цвѣтоложе выпуклое, покрытое клиновидно-обратно-яйцевидными прицвѣтниками; краевые цвѣтки язычковые (женскіе)—бѣлые, снаружи красноватые, расположенныя въ одинъ рядъ; срединныя обоюполовыя—съ впянутой грубочкой, желтыя. Плодъ—сѣмянки, краевыя—съ широкими не просвѣчивающими крыльями, внутреннія—4-хгранныя.

Медицинское употребленіе. Корни «*purethrum commune*» содержатъ въ себѣ слѣды душистаго масла, мягкую смолу, желтое экстрактивное красящее вещество «*инулинъ*». Самое сильно дѣйствующее вещество заключается въ коркѣ корня; пыль корня

очень раздражаетъ глаза. Корень имѣетъ раздражающее дѣйствіе на слизистыя оболочки и усиливаетъ отдѣленіе слюны; онъ употребляется для полосканій отъ зубной боли, имѣетъ въ нюхательный порошокъ для возбужденія чиханія. Внутрь прежніе врачи назначали его отъ тифа, паралича и ревматизма, теперь внутренніе прѣмы вполнѣ оставлены. Цвѣты растенія, высушенные и растерты въ порошокъ, входятъ въ составъ жидкостей и порошковъ отъ паразитовъ.

Романъ, см. Ромашка обыкнов. (*Matricaria Chamomilla* L.).

Романъ, см. Поповникъ непахучій (*Matricaria inodora* L.).

Романъ } см. Поповникъ обыкновенный (*Chrysanthemum Leucanthemum* L.).

Романъ бѣлый } см. Поповникъ непахучій (*Matricaria inodora* L.).

Романъ великій, см. Поповникъ обыкновенный (*Chrysanthemum Leucanthemum* L.).

Романъ-зелье, см. Пулавка полевая (*Anthemis arvensis* L.).

Романъ красный, см. Пулавка красильная (*Anthemis tinctoria* L.).

Ромашекъ } см. Пижма (*Tanacetum vulgare* L.).

Ромашка, см. Тысячелистникъ обыкновенный (*Achillea Millefolium* L.).

Ромашка, см. Ромашка обыкновенная (*Matricaria Chamomilla* L.).

Ромашка большая, см. Поповникъ обыкновенный (*Chrysanthemum Leucanthemum* L.).

Ромашка боровая, см. Пулавка красильная (*Anthemis tinctoria* L.).

Ромашка бѣлая, см. Поповникъ обыкновенный (*Chrysanthemum Leucanthemum* L.).

Ромашка бѣлая лекарственная, см. Ромашка римская (*Anthemis nobilis* L.).

Ромашка вонючая, см. Ромашка собачья (*Maruta Cotula* Dc.).

Ромашка дикая, см. Поповникъ обыкновенный (*Chrysanthemum Leucanthemum* L.).

Ромашка дикая, см. Ромашка собачья (*Maruta Cotula* Dc.).

Ромашка дикая, см. Поповникъ непахучій (*Matricaria inodora* L.).

Ромашка желтая, см. Пулавка красил. (*Anthemis tinctoria* L.).

Ромашка кошачья, см. Пулавка полевая (*Anthemis arvensis* L.).

Ромашка красная, см. Ромашка персидская (*Pyrethrum carneum* Brst.).

Ромашка мелкая, см. Поповникъ непахучій (*Matricaria inodora* L.).

Ромашка обыкновенная (*Matricaria Chamomilla*, sin. *Chamaemelum vulgare*). Фармацевтическое названіе: *Chamaemelum vulgare*, *Chamonilla vulgaris* (Herba) s. minor, s. nostralis. Рупальница (Волг.). Маточная трава, Маточникъ Маточница, Моргунъ, Ромашка (общеупотр.), Ромень (Малор.). Романъ, Ромашова трава, Ромень, Романецъ, (Вол., Подол.), Румянка

(Екат.), Румянокъ (Малор.), Сосонька (Тамб.), Сильно пахучая однолѣтняя трава изъ семейства «сложноцвѣтныхъ» (*Compositae* Adans.), распространенная почти по всей Европѣ и во всей Россіи. Стебель выш. $3\frac{1}{2}$ — 7 вершк. Листья двоякоили тройко-перисто-разсѣченные, съ узко-линейными долями. Корзинки цвѣтовъ средней величины, одиночныя, съ красвыми язычковыми женскими и срединными обоимъ половымъ трубчатыми желтыми цвѣтами. Цвѣтоложе цилиндрической формы, полое. Обертка корзинки полушаровидная, изъ прижатыхъ черепичатыхъ, по краямъ перепончатыхъ, листочковъ. Внѣшнѣе въ срединныхъ желтыхъ цвѣтахъ трубчатый, въ красвыхъ—язычковый; тычинокъ 5. Завязь нижняя, одногнѣздная, односѣмянная, съ однимъ столбикомъ, лопасти котораго при-тупленныя и кистистыя. Плодъ — согнутыя сѣмянки съ 5 ребрышками на внутренней сторонѣ, покрытыя железистыми точками, безъ хохолка. Цвѣтетъ лѣтомъ. Растетъ на поляхъ и на сорныхъ мѣстахъ. Употребляется въ медицинѣ, почему нерѣдко разводится на поляхъ (въ Россіи напр., въ московской губ.) (Табл. XI, фиг. 226.)

МЕДИЦИННОЕ УПОТРЕБЛЕНІЕ. Ромашка—весьма древнее медицинское средство, которое было извѣстно египетскимъ жрецамъ. По наблюденіямъ древне-греческихъ врачей, ромашка имѣетъ свойства успокаивать были и судороги, дѣйствовать возбуждающимъ и укрѣпляющимъ образомъ, излечиваетъ лихорадку и разрывающаго воспаленія въ кожѣ. Противолихорадочное свойство ромашки зависитъ отъ большого количества горькаго вещества, содержащагося въ ея цвѣтахъ; при кипяченіи ромашки вся ея горечь остается въ осадкѣ и въ растворъ не переходитъ, вслѣдствіе этого растворъ противолихорадочныхъ свойствъ не имѣетъ; поэтому при перемежающейся лихорадкѣ, не поддающейся хинину, врачи пробовали давать больнымъ мелко-истолченные высушенные цвѣты ромашки, которые иногда приносили желаемую пользу.

Въ медицинѣ одинаково употребляются какъ цвѣты ромашки обыкновенной, такъ и римской. Обыкновенная ромашка считается слабѣе по своему дѣйствію. Въ настоящее время врачи прописываютъ отваръ ромашки только для наружнаго употребленія, для полосканій горла, обмываній и клистировъ вмѣсто воды, для приемовъ внутрь ромашка пользуется большимъ довѣріемъ въ домашнемъ быту и охотно дается акушерками новорожденнымъ дѣтямъ отъ вздутия живота.

Цвѣты ромашки собираются въ іюнѣ и въ іюлѣ во время цвѣтенія. Цвѣты отрѣзаютъ у самаго основанія, кладутъ тонкими слоями и высушиваютъ на воздухѣ. Важно собирать цвѣты въ сухую погоду и не оставлять ихъ долго въ мѣшкахъ вмѣстѣ, потому что они быстро начинаютъ бродить. Высушенные цвѣты также не должны плотно набиваться въ содержащую ихъ посуду и обязательно должны стоять въ сухомъ мѣстѣ.

Цвѣты ромашки содержатъ въ себѣ эфирное масло, экстрактивные вещества и смолу. Дѣйствующимъ веществомъ ромашки считается ромашковое масло.

Въ домашнемъ быту отваръ ромашки готовится изъ 2,0—10,0 грм. ($\frac{1}{2}$ драхмы до $2\frac{1}{2}$ драхм.) сушеныхъ цвѣтовъ ромашки, на 1 стаканъ кипятка; такой отваръ пьется глотками, или же столовыми ложками черезъ 2 часа, отъ болей въ желудкѣ, отъ скопленія газовъ и отъ судорогъ; цѣлыми стаканами теплый отваръ ромашки принимается, какъ потогонное средство, при лихорадкѣ отъ простуды.

Въ аптекахъ готовятъ: ромашковую воду, экстрактъ ромашки и ромашковое масло. Всѣ эти вещества почти не употребляются. Въмѣсто ромашковой воды можетъ идти въ употребленіе приготовленный отваръ ромашки. Масло же ромашки считается очень дорогимъ средствомъ. Для наружныхъ обмываній сушеные цвѣты ромашки завариваютъ, какъ чай, и въ процеженномъ видѣ употребляютъ для полосканія горла, при краснотѣ въ горлѣ и боли при глотаніи, для промыванія ушей при гноетеченіи, для полосканія рта отъ зубной боли, для клистировъ и для ваннъ. Ванны изъ отвара ромашки дѣлаютъ маленькимъ дѣтямъ, страдающимъ безсонницей; для этого берутъ хорошую горсть ромашки, завариваютъ ее и ставятъ на горячее мѣсто, чтобы настоялась, затѣмъ процеживаютъ въ ванну. Для полосканій въ отваръ ромашки прибавляютъ борной кислоты, на стаканъ воды отъ $\frac{1}{2}$ до одной чайной ложки.

Въ гомеопатіи ромашка употребляется очень часто. Изъ свѣжихъ цвѣтовъ ромашки выжимается сокъ и смѣшивается со спиртомъ. Дается гомеопатами ромашка беременнымъ и роженницамъ, дѣтямъ при разстройствѣ желудка и при судорогахъ. Кроме того, ромашка употребляется отъ болей въ желудкѣ и печени, отъ поносовъ, маточныхъ кровотеченій, болей внизу живота, лихорадки, болей въ мочевомъ пузырьѣ, различныхъ, нервныхъ разстройствъ, какъ-то безсонницы, отъ злоупотребленія табакомъ и кофе; снаружи вода съ ромашкой служитъ для обмыванія глазъ, полосканія горла и для примочекъ отъ рожистаго воспаленія кожи. Даютъ 1—2 капли чистой настойки или 1-го, 2-го, 3-го разведенія 1—2 раза въ день или чаще, смотря по обстоятельствамъ.

Въ ветеринарной практикѣ ромашка употребляется довольно часто въ тѣхъ случаяхъ, когда заболѣваніе держится на первой почвѣ, при различныхъ судорогахъ, при судорожной задержкѣ мочи, при неправильныхъ родовыхъ боляхъ, при чумѣ у собакъ, сопровождающейся судорогами или параличами, при судорогахъ въ груди у лошадей, при желтухѣ у рогатаго скота и при параличѣ овецъ.

Какъ слабо дѣйствующее средство, отваръ ромашки помогаетъ только въ началѣ болѣзни. Больнымъ домашнимъ животнымъ дается отъ 30,0—60,0 грам. ромашки (1 унца до 2 унцъ) въ отварѣ сразу, или же раздѣльными порціями; овцамъ и свиньямъ отъ 7,0—20,0 грм. ($\frac{1}{2}$ драх. до 5-ти драхмъ), собакамъ отъ 2,0—12,0 грм. ($\frac{1}{2}$ драхмы до 3-хъ драхмъ). Часто ромашку соединяютъ съ корнемъ валеріаны, съ опиумомъ, камфорой, спиртомъ и скипидаромъ. Снаружи порошкомъ ромашки посыпаютъ животнымъ

пахучія раны; также изъ нея дѣлають сухія и мокрыя припарки и обмыванія.

Въ ветеринарной гомеопатіи ромашка употребляется въ тѣхъ-же случаяхъ.

Ромашка персидская (*Pyrethrum carneum* Brst. et ruseum W. B.) Ромашка красная, Блохморъ, Клеповая трава. Трава-Блохъ. Многолѣтняя трава изъ семейства «сложноцвѣтныхъ» (*Compositae* Adans.), произрастающая на высотахъ Кавказа, въ гористыхъ странахъ Персіи, съ голымъ стеблемъ, съ перистыми листьями и красными цвѣтами. Съ большимъ успѣхомъ культивируется для садовъ во Франціи, Голландіи и Германіи. Высушенные и потомъ растертые и размолотые цвѣты доставляютъ желтовато-красный общеизвѣстный персидскій, или кавказскій порошокъ, употребляемый для истребленія блохъ и другихъ насѣкомыхъ, на которыхъ онъ дѣйствуетъ одуряющимъ образомъ.

Ромашка пещья } см. Ромашка собачья (*Maruta Cotula* Dc.).
Ромашка полевая }
Ромашка полевая, см. Поповникъ непахучій (*Matricaria inodora* L.).

Ромашка полевая, см. Поповникъ обыкновенный (*Chrysanthemum Leucanthemum* L.).

Ромашка польная, см. Пулавка красильная (*Anthemis tinctoria* L.).

Ромашка римская (*Anthemis nobilis* L.). Фармацевтическое названіе: *Chamaemelum romanum*, s. *nobile* (Flores). Марина, Маринна, Пулавка, Пуловникъ, Ромашка бѣлая лекарственная, Ромашка садовая, Роменъ, Румянокъ, Стопцвѣтъ, Хупавка. Многолѣтнее травянистое растение изъ семейства «сложноцвѣтныхъ» (*Compositae* Adans.), распространенное въ южной Европѣ. Стебель лежащій или ползучій, вѣтвистый, дл. отъ 3½—7 вершк. Листья двояко-перисто-разсѣченные, съ линейными цѣльными или 2—3-храздѣльными долями. Корзинки одиночныя, съ продолговато-коническимъ, покрытымъ ланцетовидными, тупыми, пленчатыми прицвѣтниками, цвѣтоложомъ, съ полушаровидной черепичатой оберткой и красивыми женскими язычковыми и срединными трубчатыми обоеполовыми цвѣтами. Пожки корзинокъ длинныя. Вѣнчикъ срединныхъ цвѣтовъ трубчатый, краевыхъ—язычковый. Завязь нижняя одногнѣздная, односѣмянная. Тычинокъ 5, съ снѣжными въ трубочку пыльниками, черезъ которую проходитъ столбикъ съ притупленнымъ на концахъ и кистистыми лопастями. Плодъ—обратно-яйцевидныя сѣмянки съ 3-мя ребрышками на внутренней сторонѣ, безъ хохолка. Понадается иногда на поляхъ въ юго-западныхъ губерніяхъ. Разводится для медицинской цѣли. (Табл. XL, ф. г. 227.)

МЕДИЦИННОЕ УПОТРЕБЛЕНІЕ. Дѣйствіе римской ромашки то-же, что и ромашки обыкновенной, она считается только болѣе сильной. Ромашка русская, см. Поповникъ непахучій (*Matricaria inodora* L.).

Ромашка садовая, см. Ромашка римская (*Anthemis nobilis* L.).
Ромашка собача, см. Ромашка собачья (*Maruta Cotula* Dc.).
Ромашка собачья (*Maruta Cotula* Dc., sin. *Anthemis Cotula* L.).
 Фармацевтическое назв.: *Chamomilla*, s. *Cotula foetida*, s. *Chamaemelum foetidum* (Flores). Грудница (Курск.), Глазь вороній, Пустодомъ (Ряз.), Ромашка собача, Ромашка песья, Ромашка ди-
 кая (Вор.), Ромашка полевая (Полт.), Ромашка вонючая, Ру-
 мянъ собачій, Румянокъ собачій, Роменъ собачій, Рамонъ
 собачій (Минск.), Зелъе-романекъ (Гродн.), Цвѣтъ собачій, Рамонъ
 (Могил.), Пулавка вонючая. Однолѣтнее травянистое растеніе
 изъ семейства «сложноцвѣтныхъ» (*Compositae* Adans.), распро-
 страненное почти во всей Европѣ и въ большей части Евро-
 пейской Россіи, покрытое желѣзистыми пятнами и при расти-
 раніи распространяющее противный запахъ. Стебель прямо-
 стоящій, вѣтвистый, выш. $3\frac{1}{2}$ —7 вершк. Листья двояко-пер-
 исто-разсѣченные, съ линейными или 2 — 3-храздѣльными до-
 лями. Корзинки средней величины, одиночныя, съ полушаровид-
 ной черенчатой оберткой, съ коническимъ, съ узкими щетинко-
 образными прицвѣтниками, цвѣтоложемъ, съ срединными труб-
 чатыми обоюполовыми и краевыми бѣлыми женскими цвѣ-
 тами. Вѣнчикъ срединныхъ цвѣтовъ трубчатый, краевыхъ—
 язычковый. Тычинокъ 5; завязь нижняя одногнѣздная, одно-
 сѣмянная, съ однимъ столбикомъ, оканчивающимся притуплен-
 ными, кистистыми лопастями. Плодъ—продолговатый, бугорча-
 тый, ребристый сѣмянки, безъ хохолка. Сорная трава, произро-
 стающая на поляхъ и по берегамъ рѣкъ. Цвѣтетъ во второй
 половинѣ лѣта. (Рис. 252.)

МЕДИЦИННОЕ УПОТРЕБЛЕНІЕ. Прежде растеніе употреблялось
 отъ истерики, ломоты, гнестовъ и лихорадки, въ настоящее время
 совсѣмъ оставлено.

Ромашка собачья, см. Поповникъ непахучій (*Matricaria ino-
dora* L.).

Ромашка шпанская, см. Калугеръ (*Tanacetum Balsamita* L.).

Ромекъ, см. Визель разноцвѣтный (*Coronilla varia* L.).

Роменъ, см. Пулавка красильная (*Anthemis tinctoria* L.).

Роменъ, см. Пулавка полевая (*Anthemis arvensis* L.).

Роменъ, см. Поповникъ обыкн. (*Chrysanthemum Leucanthemum* L.).

Роменъ, см. Ромашка обыкновенная (*Matricaria Chamomilla* L.).

Роменъ, см. Поповникъ непахучій (*Matricaria inodora* L.).

Роменъ, см. Ромашка римская (*Anthemis nobilis* L.).

Роменъ-зиллѣ, см. Поповникъ обыкновенный (*Chrysanthemum
Leucanthemum* L.).

Роменъ собачій, см. Ромашка собачья (*Maruta Cotula* Dc.).

Роса свияча, см. Просвирикъ лѣсной (*Malva silvestris* L.).

Ропалка, см. Ханьки (*Cucurbita ovifera* L.).

Роса Вожья, см. Жидовникъ обыкновенный (*Tamarix gallica* L.).

Роса Вожья, см. Росянка круглолист. (*Drosera rotundifolia* L.).

Роса каменная, см. Кочедыжникъ коричневый (*Asplenium Tri-
chomanes* L.).

- Роса каменная**, см. Звѣздочка водяная (*Callitriche verna* L.).
- Роса солнечная**, см. Росянка круглолистная (*Drosera rotundifolia* L.).
- Росадникъ**, см. Ласточникъ обыкновенный (*Vincetoxicum officinale* L.).
- Росица** } см. Росянка круглолистная (*Drosera rotundifolia* L.).
- Росичка** }
- Росичка**, см. Манжетка обыкновенная (*Alchemilla vulgaris* L.).
- Росичка**, см. Росичка червонная (*Panicum sanguinale* L.).
- Росичка червонная** (*Panicum sanguinale* L.). Фармацевтическое назв.: *Gramen sanguinale*, *Gramen Mannae* (Semen). Манна-трава. Польшатка, Мохаръ, Росичка. Однолѣтнее травянистое растение изъ семейства «злаковыхъ» (*Gramineae* Juss.), распространенное въ средней и южной Европѣ, въ западной и южной Россіи, часто съ краснобурнымъ или фіолетовымъ отбѣнкомъ. Стебель развѣтвленный, приподнимающійся, обыкновенно при основаніи колѣнчато-согнутый, выш. 7—16 вершк. Листья и ихъ влагалища покрыты волосками. Листья ланцетно-линейные. Соплѣтіе состоитъ изъ 3 колосообразныхъ вѣтвей, собранныхъ пучкомъ на верхушкѣ стебля. Колоски въ колосьяхъ парные, расположены кольчато. Одинъ колосокъ сидячій или почти сидячій, другой съ ножкой. Околоцвѣтныхъ чешуй 2; тычинокъ 3; столбиковъ 2, несущихъ красныя перистыя рыльца, выставляющіяся близъ верхушки колосеви. Плодъ — эллиптическое, сжатое немного со спинки, зерно. Цвѣтетъ въ іюль и августъ. Растетъ на песчаныхъ поляхъ. Разводится преимущественно въ среднихъ и западныхъ губерніяхъ Европейской Россіи ради зеренъ, изъ которыхъ получается крупа, идущая на кашу и супъ. (Рис. 253.)
- Росички**, см. Росянка круглолистная (*Drosera rotundifolia* L.).
- Росникъ обыкновенный** } см. Манжетка обыкновенная
- Росица** } (*Alchemilla vulgaris* L.).
- Росноладонное дерево**, см. Бензойное дерево (*Benzoin officinale* Науп.).
- Ростилъ**, см. Лисохвостъ колѣнчатый (*Alopecurus geniculatus* L.).
- Ростильникъ**, см. Сушеница болотная (*Gnaphallum uliginosum* L.).
- Роститка**, см. Лапчатка серебристая (*Potentilla argentea* L.).
- Ростъ**, см. Кирказонъ обыкновенный (*Aristolochia Clematitis* L.).
- Ростокащъ** } см. Чистотѣль большой (*Chelidonium majus* L.).
- Ростопачъ** }
- Ростопыръ**, см. Лапчатка серебристая (*Potentilla argentea* L.).
- Рострогъ**, см. Дубровникъ обыкновенный (*Teucrium Chamaedrys* L.).
- Росходникъ**, см. Будра плющевидная (*Glechoma hederacea* L.).
- Росянка**, см. Манжетка обыкновенная (*Alchemilla vulgaris* L.).
- Росянка**, см. Росянка круглолистная (*Drosera rotundifolia* L.).
- Росянка круглолистная** (*Drosera rotundifolia* L.). Фармацевтическое назв.: *Ros solis* s. *Rosella*. Царевы очи, Роса солнеч-

ная, Роса Божья (Малор.), Росичка, Росички, Росянка, Росица, Любимъ-трава. Насѣкомоядное болотное многолѣтнее травянистое растеніе изъ семейства «росянковыхъ» (Droseraceae DC.), распространенное во всей Европѣ, въ средней и южной Россіи и въ Сибири. Прикорневые листья съ округлой пластинкой, простертые, съ длинными черешками, расположены розеткой. Цвѣточный стебель, выш. $2\frac{1}{2}$ —5 вершк., несетъ кисть бѣлыхъ цвѣтовъ. Чашелистиковъ, лепестковъ и тычинокъ по 5; коробочка 3-хъстворчатая, съ 3-мя двураздѣльными столбиками. Листья растенія приспособлены для ловли мелкихъ насѣкомыхъ. Округлая пластинка листа, сидящая на длинномъ черешкѣ, усажена по краямъ и на верхней поверхности красными железистыми волосками, состоящими изъ болѣе или менѣе длинной ножки и шаровидной железки, выделяющей клейкую жидкость. Насѣкомое, случайно попавшее на листъ, прилипаетъ къ липкимъ волоскамъ; подъ вліяніемъ раздраженія, производимаго животной пищей, жидкость железокъ становится кислой. Раздраженіе это постепенно передается на близъ лежащіе волоски, которые наклоняются въ сторону пойманной жертвы до соприкосновенія съ нею. Когда все удобоперевариваемыя вещества животного растворятся въ кислой жидкости и будутъ всосаны листомъ, волоски выпрямляются и растеніе принимаетъ первоначальное положеніе. Цвѣтетъ во второй половинѣ лѣта. Растетъ на торфяныхъ болотахъ.

МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНІЕ. Растеніе безъ запаха, имѣетъ горько-кислый очень острый вкусъ. Собирается растеніе во время цвѣтенія въ іюлѣ и августѣ. Изъ него готовится спиртная настойка, или-же оно высушивается въ тѣнистомъ мѣстѣ. Дѣйствующее начало растенія неизвѣстно. Въ медицинѣ оно не употребляется и извѣстно только, какъ народное средство отъ страданія легкихъ, лихорадки и водянки. Снаружи жидкостью изъ железокъ смазываютъ бородавки. Древніе врачи употребляли росянку при тѣхъ-же болѣзняхъ. Извѣстная въ свое время «золотая вода» имѣла въ своемъ составѣ это растеніе. Въ Италіи росянка идетъ для приготовленія сиропа подъ именемъ «rosoglio».

Въ гомеопатіи росянка славится въ послѣднее время, какъ средство, успокаивающее и укорачивающее приступы коклюшного кашля. Кроме того, она дается отъ крупы, кровохарканія, охриплости, горловой чахотки и перемежающейся лихорадки. Принимаютъ 1—2 капли чистой настойки или 1-го, 2-го разведенія 2 раза въ день, иногда и чаще.

Въ ветеринарной гомеопатіи растеніе дается въ тѣхъ-же случаяхъ.

Ротечникъ, см. Ярутка полевая (*Thlaspi arvense* L.).

Рохкачи, см. Морюшка (*Rubus Chamaemorus* L.).

Рошобая, см. Дрема кукушкинъ цвѣтъ (*Lychnis flos cuculi* L.).

Рубанка, см. Махорка (*Nicotiana rustica* L.).

Руда свинцовая, см. Свинцовка (*Plumbago europaea* L.).

Руденецъ, см. Бородавникъ обыкновен. (*Lampsana communis* L.).

Рудометка, см. Тысячелистникъ обыкновен. (*Achillea Millefolium* L.).
Ружа полевая, см. Геравь луговая (*Geranium pratense* L.).
Румъянчикъ, см. Румянка лекарственная (*Anchusa officinalis* L.).

Румяна, см. Спякъ красный (*Echium rubrum* L.).

Румяна

Румяна бабы } см. Бараній языкъ (*Onosma echinoides* L.).

Румяна двѣичья, см. Бѣлогловка (*Trifolium montana* L.).

Румянило, см. Очитокъ острый (*Sedum acre* L.).

Румяница, см. Бараній языкъ (*Onosma echinoides* L.).

Румянка, см. Румянка лекарственная (*Anchusa officinalis* L.).

Румянка, см. Спякъ обыкновенный (*Echium vulgare* L.).

Румянка, см. Спякъ красный (*Echium rubrum* L.).

Румянка, см. Ромашка обыкновен. (*Matricaria Chamomilla* L.).

Румянка, см. Бараній языкъ (*Onosma echinoides* L.).

Румянка, см. Грушанка круглолистная (*Pirola rotundifolia* L.).

Румянка лекарственная (*Anchusa officinalis* L.). Фармацевтическое назв.: *Buglossum* v. *Lingula bovis* (Rad., Hb. et Flores).
 Анютины глазки (Харьк., Черн.), Медунца полевая (Умань), Медунка, т.-е., Медунка (Вол.), Меденишникъ (Полт.), Заячій салатъ (Гродн.), Лазорикъ (Ниж.), Незабудка (Пет.), Галочка (Тавр.), Свинюшникъ (Полт.), Ранникъ (Полт.), Влекота (Курск.), Кушнень (Курск.), Слѣпота (Полт.), Образки, Утичьи гнѣздышки (Вят.), Ослыныя уста, Буглосса (Ниж.), Буглазъ, Глазобужникъ, Буглоссова трава, Бычій язычекъ трава, Бычачій язычекъ, Воловий языкъ, Воловикъ аптекарскій, Воловикъ, Вологловка, Красный корень, Цареградскій красный корень, Румянка (Малор.), Румяный корешокъ (Даль), Червяница, Румъянчикъ (Малор.). Жестко-шершавое двулѣтнее или многолѣтнее травянистое растение изъ семейства «бурачниковыхъ» (*Boraginaceae* Juss.), распространенное въ Европѣ, исключая крайняго сѣвера, въ западной, средней и южной Россіи, выш. 7—14 вершк. Листья ланцетные; нижніе сужены въ черешекъ, верхніе—сидячіе. Цвѣты въ метельчато-сложныхъ завиткахъ. Чашечка до середины 5-тираздѣльная, съ ланцетными, острыми долями, при плодахъ увеличенная, колокольчатая; вѣнчикъ ворончато-колокольчатый, съ тупыми бархатными длинными яйцевидными чешуйками въ зѣвѣ, съ прямой трубкой, съ 5-лопастнымъ отгибомъ, сперва красновато-фіолетовымъ, потомъ голубымъ. Тычинокъ 5. Завязь верхняя, 4-гнѣздная, 4-лопастная; столбикъ съ 2-раздѣльнымъ рыльцемъ. Плодъ при созрѣваніи распадается на 4 косыхъ, яйцевидныхъ, сѣтчато-морщинистыхъ, бугорчатыхъ орѣшка, при основаніи со складчатымъ клечкомъ. Цвѣтетъ съ мая до осени. Растетъ на поляхъ и на сорныхъ мѣстахъ. Листья употребляются для окрашиванія въ зеленый цвѣтъ. (Табл. XII, фиг. 229.)

Медицинское употребленіе. Корень растения (главнымъ образомъ, его корня) содержитъ въ себѣ красящее вещество, легко-растворяющееся въ различныхъ маслахъ, окрашивая ихъ въ кра-

сивый красный цвѣтъ. Краска эта совершенно безвредная, по тому и употребляется въ аптекахъ и парфюмерныхъ фабрикахъ для окрашиванія различныхъ помадъ и жидкостей. Для внутренняго употребленія растение не примѣняется.

Румянная трава, см. Бараній языкъ (*Onosma echlroides* L.).

Румянникъ, см. Снякъ обыкновенный (*Echium vulgare* L.).

Румяница, см. Воробейникъ обыкновенный (*Lithospermum arvense* L.).

Румянокъ, см. Ромашка обыкновен. (*Matricaria Chamomilla* L.).

Румянокъ, см. Пунавка полевая (*Anthemis arvensis* L.).

Румянокъ, см. Ромашка римская (*Anthemis nobilis* L.).

Румянокъ лѣсной, см. Циновникъ обыкновенный (*Chrysanthemum Leucanthemum* L.).

Румянъ собачій, см. Ромашка собачья (*Maruta Cotula* Dc.).

Румяный корешокъ, см. Румянка лекарственная (*Anchusa officinalis* L.).

Рунишко овечье, см. Вѣтвеница лѣсная (*Anemone silvestris* L.).

Руппія морская (*Ruppia maritima* L.). Многолѣтнее водяное травянистое растение изъ семейства «найядовыхъ» (*Najadaceae* Benth.), распространенное въ Европѣ и произрастающее въ водѣ у береговъ Балтійскаго, Чернаго и Каспійскаго морей. Стебель ползучій, вѣтвистый, съ очередными витевидными, при основаніи влагалищными, листьями. Короткія пазушныя цвѣтоножки несутъ по большей части по 2 обоюполовыхъ цвѣтка, послѣ цвѣтенія значительно удлиняются и иногда спирально закручиваются. Околоцвѣтника нѣтъ. Тычинокъ 2, съ сидячими пыльниками; пестикъ состоитъ изъ 4-хъ плодolistиковъ, сперва сидячихъ, а во время плодоозрѣванія на длинныхъ ножкахъ. Рыльце почти сидячее. Плодъ состоитъ изъ косо-яйцевидныхъ костянокъ. Цвѣтетъ во второй половинѣ лѣта. (Рис. 254.)

Русаянка, см. Дягиль лѣсной (*Angelica silvestris* L.).

Рута, см. Манжетка обыкновенная (*Alchemilla vulgaris* L.).

Рута, см. Рута пахучая (*Ruta graveolens* L.).

Рута, см. Рута горная (*Asplenium Ruta muraria* L.).

Рута горная, см. Рута дикая (*Peganum Harmala* L.).

Рута горная (*Asplenium Ruta muraria* L.). Фармацевтическое названіе: *Ruta muraria*, s. *Adiantum album*, *Paronychia* (Herba.). Бѣлый женскій волосъ, Рута скальная, Рута настѣнная, Многоголовникъ, Зелѣ многоглазое, Рута. Многолѣтнее травянистое папоротниковоое растение изъ семейства «полюподіевыхъ» (*Polypodiaceae* R. Br.), распространенное въ Европѣ, Азии и въ гористыхъ мѣстностяхъ Россіи. Листья мелкие, въ очертаніи, болѣею частью, яйцевидные, на довольно длинныхъ черешкахъ, дважды-перисто-разсѣченные, зимующіе. Сегменты—на черешкахъ; ихъ доли кленовидныя или ромбическія, наверху зубчатыя. Кучки спорангіевъ (т. е., выстиліща со спорами) линейныя, по 2—5 на доль, подъ конецъ сливающіяся между собою. Покрывало лопастное, неправильно зубчатое. Растетъ въ расщѣлинахъ камней и утесовъ. (Рис. 255.)

Рута дикая, см. Дымянка лекарственная (*Fumaria officinalis* L.).
Рута дикая (*Peganum Harmala* L.). Фармацевтическое название: *Ruta silvestris* v. *Harmala*. Вибика (Астр.), Гармала, Демопесье (Северг.), Рута черная, Рута горная, Сьлотникъ, Стрелина, Юзерликъ, Юзерлюнъ. Многолѣтнее травянистое голое весьма вѣтвистое растеніе изъ семейства «рутовыхъ» (*Rutaceae* Juss.), распространенное въ южной Европѣ и Россіи, въ Крыму Кавказѣ, Туркестанѣ и Прикаспійскихъ степяхъ. Листья спиральные, съ маленькими шиловидными прилистниками, до основанія тройственные, или верхніе—3-храздѣльные, съ цѣльными или однажды, или же двояко-2—3-храздѣльными сегментами и съ линейными острыми расходящимися участками. Цвѣты желтые верхушечные, потомъ супротивные листьямъ. Чашечка остающаяся, глубоко-5-тираздѣльная; чашелистики травянистые цѣльные, иногда 3-храздѣльные, линейные. Лепестковъ столько же, желтыхъ, продолговатыхъ, длиннѣе чашелистиковъ. Тычинокъ 15, съ расширенными при основаніи нитями и линейными пыльниками. Столбикъ 3-хгранный. Плодъ—приплюснутый шаровидная, 3-хгнѣздная, 3-хстворчатая коробочка. Цвѣтетъ въ началѣ лѣта. Растетъ на сорныхъ мѣстахъ и на холмахъ. Изъ сѣмянъ добывается прекрасная красная краска, употребляемая для окрашиванія турецкихъ фесокъ. Сѣмена прежде имѣли большое употребленіе въ медицинѣ, отъ болѣзни глазъ и какъ потогонное, усыпительное и противуглистное средство, Они дѣйствуютъ возбуждающимъ образомъ на человѣка. Въ Бухарѣ сѣменами окуриваютъ новорожденныхъ животныхъ и дѣтей. Бухарскіе дувалы (юродивые) одуряютъ себя дымомъ этихъ сѣмянъ. Почетному гостю также бросаютъ горсть ихъ въ жаровню.

Медицинское употребленіе почти оставлено. Растеніе содержитъ въ себѣ эфирное масло и кристаллы рутиновой кислоты, считается средствомъ возбуждающимъ, вызывающимъ отдѣленіе крови, дается, какъ горькое средство, для возбужденія отдѣленія желудочнаго сока, также какъ глистогонное. Чаще рута идетъ для приготовленія наружныхъ средствъ; въ аптекахъ существуютъ рутовая вода и бальзамъ.

Рута козья трава (*Galega officinalis* L.). Фармацевтическое название: *Galega* v. *Ruta capraria*. Козлятникъ, Козья кишка, Рutowка. Многолѣтнее травянистое растеніе изъ семейства «мотыльковыхъ» (*Papilionaceae* L.), распространенное въ средней и южной Европѣ, въ юго-западной и южной Россіи, въ Крыму и на Кавказѣ. Стебель довольно высокій, вѣтвистый, приподнимающійся, въ углахъ немного согнутый колѣнчато. Листья непарно-перистые, съ 7—17 продолговатыми, узко-ланцетными, длинно-остроконечными листочками и полуорѣховидными прилистниками. Свѣтло голубые цвѣты собраны длинными, густыми кистями въ углахъ листьевъ; кроющіе прицвѣтники нитевидные, длиннѣе цвѣтоножки; чешечка колокольчатая, съ 5-ю почти равными шиловидными зубцами

- Вѣнчикъ мотыльковый (флагъ, крылья, тупая лодочка). Тычинокъ 10:9 сросшихся, 10-я (верхняя) на половину сросшаяся съ остальными. Столбикъ нитевидный голый. Плодъ—вверхъ стоящйе, линейные, двустворчатые, многосѣмянные бобы, съ косо полосатыми створками. Цвѣтеть лѣтомъ. Растетъ на влажныхъ мѣстахъ. Рекомендуются, какъ отличная кормовая трава.
- Рута луговая**, см. Василежникъ желтый (*Thalictrum flavum* L.).
- Рута настѣнная**, см. Рута горная (*Asplenium Ruta muraria* L.).
- Рута пахучая** (*Ruta graveolens* L.). Фармацевтическое названіе: *Ruta hortensis* s. *sativa*, s. *graveolens*, s. *latifolia* (Herba). Зимозеленъ (Гродн.). Рута. Сѣровато-зеленый полукустарникъ, съ сильнымъ ароматическимъ своеобразнымъ запахомъ, изъ семейства «рутовыхъ» (*Rutaceae* Juss.), распространенный въ средней и южной Европѣ, въ Россіи дико растетъ въ Крыму, выш. 7—12½ вершк. Листья очередные, двояко-и тройко-перисто-разсѣченные. Зеленовато-желтые цвѣты въ полузонтикахъ, собранныхъ въ вѣтвистыя соцвѣтїемъ на верхушкѣ стебля. Чашечка остающаяся, 4—5-тираздѣльная; лепестковъ 4—5, вогнутыхъ, къ ноготку суженныхъ. Тычинокъ 8—10; завязь 4—5-тилопастная. Плодъ—коробочка. Цвѣтеть лѣтомъ. Разводится въ въ юго-западномъ краѣ въ огородахъ и садахъ. Изъ травянистыхъ частей добываютъ сильно пахучее эфирное масло, молодые листья идутъ въ пищу. (Рис. 256.).
- Рута полевая**, см. Дымянка лекарств. (*Fumaria officinalis* L.).
- Рута полевая**, см. Гулявникъ струйчатый (*Sisymbrium Sophia* L.).
- Рута польная**, см. Лодвенецъ рогатый (*Lotus corniculatus* L.).
- Рута пташина**, см. Дымянка лекарств. (*Fumaria officinalis* L.).
- Рута птичья**, см. Дрочникъ тонкій (*Spartium junceum* L.).
- Рута скальная**, см. Рута горная (*Asplenium Ruta muraria* L.).
- Рута черная**, см. Рута дикая (*Peganum Harmala* L.).
- Рутка заячья**, см. Петрушка горная (*Peucedanum Oreoselinum* L.).
- Рутка полиова** } см. Дымянка лекарственная (*Fumaria officinalis* L.).
- Рутка пташина** } *palis* L.).
- Рutowка**, см. Рута козья трава (*Galega officinalis* L.).
- Ручка**, см. Кокушникъ (*Gymnadenia conopsea* Rich.).
- Ручка Соломоницина** } см. Кукушкины слезки (*Orchis mascula* L.).
- Ручка чертова** } *culata* L.).
- Ручки Божьи**, см. Первоцвѣтъ лекарственный (*Primula officinalis* Jacq.).
- Ручки Божьи**, см. Буквица лекарственная (*Betonica vulgaris* L.).
- Ручники**, см. Кокушникъ (*Gymnadenia conopsea* L.).
- Ручники зозулины**, см. Купена лекарственная (*Convallaria Polygonatum* L.).
- Рушнички зозулины**, см. Тафиникъ овальный (*Listera ovata* R. Br.).
- Рушнички зозулины**, см. Ятрышникъ широколистный (*Orchis latifolia* L.).

- Рущекъ, см. Метла, или мышій терпъ (*Ruscus aculeatus* L.).
 Рыжей, см. Рыжикъ полевнй (*Camelina sativa* Crantz.).
 Рыжикъ, см. Рѣдка дикая (*Raphanus Raphanistrum* L.).
 Рыжикъ, см. Рыжикъ полевнй (*Camelina sativa* Crantz.).
 Рыжикъ, см. Траванка лекарственная (*Dianthus deltoides* L.).
 Рыжикъ, см. Ленъ дикій (*Linaria vulgaris* Mill.).
 Рыжикъ (*Agaricus deliciosus* L.). Грибъ изъ семейства «шляпныхъ» (*Hymenomycetes*), встрѣчающійся въ сѣверной и средней Европѣ, въ средней и сѣверной Россіи. Шляпка слабо выиуклая или чаще вдавленная посрединѣ, оранжеваго или кирпично-краснаго цвѣта. Пластинки шафранно-желтаго цвѣта и содержатъ млечный сокъ. Встрѣчается въ рѣдкихъ хвойныхъ лѣсахъ. Употребляется въ пищу. (Табл. XLI, фиг. 232 и 233.)
 Рыжикъ полевнй (*Camelina sativa* Crantz.). Фармацевтическое назв.: *Camelina v. Myagrum, s. Sesamum vulgare* (Semen et Hb.). Городовуха (Нудожъ, Олон.), Жабникъ зеленый (Вят.). Кашка (Тамб.), Коровья трава, Мухоловка, Полевые очитки (Подол.), Рожь индійская, Рѣзь коровья, Рѣзь, Рѣзуха, Рѣзуха (Даль.), Рыжикъ, Рыжій, Рижій, Рыжей (Малор.), Рыжій ленъ. Однолѣтнее травянистое растение изъ семейства «крестоцвѣтныхъ» (*Cruciferae* Juss.), распространенное почти во всей Европѣ и во всей Россіи, выш. 7—14 вершк. Стебель простой или развѣтвленный. Самые нижніе листья черешковые, остальные—сидячіе продолговато-ланцетные, при основаніи стрѣловидные. Цвѣты блѣдно-желтые, мелкіе. Плоды—грушевидные стручки, широко-перегородчатые; носикъ стручка приростае къ одной изъ створокъ и при раскрываніи плода отпадаетъ вмѣстѣ съ ней. Цвѣтетъ съ мая до августа. Растетъ на поляхъ и въ посявахъ, и на сорныхъ мѣстахъ. Разводится, какъ масличное растение и у насъ, и за границей. Сессамовое масло идетъ на мыловарни для выдѣлки различныхъ сортовъ мыла, для смазыванія машинъ, для горѣнія и также для выдѣлки косметическихъ средствъ. Оно не годится только для приготовленія помады для волосъ; оно легко высыхаетъ въ волосахъ и дѣлаетъ ихъ твердыми. (Рис. 257.)
 Рыжій, см. Рыжикъ полевнй (*Camelina sativa* Crantz.).
 Рыжій, см. Сурѣница (*Brassica Rapa campestris* L.).
 Рыжуха, см. Клоповникъ (*Lepidium ruderae* L.).
 Рыжь, см. Рисъ полевнй (*Oryza sativa* L.).
 Рыло свиное трава, см. Цикорій обыкновенный (*Cichorium Intybus* L.).
 Рыпишка, см. Лапчатка серебристая (*Potentilla argentea* L.).
 Рыпій, см. Сурѣница (*Brassica Rapa* L.).
 Рыпка, см. Ренишокъ обыкновенный (*Agrimonia Eupatorium* L.).
 Рыпльакъ } см. Чертополохъ пониклый (*Carduus nutans* L.).
 Рыпльакъ }
 Рыскунъ, см. Верескъ обыкновенный (*Calluna vulgaris* L.).
 Рысь, см. Рисъ полевнй (*Oryza sativa* L.).
 Рѣдешникъ, см. Рѣдка дикая (*Raphanus Raphanistrum* L.).

- Рѣдиска.** см. Рѣдка дикая (*Raphanus Raphanistrum* L.).
- Рѣдиска,** см. Рѣдка огородная (*Raphanus sativus* L.).
- Рѣдишникъ лѣсово́й,** см. Пастушья сумка (*Capsella Bursa pastoris* Moench.).
- Рѣдка,** см. Рѣдка дикая (*Raphanus Raphanistrum* L.).
- Рѣдка,** см. Рѣдка огородная (*Raphanus sativus* L.).
- Рѣдка дикая,** см. Свербига восточная (*Bunias orientalis* L.).
- Рѣдка дикая,** см. Сердечникъ огородный (*Cardamine amara* L.).
- Рѣдка дикая** (*Raphanus Raphanistrum* L.). Фармацевтическое название: *Rapistrum album* (Sem.). Букъ (Херс.), Горлюна, Груна (Тамб., Козл.), Куриная дрема (Орл.), Горчица полевая, Желтуха (Олон.), Желтушникъ (Твер.), Нарывная трава (Москов.), Редька дика (Малор.), Рѣдешникъ, Рыжикъ, Свирышница (Малор.), Свирыша дикая (Екат.), Свирышка (Земл., Газ.), Свирыша (Умань), Сурьпица (Вор., Твер., Пск.), Сурьпа (Маль), Хрѣнь полевой (Лѣсн. журн.). Однолѣтняя весьма обыкновенная тяжелая сорная трава изъ семейства «крестоцвѣтныхъ» (*Cruciferae* Juss.), распространяющаяся почти во всей Европѣ и во всей Россіи. Стебель внизу и лировидные, съ неравномѣрно зубчатыми и продолговато-яйцевидными долями, листья жестковолосые. Чашечка изъ 2 паръ отпадающихъ листочковъ. Фиолетовый вѣнчикъ изъ 4-хъ лепестковъ, вдвое длиннѣе чашелистиковъ расположенныхъ на-крестъ. Тычинокъ 6, изъ нихъ 2 короче, 4 длиннѣе. Пестикъ состоитъ изъ 2-хъ плодolistиковъ. Столбикъ длинный и тонкій. Плодъ — длинный цилиндрическій стручокъ, косо-вверхъ-стоящій, раздѣленный поперекъ на односемянныя гнѣздышки, расположенныя въ одинъ рядъ. Цвѣтетъ лѣтомъ.
- Рѣдка дикая,** см. Горчица дикая, Горчепъ (*Sinapsis arvensis* L.).
- Рѣдка земляная,** см. Дряква европейская (*Cyclamen europeum* L.).
- Рѣдка огородная** (*Raphanus sativus* L.). Рѣдка, Рѣдиска. Двухлѣтнее травянистое растение изъ семейства «крестоцвѣтныхъ» (*Cruciferae* Juss.), родомъ изъ Азіи, въ Европѣ встрѣчается одичалой, выш. 7—14 вершк. Листья лировидные. Цвѣты блѣдно-лиловые или бѣлые, съ фиолетовыми жилками. Чашечка 4-хлестная; вѣнчикъ 4-хлепестный. Пестикъ состоитъ изъ 2-хъ плодolistиковъ. Столбикъ длинный, тонкій. Плодъ — веретенообразные, вздутые, нераспадающіеся стручки, раздѣленные ложными поперечными перегородками на нѣсколько гнѣздъ. Многочисленные сорта рѣдки и однолѣтней разновидности ея, рѣдиски, часто разводятся въ огородахъ; та и другая даютъ сорта съ круглыми, продолговатыми и длинными корнями; употребляются въ пищу. Семена содержатъ много масла, и развѣдывая съ этой цѣлью разность называется китайской масляной рѣдкой. (Табл. XII, фиг. 230 и 231.)

МЕДИЦИННОЕ УПОТРЕБЛЕНІЕ. Корни рѣдки собираются осенью и сохраняются въ холодномъ, сухомъ мѣстѣ. Они содержатъ въ

себѣ крахмаль, сахаръ, декстринъ, бѣлокъ и летучее масло, имѣющее много общаго съ горчичнымъ. Врачами рѣдка не прописывается, но, какъ домашнее средство, она имѣетъ довольно обширное примѣненіе. Натертый рѣдечный корень съ пивомъ или виномъ даютъ цынготнымъ больнымъ, также людямъ, страдающимъ отеутствиемъ аппетита, какъ средство, усиливающее отдѣленіе желудочнаго сока. Рѣдечный сиропъ и рѣдечные леденцы считаются хорошимъ отхаркивающимъ средствомъ. Натертая рѣдка, приложенная на кожу, замѣняетъ собою горчичникъ; маленькіе кусочки рѣдки даются для жеванія больнымъ, страдающимъ параличемъ языка. Винная рѣдечная вытяжка считается хорошимъ средствомъ отъ веснушекъ. Рѣдка считается хорошимъ средствомъ отъ ознобленія. Натертый рѣдечный корень смѣшиваютъ съ равнымъ количествомъ горячей воды, даютъ остыть и этою смѣсью обмываютъ ознобленные участки тѣла. Для того, чтобы вылечиться вполне, слѣдуетъ нѣсколько разъ повторить это обмываніе.

Въ ветеринарной практикѣ рѣдку употребляютъ въ тѣхъ-же случаяхъ, какъ и горчицу: при хроническихъ катаррахъ дыхательныхъ путей у животныхъ, при катаррахъ желудка и кишекъ, при вздутіи живота, въ особенности при водянкѣ, протекающей безлихорадочно. Рѣдку нарѣзаютъ кусочками и кладутъ въ муку, отруби или овесъ, или-же изъ нея дѣлаютъ кашку. Большимъ животнымъ дается отъ 30,0 — 90,0 грм. (1 унца до 3-хъ унцъ), собакамъ отъ 3,75—15,0 грм. (1½ драхмы до 1½ унца). Это количество нарѣзывается и дается въ сухомъ видѣ; также изъ него можно приготовить пастой съ уксусомъ или пивомъ, для чего корень нарѣзаютъ и оставляютъ въ жидкости на 24 часа. Снаружи рѣдка употребляется, какъ и горчица.

Рѣдка полевая, см. Хрѣнь (*Armoracia rusticana* Fl.).

Рѣдковникъ, см. Свербига восточная (*Bunias orientalis* L.).

Рѣжица, см. Неслея метельчатая (*Neslea paniculata* Desv.).

Рѣжуха, см. Рыжикъ посѣвной (*Camelina sativa* Crantz.).

Рѣжуха, см. Пастушья сумка (*Capsella Bursa pastoris* L.).

Рѣжуха, см. Крессъ-салатъ (*Lepidium sativum* L.).

Рѣжуха, см. Водяной крессъ (*Nasturtium officinale* Rich.).

Рѣжуха коровья, см. Неслея метельчатая (*Neslea paniculata* Desv.).

Рѣзакъ, см. Тѣлорѣзъ сабуровидный (*Stratiotes aloides* L.).

Рѣзакъ, см. Рѣзакъ степной (*Falcaria Rivini* Host.).

Рѣзакъ, см. Тѣлорѣзъ сабуровидный (*Stratiotes aloides* L.).

Рѣзакъ болотный, см. Тростникъ обыкновенный (*Arundo Phragmites* L.).

Рѣзакъ степной (*Falcaria Rivini* Host.). Фармацевтическое названіе: *Sium Falcaria*. Анисъ дикій (Симб.), Омега полевая (Сарат.), Поручейникъ (Даль), Перекатичникъ (Вор.), Перекаати поле (Тавр.), Різачка (Малор.), Різакъ, (Малор.), Різакъ, Різунка (Херс.), Різакъ степной (Рог.), Сернорѣзъ, Сернорѣзъ (Рог.), Сокорки (Кіев.), Сузикъ (Курск.), Серпникъ, Серпинца, Полпникъ. Двудѣтное травянистое голубовато-зеленое растение изъ семейства «зон-

тичныхъ» (*Umbelliferae* Juss.), распространенное въ средней и южной Европѣ, въ южной и юго-западной Россіи. Стебель вѣтвистый, круглый; прикорневые листья цѣльные или тройственные; нижніе стеблевые—тройственные, съ глубоко 3-храздѣльнымъ среднимъ и обыкновенно 2-раздѣльными боковыми сегментами. Доли листьевъ почти кожистыя, линейно-ланцетныя, мелко-остро-пильчатыя. Цвѣты мелкіе бѣлые, въ зонтичныхъ соцвѣтіяхъ. Чашечка 5-тизубчатая. Вѣтчикъ 5-тилепестный. Тычинокъ 5; завязь нижняя, двугнѣздная; столбиковъ 2, расширенныхъ при основаніи въ дискъ, покрывающій верхушку завязи. Плодъ слегка сжатый съ боковъ, продолговато-линейный, съ широкими тупыми ребрами, при созрѣваніи распадается на 2 съмянки, отдѣляющіяся отъ срединнаго столбочка. Цвѣтетъ лѣтомъ. Растетъ при дорогахъ, въ степяхъ.

Ръзанецъ (*Allium Schoenoprasum* L.). Лукъ зубчатый. Лукъ дикий, мелкій, Трибулька, Скорода, Шнитлукъ. Многолѣтнее травянистое луковичное растеніе, изъ семейства «лилейныхъ» *Liliaceae* Dc.), распространенное почти во всей Европѣ, въ сѣверной, средней, юго-западной Россіи, на Кавказѣ и въ Сибири. Стебель выш. $3\frac{1}{2}$ —7 вершковъ, только при основаніи облиственный. Листья полые шиловидныя, иногда слегка сплюснутые, почти одинаковой длины съ стеблемъ. Розовые цвѣты въ почти шаровидномъ зонтикѣ съ перепончатой двулистной поволокой. Лепестковидный околоцвѣтникъ состоитъ изъ 6 лепестковъ. Тычинокъ 6; завязь верхняя 3-хгнѣздная, съ 1 столбикомъ. Плодъ—коробочка. Цвѣтетъ лѣтомъ, произрастаетъ на влажныхъ лугахъ. Разводится на огородахъ. Въ пищу употребляются листья. (Р и с. 258.)

Ръзецъ, см. Осока пузырчатая (*Carex vesicaria* L.).

Ръзецъ, см. Тимофеевка (*Phleum arvense* L.).

Ръзка } см. Тысячелистникъ обыкновенный (*Achilleum Mille-*
Ръзунъ } *folium* L.).

Ръзунъ, см. Икотникъ сѣро-зеленый (*Berteroa incana* L.).

Ръзунъ } см. Тѣлорѣзь сабуровидный (*Stratiotes aloides* L.).
Ръзунья }

Ръзуха, см. Неслея метельчатая (*Neslea paniculata* Desv.).

Ръзуха, см. Рыжикъ посѣвной (*Camellina sativa* Crantz.).

Ръзуха, см. Ръзуха башенная (*Arabis turrilis* L.).

Ръзуха, см. Ежа сборная (*Dactylis glomerata* L.).

Ръзуха, см. Крессъ-салатъ (*Lepidium sativum* L.).

Ръзуха, см. Крессъ водяной (*Nasturtium officinale* Rch.).

Ръзуха водяная, см. Хрѣнь водяной (*Nasturtium amphibium*).

Ръзуха башенная (*Arabis turrilis* L.). Арабка, Постынка, Постынный, Ръзуха, Горчица арабская. Двулѣтнее травянистое растеніе изъ семейства «крестоцвѣтныхъ» (*Cruciferae* Juss.), распространенное въ средней и южной Европѣ, въ южной Россіи, выш. $3\frac{1}{2}$ —7 вершковъ: все растеніе шершавое отъ покрывающихъ его короткихъ звѣздчатыхъ волосковъ; листья зубчатыя, нижніе—эллиптическіе, верхніе—продолговатыя, стеблеобъемлю-

щие; цвѣты мелкіе желтовато-бѣлые. Чашечка 4-хлестная; вѣнчикъ состоитъ изъ 4-хъ на-крестъ расположенныхъ лепестковъ. Тычинокъ 6; плодъ — длинные, плоскіе, дугообразно согнутые въ одну сторону стручки. Растетъ по холмамъ и известковымъ склонамъ. (Р и с. 259.)

Ръзуха индѣйская, см. Пастурція (*Tropaeolum majus* L.).

Ръзуха шершавая (*Arabis hirsuta* Scop.). Однолѣтнее и многолѣтнее травянистое растеніе изъ семейства «крестоцвѣтныхъ» (*Cruciferae* Juss.), распространенное въ сѣверной и средней Европѣ и въ большей части Россіи, выш. 3½—14 верш. Растеніе шершаво-волосистое. Стеблевые листья прямостоящіе, сидячіе, съ листовыми ушками, отстоящими отъ стебля; цвѣты мелкіе бѣлые. Чашечка 4-хлестная; вѣнчикъ состоитъ изъ четырехъ на-крестъ расположенныхъ лепестковъ. Тычинокъ 6; плодъ — прямостоящіе стручки. Цвѣтетъ въ маѣ и въ іюнѣ. Встрѣчается изрѣдка на холмахъ, скалахъ и между кустарниками. (Р и с. 260.)

Ръзуха трава, см. Подмаренникъ желтый (*Galium verum* L.).

Ръзушка, см. Ръзакъ степной (*Falcaria Rivini* Host.).

Ръзь, см. Неслея метельчатая (*Neslea paniculata* Desv.).

Ръзь } см. Рыжикъ посѣвной (*Camelina sativa* Crantz.).

Ръзь коровья }

Рѣпа воложская, см. Груша земляная (*Hellanthus tuberosus* L.).

Рѣпа дикая, см. Просвирникъ сѣверный (*Malva borealis* Wallm.).

Рѣпа зимняя, см. Груша земляная (*Hellanthus tuberosus* L.).

Рѣпа нѣмецкая, см. Брюква (*Brassica Napus* L.).

Рѣпа огородная (*Brassica Rapa* L.). Двухлѣтнее травянистое огородное растеніе изъ семейства «крестоцвѣтныхъ» (*Cruciferae* Juss.), разновидность сурѣпицы (*Brassica campestris* L.), описаніе см. ниже, съ толстымъ, мясистымъ округлымъ или удлиненнымъ корнемъ. Нижніе листья ланцетные, покрытые жесткими волосами, верхніе — овальные, заостренные, стеблеобъемлющіе. Золотисто-желтые цвѣты во время распусканія образуютъ сжатые, плоскія кисти, причемъ вполне раскрывшіеся цвѣты выступаютъ надъ цвѣточными почками. Чашелистиковъ 4, горизонтальныхъ подъ конецъ цвѣтенія. Вѣнчикъ состоитъ изъ 4-хъ на-крестъ расположенныхъ лепестковъ. Тычинокъ 6; пестикъ состоитъ изъ 2-хъ плодолистиковъ. Плодъ — почти вверхъ стоячіе стручки. Разводится въ огородахъ. Корень употребляется въ пищу, какъ сырой, такъ и въ качествѣ овоща, какъ приправа къ кушаньямъ.

Медицинское употребленіе. Рѣпный сокъ имѣетъ довольно обширное примѣненіе въ домашней медицинѣ. Сама по себѣ рѣпа считается полезною приправою къ кушаньямъ, сокъ ея, свѣжевыжатый, служитъ хорошимъ средствомъ отъ цыги и золотухи. Свѣжевыжатымъ сокомъ наносятъ горло отъ кашля, или же лѣчатъ озожденія кожи. Мазь отъ отмораживанія готовится слѣдующимъ образомъ: свѣжую рѣпу натираютъ на теркѣ, на 750,0 грм. (2 фунта) рѣпы берутъ 375,0 грм. (1 фунтъ) гусиного сала, смѣшиваютъ и кипятятъ на угляхъ до тѣхъ поръ, пока

смѣсь не получить темно-красный цвѣтъ; тогда ее прощѣживаютъ чрезъ полотняную трипочку въ холодную воду. Плавающий сверху жир снимаютъ, складываютъ въ банку, хорошо закупориваютъ и этою мазью мажутъ отмороженные мѣста.

Рѣпа свиная, см. Мыльнянка восточная (*Leontice Leontopetalum* L.).

Рѣпа свиная, см. Просвирникъ сѣверный (*Malva borealis* L.).

Рѣпа свиная, см. Просвирникъ обыкновенный (*Malva rotundifolia* L.).

Рѣпа степная, см. Молодиль кровельный (*Sempervivum tectorum* L.).

Рѣпникъ, см. Репяшокъ обыкновенный (*Agrimonia Eupatorium* L.).

Рѣпка, см. Колючникъ безстебельный (*Carlina subacaulis* DC.).

Рѣпка горькая, см. Хохлатка плотная (*Corydalis solida* Smith.).

Рѣпникъ, см. Репяшокъ обыкновенный (*Agrimonia Eupatorium* L.).

Рѣпникъ, см. Водяной перецъ (*Polygonum Hydropiper* L.).

Рѣпничекъ, см. Свербига восточная (*Bunias orientalis* L.).

Рѣповникъ, см. Сурѣлица (*Brassica Rapa campestris* L.).

Рюмочникъ, см. Наперстникъ крупноцвѣтная (*Digitalis grandiflora* Lam.).

Рябика } см. Рябина обыкновенная (*Sorbus Aucuparia* L.).

Рябина } см. Рябина обыкновенная (*Sorbus Aucuparia* L.).

Рябина дикая, см. Синюха обыкновенная (*Polemonium coeruleum* L.).

Рябина дикая, см. Гусиная лапка (*Potentilla anserina* L.).

Рябина дикая, см. Чихотная трава (*Pteris vulgaris* DC.).

Рябина дикая, см. Кровохлебка лекарственная (*Sanguisorba officinalis* L.).

Рябина дикая, см. Пижма (*Tanacetum vulgare* L.).

Рябина дикая, см. Клеверъ средний (*Trifolium medium* L.).

Рябина желтая, см. Желтуха (*Senecio jacobaea* L.).

Рябина обыкновенная (*Sorbus Aucuparia* L., sin. *Pirus Aucuparia* Gärtn.). Рябина, Рябика (Вор., Ряз.), Горобина (Малор.), Грабина, Оробина (Рог.), Ярабина, Ярембина, Герженбина (Гродн.). Дерево изъ семейства «яблоневыхъ» (*Rosaceae* Lindl.), выш. 4½ арш. до 3 сажень, распространенное во всей Европѣ и почти во всей Россіи; листья сложные, непарно-перистые; почки войлочнo-пушистыя, не клейкія. Многочисленные бѣлые цвѣты собраны въ густыя вѣтвистыя, щитковилныя соцветія. Чашечка 5-тираздѣльная, 5 лепестковъ и многочисленныя тычинки сидятъ на кольцѣ, находящемся на краѣ вогнутого цвѣтоложа. Завязь 2 — 5-тигвѣздная, съ такимъ-же количествомъ столбиковъ; плоды шаровидные, ягодообразные, красные, горькіе. Произрастаетъ въ лѣсахъ и между кустарниками. Плоды идутъ на варенья, настойки и т. п. (Табл. XII, фиг. 235 и 236.)

МЕДИЦИННОЕ УПОТРЕБЛЕНІЕ. Ягоды рябины известны только, какъ домашнее средство. Онѣ содержатъ въ себѣ яблочную кислоту, красящія вещества и считаются хорошимъ средствомъ для

желудка, какъ возбуждающее аппетитъ и легкое слабительное. Зѣтъмъ рябинѣ приписывается свойство увеличивать мочеотдѣленіе, дѣйствовать противъ цынги, противъ дизентеріи и усиливать отдѣленіе мѣсячныхъ очищеній. Дается рябина въвидѣ настойки на винѣ, такъ называемая рябиновая водка, или-же, что гораздо лучше, такъ какъ при этомъ не употребляется спирта, въвидѣ выжатого сока отъ 5,0—15,0 грм. (1 драхмы до 4-хъ драхмъ) 2—3 раза въ день. Водяной отваръ такой-же крѣпости въ народѣ пьютъ отъ поноса и отдѣленія слизи изъ мочевого пузыря.

Рябина полевая, см. Вязель разноцвѣтный (*Coronilla varia* L.).
Рябина святая, см. Сивюха обыкновенная (*Polemonium coeruleum* L.).

Рябина-травя, см. Бедренець обыкновен. (*Pimpinella saxifraga* L.).

Рябинка, см. Тысячелистникъ обыкновенный (*Achillea Millefolium* L.).

Рябинка, см. Ленъ дикий (*Linaria vulgaris* Mill.).

Рябинка, см. Желтуха (*Senecio jacobaea* L.).

Рябинка, см. Земляные орѣшки (*Spiraea Filipendula* L.).

Рябинка, см. Валеріана лекарственная (*Valeriana officinalis* L.).

Рябинка бoгoвa } см. Пижма (*Tanacetum vulgare* L.).

Рябинка дикая, см. Пулавка красильная (*Anthemis tinctoria* L.).

Рябинка желтая, см. Пижма (*Tanacetum vulgare* L.).

Рябинка лиловая, см. Тысячелистникъ обыкновенный (*Achillea Millefolium* L.).

Рябинка лѣсная, см. Сивюха обыкновенная (*Polemonium coeruleum* L.).

Рябинка малая, см. Бедренець обыкновенный (*Pimpinella saxifraga* L.).

Рябинка полевая, см. Пижма (*Tanacetum vulgare* L.).

Рябинка святая, см. Дубровка гнѣстная (*Veronica Chamaedrys* L.).

Рябинникъ, см. Сабельникъ болотный (*Comarum palustre* L.).

Рябинникъ, см. Кровохлебка лекарственная (*Sanguisorba officinalis* L.).

Рябинникъ болотный, см. Гравилатъ водяной (*Geum rivale* L.).

Рябинникъ горькій, см. Сабельникъ болотный (*Comarum palustre* L.).

Рябинникъ дикий, см. Орлякъ обыкновенный (*Pteris aquilina* L.).

Рябинникъ дорожный, см. Гусиная лапка (*Potentilla anserina* L.).

Рябинникъ желтый, см. Пижма (*Tanacetum vulgare* L.).

Рябинникъ луговой, см. Сабельникъ болотный (*Comarum palustre* L.).

Рябинчикъ } см. Пижма (*Tanacetum vulgare* L.).

Рябишникъ } см. Очанка лекарственная (*Euphrasia officinalis* L.).

Рябчикъ, см. Бутень клубненосный (*Chaerophyllum bulbosum* L.).

Рябчикъ, см. Вязель разноцвѣтный (*Coronilla varia* L.).

Рябчикъ, см. Рябчикъ обыкновенный (*Fritillaria Meleagris* L.).

Рябчикъ, см. Осокорь обыкновенный (*Populus nigra* L.).

Рябчикъ дикий, см. Купырь лѣсной (*Anthriscus silvestris* L.).

Рябчикъ обыкновенный (*Fritillaria Meleagris* L.). Рябчикъ трава, Цвѣтъ шаховый, Вѣточникъ, Мохначъ, Мохнатый цвѣтъ, Кудрявка, Цвѣтъ шахматный трава Рябчикъ. Многолѣт. травянист. растеніе изъ семейства «лилейныхъ» (*Liliaceae* Dc.), распространенное въ средней Европѣ, въ средней и южной Россіи; луковица его состоитъ изъ двухъ мясистыхъ чешуй; стебель выпш. $3\frac{1}{2}$ —7 вершк., съ 3—9 очерченными линейными листьями и одиночнымъ крупнымъ поникшимъ цвѣткомъ. Околоцвѣтникъ колокольчатый, 6-тилистный, опадающій, мясокраснаго или желтоватаго цвѣта, съ темнокрасными пятнами; тычинокъ 6, съ пыльниками, прикрѣпленными при основаніи; столбикъ нитевидный, раздѣленный болѣе или менѣе глубоко на 3-хлинейныя рыльца. Плодъ—коробочка. Цвѣтетъ весной. Изрѣдка встрѣчается на влажныхъ лугахъ и въ рошахъ.

Рябчикъ-трава, см. Рябчикъ обыкновен. (*Fritillaria Meleagris* L.).

Рябъ, см. Вьюнокъ полевой (*Convolvulus arvensis* L.).

Рябъ-трава, см. Дѣвникъ (*Pyrethrum Parthenium* Smith.).

Рядовикъ, см. Кровохлебка лекарственная (*Sanguisorba officinalis* L.).

Рямжа, см. Медунца (*Spiraea ulmaria* L.).

Ряса, см. Береза обыкновенная (*Betula alba* L.).

Ряса

Ряса болотная } см. Ряска маленькая (*Lemna minor* Schl.).

Ряса водяная

Ряска

Ряска маленькая (*Lemna minor* Schl.). Ряска (въ больш. ч. Россіи), Ряса, Ряса болотная, Ряса водяная, Ряска, Риза, Лягушечья дерюжка (Смол.), Мокрица (Тв.), Многокоренникъ, Утиная трава, Сочевина болотная, Клюкъ лягушій трава, Разлогъ. Многолѣтняя травка изъ семейства «рясковыхъ» (*Lemnaceae* Link.), встрѣчающаяся повсюду въ стоячихъ водахъ, съ плоскими, листовидно-обратно-яйцевидными или почти круглыми стеблями, шириною въ $\frac{1}{2}$ — $1\frac{1}{2}$ вершк., плавающими на поверхности воды и выпускающими по одному корню. Новые побѣги и соцвѣтіе выступаютъ сбоку стебля изъ кармашкообразнаго углубленія. Соцвѣтіе, окруженное нѣжною поволокой, состоитъ изъ одного пестичнаго и 1—2 тычиночныхъ цвѣтковъ. Околоцвѣтника нѣтъ. Тычинокъ 1. Завязь одногнѣздная. Цвѣтетъ весной. Составляетъ питательную пищу для свиней, гусей, утокъ и куръ. Собранную ряску немного посыпаютъ отрубями, мукой и дертью. (Рис. 261.)

Рясть, см. Ванмачки желтые (*Cypripedium Calceolus* L.).

Рясть, см. Первоцвѣтъ лекарственный (*Primula officinalis* Jacq.).

Рясть, см. Пролѣска двулистная (*Scilla bifolia* L.).

Рясь, см. Хохлатка плотная (*Corydalis solida* Smith.).

Рясь, см. Будра плющевидная (*Glechoma hederacea* L.).

C.

Сабадилла (*Veratrum Sabadilla* Schiede, нынѣ *Schoenocaulon officinale*, *Seimen*, s. *Capsulae Sabadillae*, v. *Sabatigillae*, s. *Cebadillae*, *Hordeum causticum*). Китайская чемерлица. Растеніе, родомъ изъ Мексики, произрастающее на склонахъ горъ.

МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНІЕ. Въ настоящее время сѣмена сабадиллы совсѣмъ не употребляются, прежде изъ нихъ добывали экстрактъ, который употреблялся снаружи и внутрь. По своему дѣйствію на организмъ, сѣмена сабадиллы принадлежатъ къ сильнымъ ядамъ, вызываютъ чувство жженія во рту, тошноту, рвоту, поносъ. Въ болѣе сильной дозѣ приемъ сабадиллы можетъ даже повести за собою смертельное отравленіе. На кожѣ сабадилла производитъ красноту и жженіе. Сѣмена сабадиллы входили въ составъ порошка отъ пасткомыхъ, теперь они замѣняются безвреднымъ персидскимъ порошкомъ. Изъ сѣмянъ сабадиллы добывается имѣющій въ медицинѣ довольно обширное примѣненіе алкалоидъ вератринъ.

Сабельникъ, см. Аиръ обыкновенный (*Acorus Calamus* L.).

Сабельникъ, см. Тростникъ общин. (*Arundo Phragmites* L.).

Сабельникъ, см. Горлецъ, раковыя шейки (*Polygonum Bisorta* L.).

Сабельникъ Солотный (*Comarum palustre* L., sin. *Potentilla Comarum* (Pers.). Фармацевтическое названіе: *Pentaphyllum aquaticum*. Волотникъ (Могил.), Брылена (Даль), Гвоздички (Черн.), Декоктъ водяной (Вор., Тар.) и искаж. Декопій (Тамб., Meyer.), Декопъ (Смол.), Декопъ, Земляника болотная, Золотникъ (Кіев.), Бутяновы ножки (Малор., Иабо, Могил.), Матинца, Матица (Олон.), Огиршникъ (Хар.), Огнепѣтъ обыкновенный (Пет.), Ожовникъ (Минск.), Пятилистникъ большой, Пятипалочная трава (Пет.), Пятипалочникъ, Пятиперстная (Волог.), Раковникъ (Вил.), Растопырка (Орл.), Болотная роза (Вилен.), Рябинникъ горькій (Тв., Ост., Пул.), Рябинникъ (Могил.), Рябинникъ луговой (Пск.), Сабельникъ рамоный, Краска, Суставка (Вят.), Серебрякъ (Сл. Церк.), Сухолгодникъ, Сухоломъ (Малор., Могил.), Волчье тѣло, Волче тѣло (Малор.), Заячьи ушки, Чеснокъ коневій (Влад.). Дикая малина (Влад.), Гравилатъ или Гребникъ (Минск.). Многолѣтнее травянистое коротко-волосистое растеніе изъ семейства «розовѣтнхъ» (*Rosaceae* Hook et Vent.), распространенное въ сѣверной и средней Европѣ, въ сѣверной и средней Россіи и въ Сибири, выш. 7 — 8 вершк., часто съ красноватымъ отѣнкомъ. Стебель приподнимающійся, наверху вѣтвистый. Корневище длинное, ползучее, вѣтвистое, деревянистое. Листья перистые, о 5—7 остроильчатыхъ, снизу блѣловатыхъ, сверху темнозеленыхъ листочкахъ; прилистники — совсѣмъ приросшіе къ черешку, верхніе—яйцевидные. Темнокрасныя цвѣты расположены рыхлыми неправильными кистями; чашечка 5-тираздѣльная, прикрѣпленная къ полушаровидному цвѣтоложу, снабженная под-

чашиемъ изъ 5 мелкихъ листочковъ; лепестковъ 5, въ 2—3 раза короче долъ чашечки. Тычинки многочисленныя. Пестикъ состоитъ изъ нѣсколькихъ плодolistиковъ, снабженныхъ каждый короткимъ боковымъ столбикомъ и сидящихъ на выпукломъ губчато-мясистомъ цвѣтоложѣ. Плодъ—сложная сѣмянкa. Цвѣтеть съ мая до юля. Произростаеъ на болотахъ и сырыхъ лугахъ. (Рис. 262.)

МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ. Прежде сабельникъ употреблялся въ медицинѣ отъ поноса, кровотеченій и обильнаго отдѣленія слизи, теперь вполне оставленъ. Въ народной медицинѣ употребляется отъ поноса, отъ боли въ животѣ, происходящей отъ поднятiя тяжестей, отъ венерической болѣзни и какъ потогонное. Сабельникъ меньшiй, см. Касатикъ водяной (*Iris pseudacorus* L.)

Сабельникъ раменный, см. Сабельникъ болотный (*Comarum palustre* L.).

Сабельникъ татарскiй, см. Аиръ обыкновенный (*Acorus Calamus* L.).

Сабина, см. Можжевельникъ казацкiй (*Juniperus Sabina* L.).

Сабуръ, см. Алое (*Aloe Tourh.*)

Сабуръ, см. Поповникъ обыкновенный (*Chrysanthemum Leucanthemum* L.).

Саговая пальма (*Arengo saccharifera* Labill.) Сахарная пальма. Пальма, произрастающая въ лѣсахъ Остi-Индiи и восточной Африки, на островахъ Молуккскихъ и на островѣ Явѣ. Плоды ея, отваренные въ сахаръ, употребляются въ Кохинхинѣ, какъ лакомство; мясистая-же внутренность косточки до того жгуча, что при употребленiи ея въ пищу всухаютъ губы; даже водѣ, въ которую кладутъ плоды пальмы для того, чтобы вызвать въ нихъ броженiе, сообщается это свойство настолько, что при соприкосновенiи она обжигаетъ кожу. Главная польза, извлекаемая изъ пальмы, заключается въ добыванiи изъ надрѣзовъ молодыхъ цвѣточныхъ головокъ, рѣже ствола, сока, напоминающаго вкусомъ виноградный и служащаго вмѣсто крѣпкаго опьяняющаго напитка, известнаго подъ названiемъ «пальмоваго вина»; вываренный, онъ дѣлаетъ редъ чернаго сахара (пальмоваго сахара). Изъ сердцевинны плодовъ выдѣлывается мука—саго. У основанiя черешковъ листья въ нахождiи длинныя жесткiя волокна, напоминающiя конскiю шерсть; изъ нихъ изготовляютъ веревки, шнурки, паруса, канаты и мотелки. Древесина употребляется, какъ строительный и столярный материалъ.

МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ. Изъ саго на его родинѣ приготавливаютъ хлѣбъ, служащий для ежедневнаго питанiя. У насъ изъ саго приготавливаютъ также различныя кушанья, которыя считаются полезными отъ расстройствъ желудка; дѣтямъ послѣ года саго отвариваютъ въ молокѣ и даютъ въ перемѣлку съ другими отварами, какъ питательное средство, хорошо переносящееся желудкомъ.

Сазанчики, см. Сонъ (*Anemone Pulsatilla* L.).

Сазаны, см. Горечавка крупная (*Gentiana Pneumonanthe* L.).

Сазаны, см. Касатикъ нѣмецкій (*Iris germanica* L.).

Саклакъ, см. Бересклетъ европейскій (*Evonymus europaeus* L.).

Салабъ, см. Ятрышникъ-дремликъ (*Orchis Morio* L.).

Салата, см. Салатъ-латукъ (*Lactuca sativa* L.).

Салата заяча, см. Чистякъ (*Ficaria ranunculoides* Moench.).

Салата сонная, см. Макъ снотворный (*Paraver somniferum* L.).

Салатка заячья } см. Чистякъ (*Ficaria ranunculoides* Moench.).
Салатникъ }

Салатъ, см. Салатъ-латукъ (*Lactuca sativa* L.).

Салатъ бараній трава, см. Салатъ-ранунцель (*Valerianella olitoria* Moench.).

Салатъ дикій, или латукъ дикій (*Lactuca scariola* L.). Фармацевтическое назв.: *Lactuca silvestris*, s. *Scariola*. Заичикъ (Ворон.), Заячій козелецъ, Какинь (Малор., Сред., Екат.), Молоканъ (Вор., Тар.), Молочка, Молочко (Малор., Рог.). Двудѣтное травянистое растеніе изъ семейства «сложноцвѣтныхъ» (*Compositae* Adans.), распространенное въ средней и южной Европѣ, въ средней и южной Россіи, въ Сибири и Туркестанѣ. Все растеніе болѣе или менѣе сѣро-зеленое. Стебель плотный, твердый, выш. 14—30 в. Стеблевые листья расположены въ вертикальной плоскости (повернуты на ребра), сидячіе, со стрѣловиднымъ основаніемъ, по краямъ шиновато-зубчатые, снизу вдоль средней жилки съ жесткими щетинками; нижніе и средніе листья болѣею частью струговидные, верхніе—цѣльные, ланцетные. Корзинки, содержащія отъ 6 до 12 блѣдно-желтыхъ цвѣтковъ, расположены пирамидальной метелкой. Всѣ цвѣты язычковые. Тычинокъ пять; завязь нижняя одногнѣздная, одноствѣнная, съ однимъ столбикомъ съ раздвоеннымъ рыльцемъ. Плодь—сѣмянка. Цвѣтетъ во второй половинѣ лѣта. Растетъ по сорнымъ мѣстамъ около дорогъ и между кустарниками. (Рис. 263.)

МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНІЕ. Латукъ цвѣтетъ отъ іюля до августа. Собирается только цвѣтущее растеніе. Изъ него въ аптекахъ готовятъ спиртную настойку и экстрактъ. Латукъ по своему дѣйствію на организмъ принадлежитъ къ наркотическимъ средствамъ; въ прежнее время онъ назначался, какъ мочегонное, противосудорожное и слабительное средство, въ настоящее время врачи его почти не назначаютъ, замѣняя экстрактомъ бѣлены.

Въ гомеопатіи латукъ дается отъ водянки, одышки, тяжести головы, отсутствія аппетита, бессонницы и при безпокойномъ снѣ съ тяжелыми сновидѣніями, дурномъ расположеніи духа, боляхъ внизу живота, запорахъ, боляхъ въ области печени и селезенки. Также латукъ дается отъ охриплости голоса и сухого, лающего кашля. Даютъ 1—2 капли чистой настойки латука или 1-го, 2-го разведенія 1—2 раза въ день.

Салатъ заячій, см. Чистякъ (*Ficaria ranunculoides* Moench.).

Салатъ заячій, см. Руминка лекарственная (*Anchusa officinalis* L.).

Салатъ кочанный, см. Салатъ-латукъ (*Lactuca sativa* L.).
Салатъ-латукъ (*Lactuca sativa* L.). Салатъ, Салатъ кочанный, Салата (стар. рукоп.), Латухъ. Однолѣтняя трава изъ семейства «сложноцвѣтныхъ» (*Compositae* Adans.), очень похожая на «салатъ дикій» (*Lactuca scariola* L.), описаніе см. выше, отъ котораго отличается корзинками, собранными щитковидной метелкой, и горизонтальными листьями. Считается разновидностью салата дикаго; разводится на огородахъ. Цвѣтеть лѣтомъ, употребляется въ пищу.

МЕДИЦИННОЕ УПОТРЕБЛЕНІЕ. Салатъ цвѣтеть въ іюль и августъ. Къ концу цвѣтѣнія изъ стебля и листьевъ при надрѣзѣ вытекаетъ сокъ. Собранный и высушенный въ легкомъ теплѣ сокъ этотъ получаетъ названіе салатнаго опіума; онъ имѣетъ видъ маленькихъ, неправильной формы, кусочковъ желтоватаго и коричневаго цвѣта; на разрѣзъ кусочки эти имѣютъ желтоватый цвѣтъ; вкусомъ и запахомъ они напоминаютъ опій. Употребляется салатный опіумъ въ Германіи и Франціи въ тѣхъ случаяхъ, какъ и опій, дѣйствуетъ онъ только гораздо слабѣе. Въ Россіи врачи его почти никогда не прописываютъ.

Салатъ морской, см. Ложечная трава (*Cochlearia officinalis* L.).

Салатъ полевой, см. Расторопша лютиковая (*Chondrilla juncea* L.).

Салатъ полевой, см. Салатъ-рапунцель (*Valerianella oleria* Moench.).

Салатъ птичій, см. Мокрица (*Stellaria media* Smith.).

Салатъ рапунцель (*Valerianella oleria* Moench.). Салатъ бараній трава, Салатъ полевой. Однолѣтнее травянистое виллообразно-вѣтвистое растеніе изъ семейства «валеріановыхъ» (*Valerianaceae* DC.), распространенное почти по всей Европѣ, въ сѣверной Африкѣ, Малой Азіи, Сѣверной Америкѣ, Крыму и на Кавказѣ, изрѣдка встрѣчающееся въ южныхъ и юго-западныхъ губерніяхъ и въ Прибалтійскомъ краѣ. Стебель гранистый, внизу немного пушистый; листья супротивные, по краямъ рѣсничатые, нижніе — лопатчатые, верхніе — ланцетные, цѣльно-крайніе или немного зубчатые; мелкіе голубовато-бѣлые цвѣты въ полузонтикахъ, головчато-скупенныхъ на вѣтвяхъ соцветій; чашечка мало-замѣтная, 1—3-хзубчатая; вѣнчикъ правильный, ворончатый, 5-тилопастный; тычинокъ 3, прикрѣпленныхъ къ трубчкѣ вѣнчика; завязь шпални 3-хгвездная, съ нитеводнымъ 3-храздѣльнымъ столбикомъ. Плодъ — голая или немного пушистая сѣмянка. Цвѣтеть въ началѣ лѣта. Растетъ на поляхъ и сорныхъ мѣстахъ. Листья употребляются въ пищу, какъ салатъ.

Салатъ цвѣтной, см. Настурія (*Tropaeolum majus* L.).

Салвея мушкатная, см. Шалфей мушкатный (*Salvia Sclarea* L.).

Салдерей, см. Сельдерей (*Apium graveolens* L.).

Салепъ, см. Ятрышникъ широколистный (*Orchis latifolia* L.).

- Салепный корень, см. Ятрышник широколистный (*Orchis latifolia* L.).
- Салепъ, см. Ятрышник мужской (*Orchis mascula* L.).
- Салепъ бухарскій, см. Ятрышник - дремликъ (*Orchis Morio* L.).
- Сало воронье, см. Заячья капуста (*Sedum Telephium* L.).
- Сало воронье, см. Репяшокъ обыкновенный (*Agrimonia Eupatoriolum* L.).
- Салтыкъ, см. Рисъ посѣвной (*Oryza sativa* L.).
- Сальникъ, см. Жирянка обыкновенная (*Pinguicula vulgaris* L.).
- Сальникъ } см. Окопникъ лекарственный
- Сальница аптекарская } (*Symphytum officinale* L.).
- Сальный корень
- Сальсеифисъ, см. Овсяные корни (*Tragopogon porrifolius* L.).
- Самарія, см. Валериана лекарственная (*Valeriana officinalis* L.).
- Самбукъ } см. Бузина черная (*Sambucus nigra* L.).
- Самвикъ }
- Самиръ, см. Земляные орѣшки (*Spiraea Filipendula* L.).
- Самоправа, см. Сивецъ луговой (*Scabiosa succisa* L.).
- Самородина, см. Смородина черная (*Ribes nigrum* L.).
- Самородина, см. Смородина красная (*Ribes rubrum* L.).
- Самосилъ, см. Дубровникъ тѣмный (*Teucrium Chamaedrys* L.).
- Самостой, см. Крестовникъ лѣсной (*Senecio silvaticus* L.).
- Самостой, см. Заячья капуста (*Sedum Telephium* L.).
- Самострѣль, см. Вербейникъ обыкновенный (*Lysimachia vulgaris* L.).
- Самосѣй, см. Шалфей луговой (*Salvia pratensis* L.).
- Самоцвѣтка, см. Смолка (*Lychitis Viscaria* L.).
- Самсончики, см. Пострѣль луговой (*Anemone pratensis* L.).
- Самсончикъ, см. Сонъ-трава (*Anemone patens* L.).
- Самшитъ, см. Самшитъ обыкновенный (*Buxus sempervirens* L.).
- Самшитъ обыкновенный (*Buxus sempervirens* L.). Букъ, Дерево Букшпанъ, Букшпанъ, Буксуеникъ (Кален.). Букъ (Даль), Геванъ, Бужбонъ, Зелениче дерево, Зеленика, Кедръ (въ Слав.), Пальмовое дерево, Пальмовый кустъ, Пальма, Самшитъ, Шамшитъ. Кустарникъ или дерево изъ семейства «молочайныхъ» (*Euphorbiaceae* Juss.), родомъ съ Востока, встрѣчающіеся въ южной и западной Европѣ и на Кавказѣ, съ супротивными, вѣчно-зелеными, кожистыми, продолговато-яйцевидными, цѣльно-крайними листьями. Цвѣты мелкіе, желтовато-зеленые, собраны пазушными пучками, состоящими изъ нѣсколькихъ тычиночныхъ и 1 — 2 пестичныхъ цвѣтковъ. Околоцвѣтникъ 4-х-лиственный; тычинокъ 4. Коробочка почти шаровидная, 3-хлѣздная. Цвѣтетъ весной. Желтоватая чрезвычайно плотная и твердая древесина самшита, нѣвѣстная болѣе подъ названіемъ «пальмоваго дерева», употребляется на разныя токарныя и столярныя издѣлія и для гравированія на деревѣ. (Р и с. 264.).
- МЕДИЦИНСКАЯ УПОТРЕБЛЕНИЕ.** Изъ корки корня самшита обыкновеннаго добывается алкалоидъ, носящій названіе *Vebeerin*

или Вихи. По своему горькому вкусу онъ напоминаетъ хининъ и былъ предложенъ для его замѣны. Дѣйствуетъ буксина гораздо слабѣе хины, и его приходится принимать гораздо больше, чѣмъ хинина. По своему дѣйствію онъ далеко уступаетъ хинину, но онъ считается хорошимъ средствомъ, поднимающимъ аппетитъ и питаніе, для чего его даютъ въ маленькихъ дозахъ отъ 0,05 — 0,1 (отъ $\frac{1}{6}$ грана до 1 грана) 3 раза въ день.

Сандорникъ, см. Жеруха левая (*Nasturtium silvaticum* R. Br.).
Сандалъ красный, см. Цезальпинія бразильская (*Caesalpinia brasiliensis* Sw.).

Сандалъ красный, см. Сандальное дерево красное (*Pterocarpus santalinus* L.).

Сандалъ синій } см. Сандальное дерево (*Haematoxylon Cam-*
Сандалъ чернѣй } *pechianum* L.).

Сандальное дерево (*Haematoxylon Campechianum* L.). Кампешъ, Кампешевое дерево, Сандалъ синій или чернѣй, Фиолетовое дерево. Дерево, достигающее нѣсколькихъ саженъ выш., родомъ изъ Вестъ-Индіи, распространенное также на Антильскихъ островахъ, съ двояко-перистыми листьями. Прочная свѣтло-коричневая, тонущая въ водѣ, древесина, съ запахомъ, напоминающимъ фиалку, доставляетъ «синій сандалъ», или кампешъ, который содержитъ «гематоксеплонъ», одно изъ важѣйшихъ, красящихъ въ красный, синій и фиолетовый цвѣта, веществъ. Такъ какъ древесина съ теченіемъ времени и отъ сырости легко портится, то недавно экстрактъ древесины, или, иначе, синій сандалъ, сталъ появляться въ торговлѣ въ круглыхъ или плоскихъ плиточкахъ темнаго цвѣта. Лучшій сандалъ доставляетъ въ настоящее время Табаско.

Сандальное дерево африканское (*Pterocarpus santalinoides* L'Herit). Дерево родомъ изъ Анголы и Сьерры-Леоны. Доставляетъ африканское сандальное дерево.

Сандальное дерево бѣлое (*Santalum album* L.). Индѣйское дерево. Дерево родомъ изъ Остѣ-Индіи, съ Малабарскихъ и Зондскихъ острововъ. Пахучая (нѣсколько напоминающая запахомъ розу) древесина доставляетъ бѣлый или желтый сандалъ, употребляющійся большею частью для куреній и какъ подбѣлочный матеріалъ, и составляетъ цѣнный предметъ торговли. Китайцы употребляютъ душистую древесину на фанерки, въера и прочія дорогія бездѣлушки, особенно на выдѣлку чехолъ. Изъ древесины вытачиваются также божки, которыми украшаются буддійскіе храмы. Главнымъ-же образомъ, древесина съ запахомъ служитъ китайцамъ, какъ куреніе, употребляемое въ храмахъ и при похоронныхъ предѣсахъ. Зажиточныя арабы окуриваютъ ею свои жилища и вѣт чиваютъ изъ нея чубуки. Бѣлый сандалъ въ медицинѣ не употребляется.

Сандальное дерево красное (*Pterocarpus santalinus* L.). Дерево съ перисто-перистыми листьями, родомъ изъ Остѣ-Индіи, произрастающее на островахъ: Тиморѣ, Малаккѣ и Цейлонѣ. Его черная съ жилами, очень тяжелая и пахучая древесина

доставляетъ настоящее красное сандалное дерево, употребляющееся, какъ матеріалъ для фанерныхъ и тонкихъ токарныхъ работъ. Кромѣ того, древесина содержитъ красильное красное вещество—«красный сандалъ», употребляемое въ красильномъ производствѣ, а также входящее нерѣдко въ составъ зубныхъ порошковъ.

МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНІЕ. Древесину ствола и сучьевъ сандалнаго дерева разрѣзаютъ на куски, которые идутъ въ продажу для красильныхъ цѣлей, или-же куски превращаютъ въ мелкій темно-краснаго цвѣта порошокъ, изъ котораго въ аптекахъ добываютъ смолу—санталинъ.

Санталинъ употреблялся прежними врачами внутрь, какъ легкое вяжущее средство, при кровохарканіи и кровавомъ поносѣ въ настоящее время санталинъ служитъ для приготовления пилюль и, какъ красящее вещество, употребляется для окрашивания зубного порошка, свѣчекъ для куренія, зубныхъ элексировъ. Какъ краска, санталинъ считается вполне безвреднымъ.

Изъ желтаго сандалнаго дерева вырабатывается сандалное масло (*Oleum sandali*), которое имѣетъ въ медицинѣ большое примѣненіе и дается отъ гоннорей. Сандаловое масло желтаго цвѣта принимается въ эластическихъ капсуляхъ. На капсулю даютъ отъ 4-хъ до 6-ти капель 3—4 раза въ день. Въ продажѣ существуютъ такъ называемыя индійскія капсули отъ гоннорей, которыя содержатъ въ себѣ ничто иное, какъ сандаловое масло.

Сандалное дерево красное, см. Цезальпинія бразильская (*Caesalpinia brasiliensis* Sw.).

Сандалное дерево ненастоящее, см. Сапнаное дерево (*Caesalpinia Sappan* L.).

Сандаракъ кустъ (*Callitris quadrivalvis* Vent.). Финикійскій кедръ. Кустарникъ или дерево, по внѣшнему виду напоминающій кипарисъ, съ распростертыми вѣтвями и острыми листьями; родомъ изъ сѣверной Африки, весьма распространенный по всему Алжиру, гдѣ дерево употребляется, какъ строительный матеріалъ. Изъ-подъ коры выдѣляется смолистый сокъ, въ сгущенномъ видѣ извѣстный подъ названіемъ «сандарака», который въ настоящее время входитъ въ составъ курительныхъ порошковъ, употребляемыхъ при ревматизмѣ, ломотѣ и т. д.; растворенный въ эфирныхъ маслахъ сандаракъ доставляетъ прекрасный лакъ.

Сановникъ, см. Тысячелистникъ обыкновенный (*Achillea Millefolium* L.).

Санфоевъ, см. Эспарсетъ кормовой (*Onobrychis sativa* Lam.).

Сапожки, см. Башмачки желтые (*Cypripedium Calceolus* L.).

Сапожки, см. Васильки рогаые (*Delphinium Consolida* L.).

Сапожки Богородичны трава, см. Голубки обыкновенные (*Aquilegia vulgaris* L.).

Сапожки Богородицыны, см. Башмачки желтые (*Cypripedium Calceolus* L.).

- Сапожки возулины**, см. Чина весенняя (*Orobis vernus* L.).
- Сапожки кукушкины**, см. Башмачки желтые (*Cypripedium Calceolus* L.).
- Сапожки кукушкины**, см. Кальцеолярия (*Calceolaria* Lin.).
- Сапожки марьины**, см. Башмачки желтые (*Cypripedium calceolus* L.).
- Сапожникъ**, см. Иванъ-чай (*Epilobium angustifolium* L.).
- Сапонарія**, см. Икотникъ сѣро-зеленый (*Berteroa incana* DC.).
- Сапанановое дерево** (*Caesalpinia Sappan* L.). Сандальное дерево венастое. Дерево родомъ изъ Остъ-Индіи, доставляетъ цѣнную красильную древесину, известную подъ названіемъ «сапанановаго дерева», дающую при вывариваніи красную краску. Лучшій сортъ сапанановаго дерева получается изъ Сіама.
- Сапукой** (*Lecythis Ollaria* L.). Горшечное дерево. Огромнѣйшее дерево въ лѣсахъ Бразиліи съ большими, величиною съ ладонь, овально-сердцевидными листьями и съ плодами, величиною съ дѣтскую голову, заключающими сѣмена, вкусомъ напоминающія миндаль; сѣмена употребляются въ пищу сырыя и поджаренныя; кромѣ того, изъ нихъ выжимаютъ масло. Кора, которая расщепляется на тонкіе бумагообразные слои, служитъ, какъ пакля, какъ матеріалъ на бумажныхъ фабрикахъ и для обертыванія сигаръ. Дерево, благодаря своей крѣпости и прочности, употребляется на постройки.
- Сарабалина**, см. Ежевика обыкновенная (*Rubus fruticosus* L.).
- Сарана**, см. Асфодель (*Asphodelus ramosus* L.).
- Сарана** } см. Кудри царскія (*Lilium Martagon* L.).
- Сарана алая** }
- Сарана бѣлая** } см. Сарана лѣсная (*Lilium spectabile* Link.).
- Сарана большая** }
- Сарана желтая**, см. Кудри царскія (*Lilium Martagon* L.).
- Сарана зубчатая**, см. Сарана лѣсная (*Lilium spectabile* Link.).
- Сарана лѣсная** (*Lilium spectabile* Link.). Сарана большая, Сарана бѣлая, зубчатая, Златолавъ. Луковичное многолѣтнее травянистое растеніе изъ семейства «лилейныхъ» (*Liliaceae* DC.), распространенное преимущественно на сѣверѣ и въ Сибири. Луковицы въ Верхоянскомъ округѣ употребляются въ пищу, въ лакомства, и, кромѣ того, изъ нихъ приготавливаютъ напикотъ, похожій на шоколадъ.
- Сарана турецкая** } см. Кудри царскія (*Lilium Martagon* L.).
- Саранка** }
- Сардана**, см. Хохлатка плотная (*Corydalis solida* Smith.).
- Сардана**, см. Колеечникъ (*Hedysarum esculentum* Ledeb.).
- Сардана**, см. Кудри царскія (*Lilium Martagon* L.).
- Сарсапарилла**, см. Сассапарель (*Smilax China* L.).
- Сарсапарилль**, см. Сассапариль итальянская (*Smilax aspera* L.).
- Сарыбаракъ**, см. Зольникъ галійный (*Salsola Kali* L.).
- Сассапарель** (*Smilax China* L.). Фармацевтическое назв.: *China orientalis*, s. *nodosa*, s. *ponderosa* (Radix). Корень чапуинскій или чувашинскій, Сарсапарилла. Корень называется «хинный»

корень». Лазящее или вьющееся растение съ попеременно расположенными, эллиптическими или сердцевидными листьями и цвѣтами, образующими зонтичныя соцветія, изъ семейства «лилейныхъ» (Liliaceae Dc.), произрастающее въ Китаѣ и Японіи. Клубневидные корни, по вышнему виду напоминающие картофель, прежде употреблялись противъ ломоты и сифилиса, въ настоящее время употребленію ихъ вытѣснено сассапарилью американской.

Сассапарель остъ-индская (*Calotropis procera* R. Br.). Мударъ настоящій, Содомскій виноградъ (упомянутъ въ Библии (Вгоро-зак. XXXII, 32). Высокій кустарникъ, произрастающій въ Остъ-Индіи. Волокна дуба употребляются, какъ матеріаль для пряжи. Все растение содержитъ обильный молочный сокъ, изъ котораго выдѣлываютъ родъ каучука.

Сассапариль американская (*Smilax Tournef.*). Лазящія растенія съ попеременно расположенными эллиптическими или яйцевидными листьями и цвѣтами, образующими зонтичныя соцветія, изъ семейства «лилейныхъ» (Liliaceae Dc.), распространены болѣе въ теплыхъ странахъ Америки. Различаютъ различные сорта сассапарили, главнымъ образомъ, по анатомическому строенію корня. Всѣ сорта имѣють примѣненіе въ медицинѣ.

МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНІЕ. Въ продажѣ существуетъ нѣсколько видовъ сассапарили. Корень рѣжется на мелкіе куски и въ этомъ видѣ сохраняется. Составныя части сассапарили: эфирное масло, горькая, острая смола, крахмалъ, экстрактивные вещества, древесныя волокна и дѣйствующее вещество сассапарили, извѣстное подъ именемъ смилацина.

Сассапариль славится, какъ старое, до настоящаго времени пѣнное средство отъ застарѣлаго сифилиса, подагры, хроническаго ревматизма суставовъ и отъ золотуши. Порошокъ сассапарили накладываютъ въ трубку и курятъ, какъ табакъ, отъ приступовъ астмы. Въ аптекахъ изъ сассапарили, въ смѣси съ другими веществами, приготавливаютъ различные экстракты, декокты и сиропы. Въ особенности отъ хроническаго сифилиса славится декоктъ Цитмана, состоящій изъ сассапарили и каломеля. Экстрактъ этотъ дѣйствуетъ немного слабительно и принимается въ большомъ количествѣ, отъ $\frac{1}{2}$ фунта до 1-го фунта раза два въ день; онъ вызываетъ послѣ себя обильный потъ. Существуютъ два вида Цитманова декокта: слабый и сильный; чаще назначаютъ слабый.

Въ гомеопатіи сассапариль употребляется отъ чесотки, отъ ревматизма, подагры, отъ запоровъ и болѣзней мочевого пузыря и почекъ.

Сассапариль итальянская (*Smilax aspera* L.). Повой высокий, Тина, Тинъ. Вьющееся растение изъ семейства «лилейныхъ» (Liliaceae Dc.), распространенное въ Италіи, въ Греціи; вообще на югъ Европы, живеть преимущественно на платанахъ. Корни употребляются вмѣсто настоящей сассапарили и

пзвѣстны въ торговлѣ подъ названіемъ «итальянской сассапарили». Душистые цвѣты употреблялись древними для вѣнковъ во время празднествъ въ честь бога Бахуса. Въ настоящее время красные круглые плоды сассапарили употребляются въ Греціи для украшенія букетовъ, женщины-же нерѣдко вплетаютъ ихъ въ волосы, что составляетъ красивый головной уборъ.

Сассафрасъ (*Sassafras officinalis* Nees.). Высокій кустарникъ или дерево изъ семейства «лавровыхъ» (*Lauraceae*), родомъ изъ южной Америки, съ цѣлыми или 3-хлопастными листьями. Листья, душистая, напоминающая запахомъ анисъ и пряная на вкусъ, древесина, корень, кора и масло изъ плодовъ употребляются въ медицинѣ. Въ Сѣверной Америкѣ масло, ради аромата, любятъ прибавлять въ мыла, въ напитки и табакъ.

МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНІЕ. Сассафрасовое дерево употреблялось прежде, какъ сильное возбуждающее средство, дѣйствующее преимущественно на кожу, которое, кромѣ того, улучшаетъ нервное состояніе. Изъ него готовятъ отваръ и декоктъ, которые принимаютъ отъ ревматизма, сифилиса, водянки. Кора дерева имѣетъ болѣе острый вкусъ, она употребляется такъ-же, какъ и само дерево.

Сатиръ бѣлый, см. Фіалка ночная (*Platanthera bifolia* Rich.).

Сатиръ мужской, см. Ятрышникъ мужской (*Orchis mascula* L.).

Сафлоръ, см. Сафлоръ крапильный (*Carthamus tinctorius* L.).

Сафлоръ красильный (*Carthamus tinctorius* L.). Фармацевтическое назв.: *Crocus hortensis*, s. *Spicus sativus*. Воронка (на Терекѣ), Желтяница трава (у Дая: Жистяница), Картамусъ, Крокъс (Слав. и Бел. Росс.), Крокъс (Малор.), Крокусъ (Вѣлор.) и изм. Крокинь (Под.), Кржусъ (Черн.), Свѣтлица (Екат.), Свѣтлушка (Полт.), Свѣтлуха (Херс.), Свѣтлухи (Рог.), Сафлоръ красильный, Шафлоръ, Шпфлоръ, Шафранъ дикій, Чигранъ, Чихранъ, Щетка. Однолѣтнее травянистое растение изъ семейства «сложноцвѣтныхъ» (*Compositae* Adans.), распространенное въ Египтѣ; разводится въ Закавказьи и Туркестанѣ. Стебель выш. 7—14 вершк., голый, наверху вѣтвистый, каждая вѣтвь несетъ по колзникѣ ярко-оранжевыхъ цвѣтовъ. Листья сидячіе, продолговато-яйцевидные, кожистые, колючезубчатые. Каждая корзинка снабжена оберткой, внутренніе листья которой пленчатые, ланцетные, цѣльнокрайніе, острые; средніе—на верхушкѣ съ листовиднымъ, колючо-зубчатымъ придѣлкомъ, наружные—продолговатые, листовидные. Всѣ цвѣты трубчатые обооловые. Вѣнчикъ 5-тизубчатый; тычинокъ 5; нити ихъ свободны, пыльники-же спаяны въ трубочку, чрезъ которую проходитъ столбикъ съ раздвоеннымъ рыльцемъ, узловато-утолщенный при основаніи рылецъ и обыкновенно снабж. ный въ этомъ мѣстѣ кольцомъ волосковъ. Завязь нижняя одногнздная, односѣмянная. Плодъ—сѣмянка. Цвѣтетъ во второй половинѣ лѣта. Изъ цвѣтовъ добывается пурпуровая краска, которая идетъ на окраску шелка и на румяна; ихъ подмѣшиваютъ также въ шафранъ (фальсификація). (Р и с. 265.)

Сафой, или Савойская капуста (*Brassica oleracea Sabauda* L.). Вирзингъ. Кудрявая капуста. Одна изъ разновидностей капусты огородной (описание см. выше: «Капуста огородная» (*Brassica oleracea* L.), съ морщинистыми курчавыми листьями, образующими рыхлый кочанъ. Разводится на огородахъ. (Р и с. 266.)

Сахарная пальма, см. Саговая пальма (*Arenga saccharifera* Labill.).

Сахарники, см. Ленъ дикий (*Linaria vulgaris* Mill.).

Сахарникъ, см. Поручейникъ широколистный (*Slum latifolium* L.).

Сахарникъ, см. Сахарные или сладкіе коренья (*Slum Sisarum* L.).

Сахарные коренья, см. Сладкій корень (*Scorzonera hispanica* L.).

Сахарные или сладкіе коренья (*Slum Sisarum* L.). Сахарникъ (Даль), Кучмерка (Кондр. и Даль). Многолѣтнее травянистое растение изъ семейства «зонтичныхъ» (*Umbelliferae* Juss.), родомъ изъ Азіи, съ ползучими подземными побѣгами; стебель прямой, гранистый; нижніе листья перистые, верхніе — тройственные. Мелкіе бѣлые цвѣты въ зонтикахъ, снабженныхъ покрываломъ и покрывальцами. Чашечка 5-тизубчатая; вѣнчикъ 5-тилепестный. Тычинокъ 5; завязь нижняя, двугнѣзная; столбикъ 2, расширенныхъ при основаніи въ дискъ, покрывающій верхушку завязи. Овальный, слегка сжатый съ боковъ, плодъ состоитъ изъ 2-хъ сѣмянокъ, отдѣляющихся снизу вверхъ отъ остающагося на цвѣтоножкѣ раздвоеннаго столбика. Сѣмянки — 5-тигранныя. Цвѣтетъ лѣтомъ. Разводится въ огородахъ, какъ овощъ, ради сладкаго, прянаго на вкусъ, питательнаго корня.

Сачавиця } см. Чечевица (*Ervum Lens* L.).

Сачевиця } см. Чечевица (*Ervum Lens* L.).

Сачеговка, см. Иванъ да Марья (*Melampyrum nemorosum* L.).

Сбаночки, см. Наперстянка крупноцвѣтная (*Digitalis grandiflora* Lam.).

Сварка } см. Цминъ (*Helichrisum arenarium* Dc.).

Сварливецъ } см. Цминъ (*Helichrisum arenarium* Dc.).

Сварникъ, см. Ежеголовка вѣтвистая (*Sparganium ramosum* L.).

Свекла, см. Свекла обыкновенная (*Beta vulgaris* L.).

Свекла обыкновенная (*Beta vulgaris* L.). Свекла, Буракъ, Свекловичникъ, Ботва, Ботвиния. Однолѣтнее и двухлѣтнее травянистое растение изъ семейства «маревыхъ» (*Chenopodiaceae* Vent.), произрастающее въ дикомъ видѣ по берегамъ Средиземнаго моря. Корень тонкій; стебель прямостоящій, выш. отъ $\frac{1}{2}$ до 1 арш. Прикорневые листья длинно-черешковые, сердцевидно-яйцевидные, тупые; стеблевые листья пр. продолговато-ланцетные. Цвѣты мелкіе, пазушные, въ длинныхъ обильственныхъ колосьяхъ. Околоцвѣтникъ травянистый, 5-тираздѣльный. Тычинокъ 5; завязь одногнѣзная, съ однимъ яичкомъ; столбиковъ 2—3. Плодъ — сѣмянка, заключенная въ одервенѣвшій угловатый околоцвѣтникъ. Воздѣлываемые многочисленные сорта свеклы распадаются на 4 группы: мангольдъ или свекловичникъ разводится ради листьевъ, употребляемыхъ въ пищу; корни кормовой

свеклы идутъ въ кормъ скоту; сахарная свекла служитъ для добыванія сахара, который содержится въ ней въ значительномъ количествѣ; столовая или огородная свекла, съ нѣжными и пріятными на вкусъ корнями, то веретенообразными, то круглыми, смотря по сорту. (Рис. 267.)

МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНІЕ свеклы извѣстно только въ домашнемъ быту. Свекла имѣетъ слабительныя свойства. Изъ вареныхъ корешковъ свеклы дѣлаютъ клистиры при упорныхъ запорахъ. Свекольный супъ тоже слабить. Отваромъ свеклы обмываютъ глаза, также на воспаленныя вѣки прикладываютъ толченныя свекольныя листья; изъ корней свеклы вывариваютъ сокъ, который втягиваютъ въ носъ при заложенномъ носѣ отъ насморка, онъ вызываетъ чиханіе; этотъ-же сокъ кладутъ на ваткѣ въ уши отъ головной боли. Сырую свеклу держатъ во рту отъ зубной боли. Какъ и всѣ овощи, свекла очень полезна людямъ, страдающимъ цынгою.

Свекловичникъ } см. Свекла обыкновенная (*Beta vulgaris* L.).
Свеколка }

Свентоянникъ, см. Пахучка обыкновенная (*Calamintha Clinopodium* Benth.).

Свербарыка, см. Свербига восточная (*Bunias orientalis* L.).

Свербежная трава, см. Сивецъ луговой (*Scabiosa succisa* L.).

Свербежница, см. Короставникъ полевой (*Scabiosa arvensis* L.).

Свербежница, см. Сивецъ луговой (*Scabiosa succisa* L.).

Свербейка, см. Купырѣ льсной (*Anthriscus silvestris* Hoffm.).

Свербейка, см. Свербига восточная (*Bunias orientalis* L.).

Свербейка, см. Горчица дикая (*Sinapsis arvensis* L.).

Свербига, см. Свербига восточная (*Bunias orientalis* L.).

Свербига восточная (*Bunias orientalis* L.). Бздуха (Вор.), Горлупа, Гарлуиникъ (Тамб.) и изм. Гарлупа, Горлюна, Гарлюпа, Гарлина (Вор.), Курлѣпа (Ниж.), Икярлупа (Херс.), Дряна (Тул., Даль), Грепки (Екат., Херс.), Грыцкѣ, Порчакъ (Мал.), Рѣничокъ и изм. Рѣнецъ, Дикая рѣдка (въ больш. части Бел. Росс.), Рѣдьковникъ (Арх.), Свербига (Моск., Двин., Малор.), Свербигузь (въ Малороссіи этотъ именемъ называютъ стебель, а все растение—Додельникъ), Свербейка (Курск.) и изм. Свербигузь, Свербарыка, Сербигузь (Кал.), Свирѣпа, Свирѣпа (Малор.), Сурѣпа (Даль), Сурѣница (Тамб.), Чинбаракъ, Чинбарокъ, Шарбарина (Кал.), смѣш. Купырѣ (Даль), Караякъ, Варбора, Вѣрбора, Цихорія полевая (Ниж.), Мятлякъ (Могил.). Двудѣтное травянистое растение изъ семейства «крестоцвѣтныхъ» (*Cruciferae* Juss.), распространенное въ южной Швеціи, Германіи, Австріи, во всей Россіи, въ Крыму и на Кавказѣ. Стебель шероховатый, листья шершавые отъ вѣтвистыхъ волосковъ; нижніе листья ланцетные, съ большими продолговато-ланцетными, при основаніи стрѣловидно-копьевидными, непарными долями; слѣдующіе—зубчатые, при основаніи копьевидные, острые; верхніе—ланцетные, съ суженымъ основаніемъ. Чашечка изъ 2-хъ паръ опадающихъ во время цвѣтенія горизонтальныхъ листочковъ. Вѣнчикъ состоитъ

изъ 4-хъ желтыхъ, расположенныхъ на-крестъ, лепестковъ. Тычинокъ 6, изъ которыхъ 2 короче и 4 длиннѣе. Пестикъ состоитъ изъ 2-хъ плодоложниковъ. Плодъ — неравнобокое, бугорчатое, съ коническимъ столбикомъ, стручечка, на косо-вверхъ-стоящихъ цветоножкахъ. Растетъ на сорныхъ мѣстахъ и на поляхъ. Цвѣтетъ лѣтомъ.

Свербигузка, см. Горчица дикая (*Sinapsis arvensis* L.).

Свербигузно } см. Бутень клубненосный (*Chaerophyllum bulbosum* L.).

Свербигузь, см. Свербига восточная (*Bunias orientalis* L.).

Свербигузь, см. Кушуръ лѣсной (*Anthriscus silvestris* Hoffm.).

Свербигузь, см. Первоцвѣтъ лекарственный (*Primula officinalis* Jacq.).

Свербигузь, см. Пушпырь обыкновенный (*Torilis Anthriscus* Gärtn.).

Свербигузь, см. Окопникъ лекарственный (*Symphytum officinale* L.).

Свертки, см. Клеверъ красноблѣйшій (*Trifolium hybridum* L.).

Сверція многолѣтная (*Sweria perennis* L.). Трипутникъ (Мяск.), Болотный василекъ (Перм.), Звѣробой горекій. Многолѣтнее травянистое растеніе изъ семейства «горечавковыхъ» (*Gentianaceae* Juss.), распространенное въ средней Европѣ, изрѣдка встрѣчающееся въ западной Россіи. Стебель прямостоящій, 4-хгранный, выш. 3½—7 вершковъ. Прикорневые листья черешковые, эллиптическіе, верхніе — сидячіе, ланцетные, супротивные. Соцвѣтіе узкое, метельчатое. Цвѣты пазушные, на крылатыхъ 4-хгранныхъ ножкахъ. Чашечка 4—5-тираздѣльная. Вѣнчикъ колесовидный, 5-тилепестный, грязно-фіолетовый, рѣже желтый. Тычинокъ 5. Завязь верхняя, одногнѣздная. Плодъ — корбочка. Растетъ на торфяныхъ лугахъ. Цвѣтетъ лѣтомъ. (Рис. 268.)

Свида, см. Кленъ татарскій (*Acer tataricum* L.).

Свидва

Свидзина } см. Свидина (*Cornus sanguinea* L.).

Свидзина, см. Жимлость обыкновенная (*Lonicera Xylosteum* L.).

Свидина (*Cornus sanguinea* L.). Фармацевтическое названіе: *Cornus femina*. Глогъ, Ягода глогова, Деренъ, Кизиль (Хар.), Куро-сѣвнякъ, Куросѣвъ, Слѣнокуръ, Слѣнокурникъ, Куриная слѣ-пота (Кал.), Кизыльникъ, Свидина (Зап. Росс.), Свидзина, Сви-динъ, Свидовакъ, Свидовое дерево (Гродн., Хар., Курск.), Свидва, Сникъ (Малор., Рог.). Кустарникъ выш. отъ 1 до 1½ сажени, изъ семейства «кизилевыхъ» (*Cornaceae* DC.), распространен- ный въ средней и южной Европѣ, встрѣчающійся въ средней и южной Россіи. Вѣтви лѣтомъ буровато-зеленыя, осенью и зи- мой кроваво-красныя. Листья супротивные, заостренные, яйце-видные, сверху темно-зеленые, снизу нѣсколько блѣднѣе, съ обѣихъ сторонъ покрыты короткими шелковистыми волосками. Бѣлые цвѣты расположены зонтикообразной метелкой, лишен- ной обертки. Цвѣты правильные. Чашелистиковъ, лепестковъ

и тычинокъ по 4. Завязь нижняя, двугнѣзная, съ однимъ столбикомъ. Плодъ—шаровидная черная мелкая костянка. Встрѣчается между кустарниками и въ рощахъ; часто разводится въ садахъ и паркахъ, какъ декоративный кустарникъ.

Свидина, см. Бересклеть европейскій (*Evonymus europaeus* L.).

Свидинъ, см. Свидна (*Cornus sanguinea* L.).

Свидовникъ

Свидовое дерево } см. Свидна (*Cornus sanguinea* L.).

Свидъ, см. Крушина ломкая (*Rhamnus frangula* L.).

Свинарникъ, см. Борщевикъ сибирскій (*Heracleum sibiricum* L.).

Свиная вошь, см. Сельдерей (*Apium graveolens* L.).

Свиная вошь, см. Болиголовъ крапчатый (*Conium maculatum* L.).

Свиная рѣпа, см. Просвирникъ сѣверный (*Malva borealis* Walbm.).

Свиная трава, см. Гречиха-спорышъ, или гречиха птичья (*Polygonum aviculare* L.).

Свиная трава, см. Лапчатка серебристая (*Potentilla argentea* L.).

Свиная трава, см. Норичникъ узловатый (*Scrophularia nodosa* L.).

Свиная трава, см. Яичное дерево (*Solanum avigerum* L.).

Свиной буркунъ, см. Гречиха птичья, или гречиха-спорышъ (*Polygonum aviculare* L.).

Свиной горохъ, см. Просвирникъ сѣверный (*Malva borealis* Walbm.).

Свиной корень, см. Безстебельникъ колючій (*Carlina subacaulis* DC.).

Свинокропъ, см. Жабникъ пашенный (*Filago arvensis* L.).

Свинуха, см. Гречиха-спорышъ (*Polygonum aviculare* L.).

Свинуха, см. Норичникъ водяной (*Scrophularia aquatica* L.).

Свинухъ, см. Лапчатка серебристая (*Potentilla argentea* L.).

Свинушка, см. Бутень клубнелосный (*Chaerophyllum bulbosum* L.).

Свинушка, см. Синеголовникъ плосколистный (*Eryngium planum* L.).

Свинушка, см. Борщевикъ сибирскій (*Heracleum sibiricum* L.).

Свинушки, см. Шалфей луговой (*Salvia pratensis* L.).

Свинушникъ, см. Шалфей мутовчатый (*Salvia verticillata* L.).

Свинушникъ, см. Толокнянка обыкновенная (*Arctostaphylos officinalis* Moench.).

Свинцовида, см. Свинцовка (*Plumbago europaea* L.).

Свинцовка (*Plumbago europaea* L.). Фармацевтическое названіе: *Dentaria* v. *Dentillaria* (*Radix et Herba*). Рѣпа свинцовая, Руда свинцовая, Свинцовица. Растеніе, произрастающее на югѣ Европы, весьма острое и производитъ раны на кожѣ, чѣмъ пользуются англійскіе нищіе.

Медицинское употребленіе. Въ медицинѣ корень и все ра-

стеніе употреблялись въ прежнее время отъ зубной боли, болѣзней кожи, чесотки, даже отъ раковыхъ опухолей; теперь растеніе это врачами совѣтъ оставлено. Въ народѣ свинцовку еще употребляютъ снаружи отъ чесотки и головной боли. Листья и корень растенія настаиваютъ на маслѣ и настой прикладываютъ на кожу. Этимъ-же масломъ смазываютъ лошадейъ ссадины на кожѣ, появляющіяся отъ тренія сѣдлами и сбруей. Свѣжій кусочекъ корня кладутъ въ дупло больного зуба.

Свинюшникъ, см. Клоповникъ (*Lepidium ruderae* L.).

Свинякъ, см. Норичникъ узловатый (*Scrophularia nodosa* L.).

Свинятникъ, см. Вагульникъ болотный (*Ledum palustre* L.).

Свинячникъ, см. Хвощъ полевой (*Equisetum arvense* L.).

Свинячья трава, см. Герань луговая (*Geranium pratense* L.).

Свирипа, см. Желтоцвѣтъ пахучій (*Barbarea vulgaris* R. Br.).

Свирипа, см. Желтуха (*Senecio Jacobaea* L.).

Свирипа } см. Горчица дикая (*Sinapsis arvensis* L.).

Свирипа

Свирипа, см. Свербига восточная (*Bunias orientalis* L.).

Свирипица, см. Горчица дикая (*Sinapsis arvensis* L.).

Свирипка, см. Желтушникъ левкойный (*Erysimum cheiranthoides* L.).

Свирка } см. Пихта европейская (*Abies pectinata*

Свирковое дерево } *Laud.*)

Свирѣпа, см. Сурѣпица (*Brassica Rapa* L.).

Свирѣпа, см. Свербига восточная (*Bunias orientalis* L.).

Свирѣпа, см. Рѣдка дикая (*Raphanus Raphanistrum* L.).

Свирѣпа, см. Горчица дикая (*Sinapsis arvensis* L.).

Свирѣпа дикая, см. Рѣдка дикая (*Raphanus Raphanistrum* L.).

Свирѣпица, см. Горчица дикая (*Sinapsis arvensis* L.).

Свирѣпица, см. Желтушникъ левкойный (*Erysimum cheiranthoides* L.).

Свирѣпка, см. Рѣдка дикая (*Raphanus Raphanistrum* L.).

Свирѣпка, см. Гулявникъ лекарственный (*Sisymbrium officinale* L.).

Свирѣпка, см. Горчица бѣлая, или англійская (*Sinapsis alba* L.).

Свирѣпка, см. Чесночная трава (*Alliaria officinalis* Andr.).

Свистуля, см. Болиголовъ крапчатый (*Conium maculatum* L.).

Свистуха, см. Ковыль перистый (*Stipa pennata* L.).

Свистушка, см. Мятликъ лѣсной (*Poa nemoralis* L.).

Свитень, см. Вьюнокъ заборный (*Convolvulus sepium* L.).

Свитень, см. Триостренникъ болотный (*Triglochin palustre* L.).

Свитлухи, см. Сафлоръ красильный (*Carthamus tinctorius* L.).

Свирипа, см. Брюква (*Brassica Napus* L.).

Свѣтлуха, см. Сафлоръ красильный (*Carthamus tinctorius* L.).

Свѣчка царьская, см. Коровякъ мохнатый (*Verbascum phlomisoides* L.).

Своборина } см. Шиповникъ (*Rosa canina* L.).

Свороборина

Свыропа, см. Рѣдка дикая (*Raphanus Raphanistrum* L.).

- Свѣтелка, см. Грушанка одноцвѣтная (*Pirola uniflora* L.).
 Свѣтильня ночная, см. Ослиникъ двулѣтній (*Oenothera biennis* L.).
 Свѣтлая, см. Чистотѣль большой (*Chelidonium majus* L.).
 Свѣтлебей, см. Клеверъ красно-бѣлый (*Trifolium hybridum* L.).
 Свѣтлебей, см. Клеверъ луговой (*Trifolium arvense* L.).
 Свѣтликъ, см. Очанка лекарственная (*Euphrasia officinalis* L.).
 Свѣтлица, см. Сафлоръ красильный (*Carthamus tinctorius* L.).
 Свѣтлица, см. Шафранъ настоящій (*Crocus sativus* L.).
 Свѣтлушка, см. Сафлоръ красильный (*Carthamus tinctorius* L.).
 Свѣтникъ, см. Дрема кукушкинъ цвѣтъ (*Lychnis flos cuculi* L.).
 Свѣтъ очей, см. Очанка лекарственная (*Euphrasia officinalis* L.).
 Свѣча ночная, см. Ослиникъ двулѣтній (*Oenothera biennis* L.).
 Свѣча царская, см. Коровякъ бѣлоцвѣтный (*Verbascum Lychnitis* L.).
 Свѣча царская, см. Медвѣжье ухо (*Verbascum Thapsus* L.).
 Свѣчка, см. Очанка лекарственная (*Euphrasia officinalis* L.).
 Свѣчникъ, см. Ослиникъ двулѣтній (*Oenothera biennis* L.).
 Свѣчное дерево (*Aleurites triloba* Forst.). Орѣхъ молуккскій. Дерево, произрастающее на Молуккскихъ островахъ. Кора его употребляется на дубленіе.
 Свѣчное дерево, см. Восковое, или свѣчное дерево (*Myrica cerifera* L.).
 Святаго Ивана зелье, см. Звѣробой обыкновенный (*Hypericum perforatum* L.).
 Святе зілля, см. Дурнишникъ колючій (*Xanthium spinosum* L.).
 Святое дерево, см. Полынь полевая (*Artemisia campestris* L.).
 Святое дерево, см. Гваяковое дерево (*Guajacum officinale* L.).
 Святое дерево, см. Ацедерахъ (*Melia Azederach* L.).
 Святое деревцо, см. Полынь полевая (*Artemisia campestris* L.).
 Святоивановская трава, см. Звѣробой (*Hypericum perforatum* L.).
 Святоянская трава } см. Звѣробой обыкновенный (*Hypericum*
 Святоянское зелье } *perforatum* L.).
 Сдуванчики, см. Одуванчикъ лекарственный (*Taraxacum Dens Leonis* Desf.).
 Селачъ, см. Дягиль лѣсной (*Angelica silvestris* L.).
 Седашъ, см. Донникъ лекарственный (*Melilotus officinalis* Lam.).
 Седмачокъ обыкновенный, см. Седмичникъ европейскій (*Trientalis europaea* L.).
 Седмичникъ европейскій (*Trientalis europaea* L.). Вороньи очки (Могил.), Заячьи слезки (Тавр.), Мокрица (Твер.), Моковица (Арх.), Одинарникъ (Черн.), Седмачокъ обыкновенный (Гродн.). Трилистникъ, Троечница, Царевъ листъ (Смол.). Многолѣтнее травянистое растение изъ семейства «первоцвѣтныхъ» (*Primulaceae* Vent.), распространенное въ сѣверной и средней Европѣ, въ сѣверной и средней Россіи, въ Малороссіи и въ Сибіри. Стебель простой, прямостоящій, выш. 3½—5 вершк., съ эллипти-

ческими листьями. Большинство листьевъ сближено на верхушкѣ стебля розеткой, изъ середины которой выступаютъ отъ 1 до 4 бѣлыхъ или розоватыхъ, сидящихъ на длинныхъ цвѣтоножкахъ, цвѣтковь. Чашечка глубоко-раздѣльная, съ линейными, почти острыми долями. Вѣнчикъ колесовидный, до основания почти 7-мираздѣльный; доли его длиннѣе долей чашечки и тычинокъ. Тычинокъ 7. Завязь верхняя, одногнѣздная, съ однимъ столбикомъ. Плодь—коробочка. Цвѣтетъ въ маѣ и въ июнѣ. Растетъ въ лѣсахъ.

Селечочная трава вонючая навозная, см. Марь вонючая (*Chenopodium vulvaria* L.).

Селезеночникъ, см. Селезеночникъ очереднолистный (*Chrysosplenium alternifolium* L.).

Селезеночникъ очереднолистный (*Chrysosplenium alternifolium* L.). Фармацевтическое названіе: *Chrysosplenium* s. *Nasturtium petraeum*, s. *Saxifraga aurea*, s. *Hepatica aurea* (Herba). Грыжевая трава (Олон.), Жовтятица, Жовточница (Укр., Малор.), Золотинка (Пет., Костр.), Золотолистникъ (Вор.), Золото чертово (Вор.), Златоселезенникъ (Даль), Каменоломникъ (Могил.), Модень (Вол.), Медунца (Могил.), Мѣсячная трава (Арх.), Мѣсячная трава (Никол., Пот.), Одномѣсячная (Костр., Волог., Арх.), Первоцвѣтка (Волог.), Селеникъ, Селезеночникъ, Серебро чертово, Слѣпота курчья (Гродн.), Яичникъ, Яичный цвѣтъ (Тв.), Подъяичникъ. Многолѣтняя сочная травка, выш. до 3½ вершк., изъ семейства «каamelожковыхъ» (*Saxifragaceae* DC.), распространенная почти во всей Европѣ и во всей Россіи, покрытая рѣдкими волосками. Стебель трехгранный, съ очередными и золотисто-желтыми цвѣтами. Чашечка 4-храздѣльная, внутри желтая, съ 2 супротивными, менѣе крупными долями. Лепестковъ 5. Тычинокъ 8, попарно сближенныхъ, прикрепленныхъ вокругъ поднестиннаго диска. Плодь—коробочка съ блестящими черными семенами. Цвѣтетъ съ апрѣля по июль. Растетъ на влажныхъ мѣстахъ около ключей и въ сырыхъ лѣсахъ.

МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНІЕ. Растеніе обладаетъ слабымъ вяжущимъ свойствомъ и было въ прежнее время употребляемо врачами отъ кровохарканія и хронической гонорей. Въ настоящее время это лекарство извѣстно только въ народѣ.

Селедика, см. Плаунъ-баранецъ (*Lycopodium annotinum* L.).

Селеникъ, см. Бузина вонючая (*Sambucus Ebulus* L.).

Селеникъ, см. Селезеночникъ очереднолистный (*Chrysosplenium alternifolium* L.).

Селидоніева трава } см. Чистотѣль большой (*Chelidonium*
Селидонія } majus L.).
Селинамія }

Селифанъ, см. Коровякъ черный (*Verbascum nigrum* L.).

Сельдерей, см. Сельдерей обыкновенный (*Apium graveolens* L.).

Сельдерей обыкновенный (*Apium graveolens* L.). Петрушка дикая, Петрушка болотная, Свиная вошь, Сельдерей, Салдо-

рей (Сред.). Двулѣтнее травянистое растение изъ семейства «зонтичныхъ» (*Umbelliferae* Juss.), распространенное почти во всей Европѣ, на морскомъ берегу и солончакахъ въ южной Россіи и Туркестанѣ. Веретенообразный корень дико растущаго сельдерея становится въ культурѣ толстымъ, мясистымъ и округлымъ. Стебель, выш. 7—22½ вершк., гладкій и очень вѣтвистый. Нижніе листья черешковые, перисто-разсѣченные; верхніе—почти сидячіе, тройчатые; доли ихъ клиновидныя, на верхушкѣ надрѣзаныя и зубчатые, темно-зеленыя, сверху блестящія. Многочисленные мелкіе бѣлые цвѣты собраны сложными зонтиками о 3—6 главныхъ лучахъ, безъ обвертокъ и обверточекъ. Чашечка о 5-ти зубчикахъ; лепестковъ и тычинокъ по 5. Завязь нижняя, двугнѣздная, съ однимъ япчкомъ въ каждомъ гнѣздѣ; на верхушкѣ завязь несетъ железистый дискъ. Столбиковъ 2. Плодъ—округлая сѣмянка, при созрѣваніи распадающаяся на 2 плодика, изъ которыхъ каждый съ 5-ю нитевидными ребрами. Цвѣтетъ во второй половинѣ лѣта. Всюду разводится ради душистыхъ корней, какъ огородная овощъ. (Р и с. 269.)

МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНІЕ. Сельдерей врачами не выписывается и извѣстенъ только, какъ домашнее средство. Его корни и цвѣты имѣютъ мочегонное дѣйствіе. Древніе греки считали, что это растение приноситъ счастье, и потому вѣшали его въ комнатахъ вмѣстѣ съ лукомъ и чеснокомъ. Изъ зелени сельдерея они плели вѣнки побѣдителямъ и украшали имъ гробницы. Сельдерей полевая, см. Володушка золотистая (*Bupleurum aureum* Fisch.).

Селягинелля шиповатая (*Selaginella spinulosa* A. Br.). Маленькое многолѣтнее травянистое растение изъ семейства «селягинелловыхъ» (*Selaginellaceae*), 1—1½ вершк. выш. Стебель ползучій, листья съ ланцетовидными и пилосными колючими зубцами. Спорангіи (то-есть, вмѣстителища со спорами) сидятъ въ углахъ обыкновенныхъ листьевъ. Встрѣчается на камняхъ и утесахъ горныхъ странъ средней и сѣверной Европы, а также на Уралѣ.

Семибратная кровь, см. Звѣробой обыкновенный (*Hypericum perforatum* L.).

Семижилъникъ, см. Подорожникъ большой (*Plantago major* L.).

Семиколѣвникъ, см. Тростникъ обыкновенный (*Arundo Phragmites* L.).

Семиколѣвникъ жеанскій, см. Горчакъ (*Polygonum Persicaria* L.).

Семикопытишная, см. Герань луговая (*Geranium pratense* L.).

Семилаповка, см. Борецъ желтый (*Aconitum excelsum* Reich.).

Семилапочникъ, см. Лапчатка-узикъ (*Potentilla Tormentilla* Schrenk.).

Семиприточная, см. Аистникъ цикутный (*Erodium cicutarium* L.).

Семиродникъ, см. Соколий перелетъ (*Gentiana cruciata* L.).

Семисильникъ, см. Золототысячникъ обыкновенный (*Erythraea Centaurium* L.).

Семисильникъ, см. Норичникъ узловатый (*Scrophularia nodosa* L.).

Семитичникъ, см. Ястребинка зонтичная (*Hieracium umbellatum* L.).

Семиугольникъ, см. Соколий перелетъ (*Gentiana cruciata* L.).

Семицвѣтная, см. Копеечникъ (*Hedysarum esculentum* Ledeb.).

Семяшникъ, см. Валериана лекарственная (*Valeriana officinalis* L.).

Сенега (*Poligala Senega* L.). Фармацевтическое название: *Senega*, *Seneka*, v. *Poligala virginiana* (Rad.). Растеніе, распространенное въ лѣсахъ Америки. Корень его употребляется въ медицинѣ.

МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНІЕ. Корень сенегги, главнымъ образомъ его корка, обладаетъ свойствомъ послѣ принятія его внутрь возбуждать кашель, и потому отваръ корня издавна славится въ медицинѣ, какъ хорошее отхаркивающее средство, которое дается больнымъ въ тѣхъ случаяхъ, когда въ легкихъ много мокроты, но она съ трудомъ отдѣляется, какъ-то: при бронхиальной астмѣ, хроническомъ бронхитѣ и послѣ воспаленія легкихъ. Сенегу даютъ въ отварѣ: взрослымъ—отваръ изъ 1 драхмы на 6 унцъ (4 грм. на 120,0 грм.), который принимаютъ черезъ 2 часа по столовой ложкѣ. Къ отвару прибавляютъ сиропа для вкуса и еще какое-нибудь отхаркивающее средство, напр., анисовыя капли, на всю порцію 30—60 капель. Дѣтямъ такую микстуру даютъ чайными ложками. Долго принимать сенегу нельзя: она разстраиваетъ желудокъ. Въ аптекахъ изъ корня сенегги вываривается съ сахаромъ сиропъ, который дѣйствуетъ такъ-же, какъ и отваръ сенегги, и прибавляется врачами въ отхаркивающія микстуры.

Сенесовое дерево, см. Можжевельникъ казацкій (*Juniperus Sabina* L.).

Сенець, см. Живучка ползучая (*Ajuga reptans* L.).

Сербалина

Серваринникъ } см. Шиповникъ (*Rosa canina* L.).

Сербелина

Серберезъ, см. Тысячелистникъ обыкновенный (*Achillea Millefolium* L.).

Серберина, см. Воярышникъ обыкновенный (*Crataegus Oxyacantha* L.).

Сербигусъ

Сербигусъ } см. Свербига восточная (*Bunias orientalis* L.).

Сербалина

Серболынина } см. Шиповникъ (*Rosa canina* L.).

Сергибусъ, см. Свербига восточная (*Bunias orientalis* L.).

Сергибушъ, см. Бутень клубненосный (*Chaerophyllum bulbosum* L.).

Сердечная трава, см. Живучка ползучая (*Ajuga reptans* L.).

Сердечная трава, см. Манжерка обыкновенная (*Alchemilla vulgaris* L.).

- Сердечная трава, см. Копытень европейскій (*Asarum europaeum* L.).
- Сердечная трава, см. Пастушья сумка (*Capsella Bursa pastoris* Moench.).
- Сердечная трава, см. Василекъ луговой (*Centaurea jacea* L.).
- Сердечная трава, см. Подмаренникъ мягкій (*Galium Mollugo* L.).
- Сердечная трава, см. Соколій перелетъ (*Gentiana cruciata* L.).
- Сердечная трава, см. Девясилъ иволестный (*Inula salicina* L.).
- Сердечная трава, см. Пустырникъ обыкновенный (*Leonorus Cardiacus* L.).
- Сердечная трава, см. Зюзникъ европейскій (*Lycopus europaeus* L.).
- Сердечная трава, см. Майникъ двулистный (*Majanthemum bifolium* L.).
- Сердечная трава, см. Ужовникъ обыкновенный (*Ophloglossum vulgatum* L.).
- Сердечная трава, см. Чина весенняя (*Orobus vernus* L.).
- Сердечная трава, см. Бедренецъ обыкновенный (*Pimpinella Saxifraga* L.).
- Сердечная трава, см. Горлецъ, раковыя шейки (*Polygonum Bistorta* L.).
- Сердечная трава, см. Шлемникъ обыкновенный (*Scutellaria galericulata* L.).
- Сердечная трава, см. Очитокъ острый (*Sedum Telephium* L.).
- Сердечная трава, см. Звѣздчатка большая (*Stellaria Holostea* L.).
- Сердечная трава, см. Дубровка (*Veronica Chamaedrys* L.).
- Сердечная трава, см. Фиалка опушенная (*Viola hirta* L.).
- Сердечникъ, см. Зимолобка зонтичная (*Chimaphila umbellata* Nutt.).
- Сердечникъ, см. Купена лекарственная (*Convallaria Polygonatum* L.).
- Сердечникъ, см. Золототысячникъ обыкновенный (*Erythraea Centaurium* L.).
- Сердечникъ, см. Касатикъ водяной (*Iris pseudacorus* L.).
- Сердечникъ, см. Пустырникъ обыкновенный (*Leonorus Cardiacus* L.).
- Сердечникъ, см. Майникъ двулистный (*Majanthemum bifolium* L.).
- Сердечникъ, см. Кукушкины слезки (*Orchis maculata* L.).
- Сердечникъ, см. Чина черная (*Orobus niger* L.).
- Сердечникъ, см. Брусника (*Vaccinium Vitis Idaea* L.).
- Сердечникъ, см. Фиалка собачья (*Viola canina* L.).
- Сердечникъ, см. Дубровка (*Veronica Chamaedrys* L.).
- Сердечникъ, см. Сердечникъ полевой (*Cardamine pratensis* L.).
- Сердечникъ горькій (*Cardamine amara* L.). Фармацевтическое название: *Cardamine amara* s. *Nasturtium majus amarum*. Брункусъ (въ зеленныхъ лавкахъ Пет., очевидно, поперекъ Брунненкрессъ), Баймана. Буймина (Могил.), Жеруха водяная (Хар.), Жеруха криничная, Жеруха водяная (Мал.), Крестъ,

очев., искаж. Крессъ. (Курск.). Крессъ горькій луговой, Мокруха (Могил.), Рѣжуха, Рѣдка дикая (Вят.), Горькая трава (Арх.). Многолѣтнее, травянистое растеніе изъ семейства «крестоцвѣтныхъ» (Cruciferae Juss.), распространенное почти во всей Европѣ и въ большей части Россіи, выш. 4 $\frac{1}{2}$ —7 вершк. Стебель прямостоящій или приподнимающійся, бороздчатый, съ сердцевинною внутри. Листья перистые, съ 5—7 округлыми листочками. Бѣлые, рѣже блѣдно-розовые цвѣты въ небольшомъ числѣ собраны кистью. Чашечка изъ двухъ паръ опадающихъ листочковъ; вѣнчикъ 4-хлепестный; лепестки втрое длиннѣе чашелистиковъ и расположены на-крестъ. Тычинокъ 6, одинаковыхъ по длинѣ съ лепестками; пыльники фиолетовые. Плодъ—стручки на ножкахъ, вверхъ стоячіе, съ плоскими створками, съ толкимъ шиловиднымъ столбикомъ, длина котораго болѣе ширины стручка. Цвѣтеть съ апрѣля до іюня. Растетъ на влажныхъ лугахъ, на берегахъ рѣкъ и на болотахъ. Употребляется, какъ салатъ; листья на вкусъ менѣе остры, но болѣе горьковатые, чѣмъ листья водяного кресса. (Табл. XII, фиг. 234.)

МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНІЕ. Растеніе извѣстно только, какъ народное средство. Собирается оно въ концѣ мая или въ началѣ іюня, считается средствомъ, помогающимъ отъ цыгги, золотухи; ему приписывается также мочегонное и противокатарральное дѣйствіе; кромѣ того, его даютъ дѣтямъ отъ судорогъ. Употребляется свѣже-выжатый сокъ растенія. Взрослые берутъ по столовой ложкѣ съ сывороткой по нѣсколько разъ въ день. Цвѣты сушатъ, превращаютъ ихъ въ порошокъ, который принимаютъ утромъ и вечеромъ по 10-ти—20-ти гранъ (0,8—1,2 грм.).

Сердечникъ кошачій, см. Очанка лекарственная (*Euphrasia officinalis* L.).

Сердечникъ мужской, см. Бѣлоръ болотный (*Parnassia palustris* L.).

Сердечникъ полевой (*Cardamine pratensis* L.). Фармацевтическое названіе: *Nasturtium pratense* v. *Cardamine*, v. *Cuculus* (*Herba et Flores*). Жеруха болотна (Малор.), Бѣлоцвѣтка, Горчица полевая, луговая, Горлянка, Кардамонъ полевой, Кокушникъ (Щегл.), Крессъ ключевой, луговой (Щегл.), смольный (Даль), Смольянка (Щегл.), Поддѣска (Ниж.), Сердечникъ. Многолѣтнее травянистое растеніе изъ семейства «крестоцвѣтныхъ» (Cruciferae Juss.), распространенное по всей Европѣ и весьма обыкновенное въ Россіи, выш. 5—7 вершк. Стебель прямостоящій, голый. Листья перистые, съ 8—12 парными и болѣе крупными верхушечными листочками. Листочки прикорневыхъ листьевъ округлые и снабжены черешками; верхушечный листочекъ при основаніи сердцевидный. Листочки стеблевыхъ листьевъ продолговато-линейные, цѣльные или выемчато-зубчатые. Многочисленные цвѣты собраны кистью. Чашелистиковъ 4; вѣнчикъ 4-хлепестный; лепестки лиловые или бѣловатые, въ 3 раза длиннѣе чашелистиковъ. Тычинокъ 6; онѣ вдвое короче лепестковъ, съ желтыми пыльниками. Плодъ—линейные

сплюснутые стручки съ плоскими створками. Цвѣтетъ съ апрѣля до юня. Прохлѣстаетъ на лугахъ и въ лѣсахъ (Рис. 270.)

МЕДИЦИННОЕ УПОТРЕБЛЕНІЕ сердечника полевого то-же, что и предыдущаго растенія—сердечника горькаго.

Сердечное коренье, см. Горлець, раковыя шейки (*Polygonum Bistorta* L.).

Сердечный корень, см. Лапчатка-узыкъ (*Potentilla Tormentilla* Schrenk.).

Сердечный корень, см. Грушанка круглолистная (*Pirola rotundifolia* L.).

Сердешна трава, см. Чина весенняя (*Orobis vernus* L.).

Сердушникъ, см. Золототысячникъ обыкновенный (*Erythraea Centaureum* L.).

Сердцовая трава, см. Дрокъ красильный (*Genista tinctoria* L.).

Серебаринъ } см. Шиповникъ (*Rosa canina* L.).

Серебаринникъ } см. Шиповникъ (*Rosa canina* L.).

Серебаринникъ, см. Ландышъ майскій (*Convallaria majalis* L.).

Сереболина } см. Шиповникъ (*Rosa canina* L.).

Сереборинникъ } см. Шиповникъ (*Rosa canina* L.).

Серебренникъ, см. Лапчатка серебристая (*Potentilla argentea* L.).

Серебро чертово, см. Селезеночникъ очереднолистный (*Chrysosplenium alternifolium* L.).

Серебрякъ, см. Сабельникъ болотный (*Comarum palustre* L.).

Серебряная трава, см. Василишникъ голубковый (*Thalictrum aquilegifolium* L.).

Серебрянка, см. Лапчатка серебристая (*Potentilla argentea* L.).

Серебрянникъ, см. Лапчатка серебрист. (*Potentilla argentea* L.).

Серебряное дерево, см. Лохъ (*Elaeagnus hortensis* M. et B.).

Серебряный листъ, см. Кровохлебка лекарственная (*Sanguisorba officinalis* L.).

Сережка, см. Хлюпушка (*Silene inflata* Smith.).

Сережки, см. Черноголовка обыкновен. (*Prunella vulgaris* L.).

Сережки Матери Маріи, см. Чина луговая (*Lathyrus pratensis* L.).

Сережки сорочьи, см. Пасленъ сладкогорькій (*Solanum dulcamara* L.).

Сережникъ, см. Кленъ татарскій (*Acer tataricum* L.).

Сережникъ, см. Трясушка средняя (*Eriza media* L.).

Серпій, см. Серпуха красильная (*Serratula tinctoria* L.).

Серпій, см. Серпуха вѣценосная (*Serratula coronata* L.).

Серпій, см. Ч. пролохъ полевой (*Cirsium arvense* Scop.).

Серпій глухой, см. Валеріана лекарственная (*Valeriana officinalis* L.).

Серпій лѣсной, см. Гравилатъ водяной (*Geum rivale* L.).

Серпій п. левой, см. Бубенчики обыкновенные (*Adenophora lilifolia* Led.).

Серпій украинскій } см. Серпуха вѣценосная (*Serratula coronata* L.).

Серпія } (роната L.).

Серпія, см. Серпуха красильная (*Serratula tinctoria* L.).
 Серпникъ, см. Цикорій обыкновенный (*Cichorium Intybus* L.).
 Серпникъ } см. Рѣзакъ степной (*Falcaria Rivini* Host.).
 Серпица }
 Серпоризъ, см. Тысячелистникъ обыкновенный (*Achillea Millefolium* L.).
 Серпоризъ, см. Чихотная трава (*Ptarmica vulgaris* DC.).
 Серпоризъ, см. Рѣзакъ степной (*Falcaria Rivini* Host.).
 Серпоризъ, см. Тысячелистникъ обыкновенный (*Achillea Millefolium* L.).
 Серпорѣзъ, см. Тысячелистникъ обыкновенный (*Achillea Millefolium* L.).
 Серпорѣзъ, см. Рѣзакъ степной (*Falcaria Rivini* Host.).
 Серпорѣзъ, см. Ленъ дикій (*Linaria vulgaris* Mill.).
 Серпукъ, см. Серпуха вѣнценосная (*Serratula coronata* L.).
 Серпуха, см. Василекъ перистый (*Centaurea Scabiosa* L.).
 Серпуха, см. Герань луговая (*Geranium pratense* L.).
 Серпуха, см. Короставникъ полевой (*Scabiosa arvensis* L.).
 Серпуха, см. Серпуха вѣнценосная (*Serratula coronata* L.).
 Серпуха, см. Серпуха красильная (*Serratula tinctoria* L.).
 Серпуха вѣнценосная (*Serratula coronata* L.). Дурманъ (Пермь), Жовтило (Малор.), Заячы лапки (Уф.), Зеленица луговая (Кунгуръ), Коровьи языки (Уф.), Медвѣжьи пальцы (Уф.), Серпія (Ставр.), Серпій (Вор., Саратов.), Серпій украинскій (Черняев., Консп.), Серпукъ (Сиб., Gmel.), Серпуха (Нижег., Перм.). Многолѣтнее травянистое растение изъ семейства «сложноцвѣтныхъ» (*Compositae* Adans.), распространенное въ средней и сѣверной Европѣ, въ средней и южной Россіи и во всей Сибиріи. Стебель высокій, вѣтвистый, прикорневые листья черешковые, стеблевые—сидячіе, перисто-разсѣченные. Пурпуровые цвѣты въ крупныхъ яйцевидно-шаровидныхъ корзинкахъ, собранныхъ щиткообразной метелкой. Обертки головокъ состоятъ изъ острокопечныхъ, немного пушистыхъ, черепичато-расположенныхъ листочковъ; цвѣтоложе покрыто щетинками. Всѣ цвѣты трубчатые, съ 3—4-храздѣльнымъ вѣнчикомъ. Тычинокъ 5; пыльники при основаніи стрѣловидные. Завязь нижняя, одногнѣздная, односѣмянная, съ однимъ столбикомъ, который оканчивается 2-храздѣльнымъ рыльцемъ, утолщенъ при основаніи рыльца и снабженъ въ этомъ мѣстѣ кольцомъ волосковъ. Плодь—гладкія сѣмянки, снабженные летучками изъ зазубренныхъ волосковъ. Цвѣтетъ во второй половинѣ лѣта. Растетъ на влажныхъ лугахъ и изрѣдка между кустарниками. Употребляется для крашенія шерсти въ желтый цвѣтъ.

МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНІЕ этого растенія въ настоящее время совсѣмъ оставлено. Прежде растеніе давалось отъ опухолей, грыжъ и геморроя. Въ народѣ отваромъ листьевъ поятъ людей отъ сумасшествія, скотъ—отъ шалости. Въ Пермской губерніи отваръ даютъ также отъ лихорадки.

Серпуха красильная (*Serratula tinctoria* L.). Фармацевтиче-

ское назв.: *Serratula* (*Herba et Radix*). Бодячекъ (Вол.), Касатикъ (Вор.), Кауръ (Сл. II.), Котръ (Даль), Лапушокъ (Курск.), Пыльная трава, Серпий, Серпъ, Серпйя, Серпуха, Страхополохъ, Транкьоленья трава, Шаленецъ (Орл.), Яловень (Киев.). Многолѣтнее травянистое растение изъ семейства «сложноцвѣтныхъ» (*Compositae* Adans.), распространение въ средней Европѣ, въ средней полосѣ Россіи и въ юго-западныхъ губерніяхъ, выш. 7—22½ верш. Стебель наверху вѣтвистый; прикорневые листья черешковые, продолговато-яйцевидные, цѣльные или перисто-раздѣльные; стеблевые — сидячіе, при основаніи перисто-раздѣльные. Пурпуровые цвѣты въ корзинкахъ, собранныхъ щитковидной метелкой. Корзинки однополыя, двудомныя; мужскія — продолговатыя, женскія — потомъ яйцевидныя, довольно мелкія. Тычинокъ 5. Завязь нижняя, одногнѣздная, съ однимъ столбикомъ, въ мужскихъ цвѣткахъ нераздѣльнымъ, въ женскихъ — на верхушкѣ 2-хлостнымъ. Цвѣтеть во второй половинѣ лѣта. Растетъ на лугахъ, въ лѣсахъ и между кустарниками. Листья употреблялись въ красильномъ дѣлѣ для окраски шерстяныхъ матерій въ желтый цвѣтъ. (Табл. XLII, фиг. 243.)

МЕДИЦИННОЕ УПОТРЕБЛЕНІЕ. Въ народѣ серпуха красильная употребляется на ванны отъ укушенія бѣшеными животными.

Серпуха полевая, см. Чертополохъ полевой (*Cirsium arvense* Scop.).

Серпъ, см. Дрезна вѣничная (*Genista scoraria* Lam.).

Серпъ, см. Серпуха красильная (*Serratula tinctoria* L.).

Серпъ-трава, см. Чертополохъ полевой (*Cirsium arvense* Scop.).

Сеслерія (*Sossleria coerulea* Ard., sin. *Cynosorus coeruleus* L.).

Многолѣтняя трава изъ семейства «злаковыхъ» (*Gramineae* Juss.), распространенная въ средней Европѣ (на югѣ въ горахъ), въ юго-западныхъ губерніяхъ, въ Прибалтійскомъ краѣ и кое-гдѣ въ средней полосѣ Россіи. Образуетъ густой дернъ.

Стебли тонкіе, высокіе, только при основаніи облиственные; листья узколинейные, по краямъ остропильчато-шероховатые, съ сомкнутыми влагалищами и короткимъ язычкомъ. Колоски продолговатые, сжатые съ боковъ, 2-хцвѣтковые, съ неразвитой верхушкой, собранные густымъ овальнымъ колосообразнымъ бѣловатымъ и немного фиолетовымъ соцвѣтѣмъ, снабженнымъ при нижнихъ своихъ вѣточкахъ плещатыми верхушечными листочками. 2-хколосковые чешуи съ одной жилкой, заостренные, немного короче цвѣточныхъ чешуй; цвѣточная кроющая чешуя съ 3—5 зубцами, переходящими въ ости. Околоцвѣтникъ состоитъ изъ 2-хъ надрѣзанныхъ чешуй; столбики короткіе; рыльца длинныя, перисто-нитевидныя, выступающія изъ верхушки колоска. Плодъ — продолговато-эллиптическое зерно. Цвѣтеть весной. Растетъ на известково-каменистой почвѣ; отличная кормовая трава, особенно для овецъ.

Сестра солнцева, см. Цикорій обыкновенный (*Cichorium Intybus* L.).

Сестреница, см. Смородина красная (*Ribes rubrum* L.).
 Сибирскій чай, см. Чай чагырскій (*Saxifraga crassifolia* L.).
 Сиверушки } см. Купальница европейская (*Trollius euro-*
 Сиверушникъ } *paens* L.).
 Сивецъ, см. Вьюсь обыкновенный (*Nardus stricta* L.).
 Сивецъ, см. Сивецъ луговой (*Scabiosa succisa* L.).
 Сивецъ боровой, см. Дивала многолѣтная (*Scleranthus perennis* L.).
 Сивецъ луговой (*Scabiosa succisa* L., *syn. Succisa pratensis* Moench.). Фармацевтическое названіе: *Morsus diaboli s. Succisa* (Radix). Дьявольское угрызеніе, Дьявольское укушеніе, Дьявольское откушеніе, Чертовъ кусъ, Чертовъ обгрызокъ, Чертъ-грязь, Безыятая трава, Подрѣзная трава, Пригрязь, Болтовникъ (Тв., Ост., Пун.), Бронецъ (Ворон.), Великановъ цвѣтъ (Моск.), Грудная трава (Костр.), Далиха (Тамб.), Долиха (Сл. Ц.), Двѣ-родникъ (Вятск.), Ка(у)маничникъ (Могил., Набо и Чол.), Камуница (Гродн.), Колосница (Могил.), Конопель лѣсная (Гродн.), Короста, Лизунъ, Любка (Кіев.), Отмычная трава (Кам., Приарг. край) и ошибочно Отмычная трава, Отдышная трава, Одышная трава, Пискарикъ (Сиб.), Пуловная трава, Пульникъ, Пуловникъ (Перм. и Сиб.) и изм. Поны (Кал., Смол.), Плакучъ (Орл.), Ранникъ (Подол.), Самоправа (Ват.). Свербежная трава, Свербежница, Синець и изм. Синюкъ, Синякъ (Тв., Ост., Пун.), Сивецъ (Смол. и Кауфм., Моск., Фл.), Табакъ лѣсной, Чертова борода (Пет.), Чертовъ корень (Калев.), Языкъ (Волог., Новг., Пск., Смол., Моск.), Язычникъ (Тв., Ост., Пун.), Язычникъ лѣсной (Влад.), Языкъ коровій (Сиб.), Яловень боровой. Многолѣтнее травянистое растеніе изъ семейства «ворсянковыхъ» (*Dipsacaceae* DC.), распространенное почти во всей Европѣ, въ сѣверной и средней Россіи, на Кавказѣ и въ Сибири. Выш. 7—19 вершк. Корневище короткое и толстое, на нижнемъ концѣ устѣченное, какъ-бы обгрызанное. Листья эллиптическіе или ланцетовидные, б. ч. прикорневые. Жестковолосый стебель несетъ отъ 1 до 5 шаровидныхъ головокъ, сидящихъ на длинныхъ ножкахъ; каждая изъ головокъ снизу окружена многолистной оберткой; общее цвѣтоложе головки съ чешуйчатыми неколючими прицвѣтниками. Всѣ цвѣты въ головкѣ одинаковой величины; каждый цвѣтокъ снабженъ какъ-бы двумя чашечками, наружною и внутреннею. Наружная чашечка прикрѣплена подъ завязью и представляетъ обою оберточку, тогда какъ внутренняя (настоящая) чашечка сидитъ на завязи и снабжена 5 щетинками. Вѣнчикъ 4-хлопастный, голубой, рѣже розовый или бѣлый. Тычинокъ 4. Завязь нижняя одногнѣдная, съ однимъ столбикомъ. Плодъ—сѣмянка. Цвѣтетъ во второй половинѣ лѣта. Растетъ на сырыхъ лугахъ, на опушкѣ лѣсовъ и между кустарниками. Листья употребляются на краску въ зеленый цвѣтъ, сѣмена на желтую краску.

МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНІЕ. Корень прежде употреблялся врачами. Отваромъ его обмывали раны, внутрь его давали отъ

глистовъ и водяной болѣзни; теперь онъ врачами совсѣмъ оставленъ и употребляется только въ народѣ. Свѣжіе листья прикладываютъ на язвы (въ Тверской губ.). Въ Пермской губ. отваръ травъ пьютъ отъ напсады и боли въ животѣ, откуда и существуетъ названіе пуповникъ. Въ Московской, Тульской и Воронежской губерніяхъ отваръ травы пьютъ отъ укушенія бѣшеной собакой или ужаленія змѣей, въ Калужской губ. отваръ сухихъ листьевъ пьютъ отъ венерической болѣзни; лошадямъ этимъ отваромъ обмываютъ раны и также кладутъ на язвы свѣжіе листья.

Сиворонъ, см. Лютикъ ѣдкій (*Erigeron acer* L.).

Сивунъ, см. Бѣлоусъ обыкновенный (*Nardus stricta* L.).

Сивунъ, см. Тимофеевка (*Phleum pratense* L.).

Сикавка, см. Болиголовъ крапчатый (*Conium maculatum* L.).

Сиква, см. Горлецъ, раковыя шейки (*Polygonum bistorta* L.).

Сикирки, см. Васильки рогуатые (*Delphinium consolida* L.).

Сикморъ, см. Яворъ (*Acer pseudoplatanus* L.).

Сикма, см. Ерникъ обыкновенный (*Empetrum nigrum* L.).

Силичная, см. Медовникъ (*Galeopsis tetrahit* L.).

Сильворотъ, см. Лютикъ ѣдкій (*Ranunculus acer* L.).

Сильный цвѣтъ, см. Лютикъ ѣдкій (*Ranunculus acer* L.).

Синдра, см. Пустырникъ обыкновенный (*Leonurus cardiaca* L.).

Сивеворонъ } см. Лютикъ ѣдкій (*Ranunculus acer* L.).

Сивеворотъ } см. Лютикъ ѣдкій (*Ranunculus acer* L.).

Синеворотъ, см. Купальница европейская (*Trollius europaeus* L.).

Синеворотъ, см. Полтеска многолѣтняя (*Mercurialis perennis* L.).

Синеглазка, см. Борецъ желтый (*Aconitum lycostomum* L.).

Синеголовка, см. Черноголовка обыкновенная (*Prunella vulgaris* L.).

Синеголовникъ, см. Пахучка обыкновенная (*Calamintha Clinopodium* L.).

Синеголовникъ, см. Мордовникъ (*Echinops sphaerocephalus* L.).

Синеголовникъ, см. Синеголовникъ плосколистный (*Eryngium planum* L.).

Синеголовникъ, см. Черноголовникъ кровохлебковый (*Poterium Sanguisorba* L.).

Синеголовникъ плосколистный (*Eryngium planum* L.). Фармацевтическое назв.: *Eryngium*. Будячокъ (Полт.), Будякъ сѣній (Полт.), Заячій листъ (Уф.), Колючка (Дон., Вор. и др.), Колюшка, Колючка синія (Екат., Хар., Астр.), Колючки синіе (Малор.), Клоповникъ (Приарг. кр.), Любка (Хар.), Любки (Екат.), Марія (Уф.), Николайки (Малор.), Миколайчики, Миколайці, Миколайки (Малор.), Перелетникъ (Черн.), Перекати-поле, Переносъ-зелье (Кален.), Переполошникъ, Полулушникъ (Курск.), Пальчикъ (Вор.), Синеголовникъ, Синеголовъ (въ больш. ч. Россіи), Свинунка (Вор.), Чертогонъ (Сам., Уф., Сар., Влад.), Чертополохъ (Моск. и др.), Чертогугальникъ (Астр.), Березка луговая (Ниж.), Ябрей мелкій (Ниж.), Золототысячникъ (Сарат.), Хилинь (Ниж.). Многолѣтнее травянистое растеніе синеваго;

цвѣта, изъ семейства «зонтичныхъ» (*Umbelliferae* Juss.), распространенное въ среднихъ и южныхъ губерніяхъ Европейской Россіи, въ Сибири и Туркестанѣ. Стебель наверху вѣтвистый; прикорневые листья продолговато-овальные, городчато-пильчатые; стеблевые листья сидячіе, нижніе—цѣльные, верхніе—3—5-тираздѣльные, колюче-зубчатые. Соцвѣтіе—яйцевидная головка съ оберткой, состоящей изъ 6—7 линейныхъ прицвѣтничковъ. Чашечка изъ 5 колючихъ зубцовъ. Лепестковъ 5, голубыхъ, вверхъ стоячихъ, выемчатыхъ, съ длиннымъ внутрь загнутымъ кончикомъ. Тычинокъ 5; завязь нижняя 2-хлѣздная; столбиковъ 2, расширенныхъ при основаніи въ дискъ, покрывающій верхушку завязи. Плодъ—овальная сѣмянка, покрытая чешуйками. Цвѣтеть съ іюня до октября. Встрѣчается на песчаныхъ мѣстахъ, въ степяхъ, на опушкахъ лѣсовъ и между кустарниками.

МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНІЕ синеголовника плосколистного извѣстно только въ народѣ. Во Владимірской губ. отваръ растенія употребляется отъ кашля, водянки, испуга и безсонницы, въ Киевской губ. изъ него дѣлаютъ припарки отъ зубной боли, въ Уфимской губерніи пьютъ отъ грудной боли и въ Саратовской — отъ ломоты.

Синеголовникъ приморскій (*Eryngium maritimum* L.). Прямостоящее многолѣтнее травянистое голубовато-зеленое сильно вѣтвистое растеніе изъ семейства «зонтичныхъ» (*Umbelliferae* Juss.), выш. 3—12 вершк., распространенное во всей Европѣ, на берегахъ Чернаго, Азовскаго, Балтійскаго морей. Листья кожистые, по краямъ съ крупными колючими зубцами, нижніе—черешковые, сердцевидно-почковидные, верхніе—стеблеобъемлющие, почти пальчато-лопастные. Соцвѣтіе—почти шаровидная головка съ оберткой, состоящей изъ 5—8 большихъ яйцевидныхъ, колючихъ прицвѣтничковъ. Чашечка о 5 колючихъ зубцахъ. Вѣнчикъ 5-члѣстный; лепестки голубоватые вверхъ стоячіе, выемчатые, съ длиннымъ внутрь загнутымъ кончикомъ. Тычинокъ 5; завязь нижняя двуглѣздная, столбиковъ 2; плодъ—овальная сѣмянка, покрытая чешуйками. Растетъ по морскимъ берегамъ. Цвѣтеть лѣтомъ. (Рис. 271.)

Синеголовникъ равнинный (*Eryngium campestre* L.). Фармацевтическое назв.: *Eryngium*, vel. *Aster inguinalis*, vel *Capitulum Martii*, s. *Acus Veneris*. Будякъ бѣлый (Екат., Херс.), Бичъ Божій, Бытъ Божій, Бурьянъ, Адамова голова (Малор.), Колючка (Малор., Сред., Екат., Херс.), Мандрагора (Томск.), Марен (Перм.), Николаекъ-травя, Николай, Николайчики (Умань) и изм. Мыколайка, Мыколайчики (Малор.), Папникъ, Перекати-поле, Переполошная, Переполошникъ, Перепелочная трава, Покатунъ, Покатичникъ (Даль), Стоглавъ трава, Татарникъ (Сарат.), Чертополохъ (Сенз., Вор.). Сѣровато-зеленое многолѣтнее травянистое растеніе изъ семейства «зонтичныхъ» (*Umbelliferae* Juss.), распространенное въ средней и южной Европѣ, въ Привислянскомъ краѣ и южной Россіи. Стебель сильно вѣтвистый, выш. 3—12 вершковъ. Листья колюче-зубчатые, нижніе — черешковые, трехраздѣ-

ченныя, съ низбегающими глубоко перисто-раздѣльными долями, верхніе — стеблеобъемлюще, 3 — 5-тираздѣльные. Соцвѣтіе — почти шаровидная головка, съ оберткой изъ 3-хнадрѣзныхъ припѣтниковъ, немного превышающихъ головку. Чашечка о 5-ти ланцетныхъ, заостренныхъ въ колючку, зубцахъ. Лепестки бѣлые или зеленоватые. Тычинокъ 5; завязь нижняя 2-хгнѣздная. Столбикъ 2. Плодъ—овальная сѣмянка. Цвѣтетъ съ іюня до октября. Растетъ на песчаныхъ мѣстахъ, въ степяхъ и около дорогъ. (Рис. 272)

МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНІЕ. Растеніе употребляется только въ народѣ отъ отека ногъ и остановившихся мѣсячныхъ. Оно входитъ также въ составъ сбора отъ укушенія бѣшенными животными. Въ Малороссіи отваръ листьевъ пьютъ отъ трудныхъ родовъ, и окуриваютъ роженицъ. Корни и молодые побѣги растенія идутъ въ пищу, какъ и другія овоши.

Синеголовъ, см. Василекъ луговой (Centaurea Jacea L.).
Синеголовъ, см. Синеголовникъ плосколистный (Eryngium planum L.).

Синеголовъ, см. Соколій перелетъ (Gentiana cruciata L.).
Синей, см. Черноголовка обыкновенная (Prunella vulgaris L.).
Синель, см. Горошекъ мышиный (Vicia Cracca L.).
Синелька, см. Колокольчикъ раскидистый (Campanula patula L.).
Синеродъ, см. Полъска многолѣтняя (Mercurialis perennis L.).
Синеталь, см. Черноталь (Salix pentandra L.).
Синецвѣтъ, см. Котовикъ голый (Xereta nuda L.).
Синецвѣтка, см. Черноголовка обыкновенная (Prunella vulgaris L.).

Синецвѣтъ, см. Андреевъ крестъ (Veronica spicata L.).
Синецъ, см. Синецъ луговой (Scabiosa succisa L.).
Синецъ, см. Синякъ обыкновенный (Echium vulgare L.).
Синій цвѣтокъ, см. Цикорій обыкновенный (Cichorium Intybus L.).

Синій цвѣтъ, см. Астра дикая (Aster Amellus L.).
Синій цвѣтъ, см. Колокольчикъ крапиволистный (Campanula Trachelium L.).

Синій цвѣтъ, см. Синякъ обыкновенный (Echium vulgare L.).
Синій цвѣтъ, см. Шлемникъ обыкновенный (Scutellaria galericulata L.).

Синій цвѣтъ во ржи, см. Василекъ синій (Centaurea cyanus L.).

Синій цвѣтъ лазуревый, см. Герань луговая (Geranium pratense L.).

Синій цвѣтъ маленькій, см. Живучка мохнатая (Ajuga genevensis L.).

Синій цвѣтъ трава, см. Плакунъ-трава (Lythrum Salicaria L.).
Синіе пучки, см. Сирень обыкновенная (Syringa vulgaris L.).

Синика, см. Голубика (Vaccinium uliginosum L.).
Синило, см. Байца красильная (Isatis tinctoria L.).

Синило, см. Ослиникъ двулѣтній (Oenothera biennis L.).

- Синиль** } см. Вайда красильная (*Isatis tinctoria* L.).
Синильникъ }
Синиха, см. Синюха обыкновенная (*Polemonium coeruleum* L.).
Синнолой, см. Мелколенестникъ їдкій (*Erigeron aeris* L.).
Синовникъ, см. Василекъ сибирскій (*Centaurea sibirica* L.).
Синовникъ } см. Василекъ синій (*Centaurea cyanus* L.).
Синовница }
Синожатъ, см. Цминъ (*Helyschrisum arenarium* Dc.).
Синозицъ, см. Горечавка крупноцвѣтная (*Gentiana Pneumonanthe* L.).
Синоцвѣтка, см. Василекъ синій (*Centaurea cyanus* L.).
Синоцвѣтъ, см. Живучка мохнатая (*Ajuga genevensis* L.).
Синоцвѣтъ, см. Котовникъ голый (*Nepeta nuda* L.).
Синьки, см. Василекъ синій (*Centaurea cyanus* L.).
Синюга, см. Скерда кровельная (*Crepis tectorum* L.).
Синюкъ, см. Сивецъ луговой (*Scabiosa succisa* L.).
Синюка } см. Василекъ синій (*Centaurea Cyanus* L.).
Синюха }
Синюха, см. Брюква (*Brassica Napus* L.).
Синюха, см. Сивякъ обыкновенный (*Echium vulgare* L.).
Синюха, см. Синюха обыкновенная (*Polemonium coeruleum* L.).
Синюха, см. Горошекъ заборный (*Viola sepium* L.).
Синюха обыкновенная (*Polemonium coeruleum* L.). Фармацевтическое назв.: *Valeriana graeca*. Аструмка (Минск.), Балдырьянъ грецкій, Булдырьянъ грецкій, Близнцова трава (Моск.), Бранъ-трава (переводъ греческаго названія, означающаго: война, брань), Бранъ синяя (Собол., Дв.), Бронъ (Даль), Бранъ (Сл. Церк.), Вакъ (Галлчъ), Букишъ (Сл. Церк.), Василекъ (Нижег.), Воробьиная трава (Курск.), Вередная трава (Нижег.), Гадинникъ (Гродн.), Друсль (Пет.), Звѣробой синій (Яросл.), Іоакимъ и Анна (Ниж.), Егорьевское копье (Арх.), Красотка (Черн.), Кумашница (Костр.), Ладанъ верховой (Сиб.), Маточникъ, Мартилова трава (Вят.), Николаевская трава (Вор.), Никольская трава (Олон.), Подьясинникъ (Вор.), Рябинка (Смол.), Рябина дикая (Нижег., Вят.), Рябинка лѣсная (Влад.), Рябина святая (Тобол.), Синюшникъ (Гвер., Ост.), Синюха (Моск.), Синиха, Сорокопри- точная (Тв., Моск.), Сорокопритка, Сорокопритокъ (Костр.), Со- рокоцвѣточная (Влад.), Столестникъ (Кал.), Столественница (Тамб.), Троецвѣтка (Алт.), Урочная трава (Каз.), Хмира (Орл.). Многочлѣнное травянистое растение лѣз семейства «синюховыхъ» (*Polemoniaceae* Vent.), распространенное въ сѣверной и средней Европѣ, во всей Европейской Россіи и въ Сибири. Стебель пря- мой, выш. 7—14 вершковъ; листья очередные, перистые, съ яйце- видно-ланцетными, заостренными листочками, числомъ отъ 11—21. Нижніе листья собраны пучкомъ. Большіе синіе, рѣже бѣлыя, цвѣты собраны наверху стебля продолговатою метел- кой. Цвѣты правильные; чашечка 5-тираздѣльная, съ яйцевид- ными долями; вѣнчикъ сростно-лепестный, колокольчато-коле- совидный, 5-тиадрѣзный; тычинокъ 5, чередующихся съ до-

лями вѣнчика и прикрѣпленныхъ расширенными при основаніи ниями къ трубчатымъ вѣнчика; завязь верхняя, окруженная при основаніи зубчатымъ дискомъ, 3-хгнѣзная, съ нитевиднымъ столбикомъ, оканчивающимся 3-хлопастнымъ рыльцемъ. Плоды—3-хгнѣзная многосѣмянная яйцѣвидная коробочка, растрескивающаяся гнѣздоразрывно 3-мя створками. Цвѣтегъ въ іюнѣ и въ іулѣ; произрастаетъ по береговымъ зарослямъ и по лѣснымъ опушкамъ.

МЕДИЦИНСКАЯ УПОТРЕБЛЕНІЕ. Прѣжде синюха обыкновенная употреблялась вмѣсто валерианы, теперь оставлена; въ народѣ пареную траву пьютъ отъ испуга и безсонницы (въ Воронежской губ.), въ Владимірской послѣ родовъ, въ Витекой губ. настой травы дается дѣтямъ отъ родимка.

Синюшка, см. Василекъ синій (*Centaurea cyanus* L.)

Синюшка, см. Букашникъ горный (*Jasione montana* L.).

Синюшка } см. Истодъ обыкновенный (*Polygala vulgaris* L.).

Синюшки } см. Истодъ обыкновенный (*Polygala vulgaris* L.).

Синюшки, см. Василекъ синій (*Centaurea cyanus* L.).

Синюшникъ, см. Синюха обыкновенная (*Polemonium coeruleum* L.).

Синюшникъ, см. Василекъ синій (*Centaurea cyanus* L.).

Синявка, см. Букашникъ горный (*Jasione montana* L.).

Синявка, см. Короставникъ полевой (*Scabiosa arvensis* L.).

Синякъ, см. Живучка мохнатая (*Ajuga genevensis* L.).

Синякъ, см. Синякъ обыкновенный (*Echium vulgare* L.).

Синякъ, см. Синець луговой (*Scabiosa succisa* L.).

Синякъ обыкновенный (*Echium vulgare* L.). Фармацевтическое названіе: *Echium s. Buglossum agreste, s. Viperinum*. Бурачки заячки (Кіев.), Василки полевые (Екат., Полт.), Громовикъ (Малор.), Ежовая трава, Жесткое зелье (Бесс.), Колочка (Полт., Рог. и у Дая ошибочно—Комочка), Куриная слѣпота, Кѣлекъ (Гродн.), Любовь дѣвичья (Пет.), Марковой (Черн.), Материнка (Подол.), Меденишникъ (Полт.), Медунка (Вил.), Межевникъ (Волын.), Печеница (Вит.), Румянка (Новг.), Румянникъ (Кал.), Ранникъ (Полт.), Ранникъ синій (Тавр.), Синюха (Валт.), Синякъ (въ бол. ч. Росс.), Синець (Полт.), Синій цвѣтъ (Гродн., Екат.), Шарило (Малор.), Шарило синяя, Языкъ водовій (Ниж., Рук., Рупр.). Двухлѣтнее травянистое растение изъ семейства «бурачниковыхъ» (*Boraginaceae* Juss.), распространенное во всей Европѣ, исключая крайняго сѣвера, почти во всей Европейской Россіи, на Кавказѣ и на Уралѣ. Стебель выш. 7—22½, вершк., травянистый, покрытый жесткими щетинистыми волосками. Листья ланцетные, очередные, цѣльные. Цвѣты въ густыхъ завѣткахъ, собранныхъ метельчато; чашечка глубоко-5-тираздѣльная; вѣнчикъ ворончатый, спайно-лепестный, съ 5-тираздѣльнымъ отгибомъ, немного неправильный, сперва красноватый, потомъ голубой; трубочка вѣнчика почти одной длины съ чашечкой. Тычинокъ 5, вмѣстѣ съ столбикомъ выдающихся изъ вѣнчика. Завязь верхняя, 4-хгнѣзная, 4-хлопастная; стол-

бикъ одинъ съ 2-раздѣльнымъ рыльцемъ. Плодъ—сухой, распадающійся на 4 яйцевидно-трехгранныхъ, бугорчатыхъ орѣшка. Цвѣтетъ съ іюня до сентября. Произрастаетъ на необработанныхъ и сорныхъ мѣстахъ. Часто разводится, какъ медоносное растеніе. Прежде употреблялось въ медицинѣ отъ падучей болѣзни и укушенія змѣй, а теперь совсѣмъ оставлено. (Табл. XII, фиг. 228.)

Синячникъ, см. Вайда красильная (*Isatis tinctoria* L.).

Синяя трава, см. Вероника ненастоящая (*Veronica spuria* L.).

Сипѣлка, см. Шпажникъ черепичатый (*Gladiolus imbricatus* L.).

Сирбаринникъ, см. Шиповникъ (*Rosa canina* L.).

Сирень } см. Сирень обыкновенная (*Syringa vulgaris* L.).
Сиренье }

Сирень обыкновенная (*Syringa vulgaris* L.). Бузокъ (Малор.), Бузь (Бѣлор.), Кипарисникъ (Влад.), Синіе пучки (Ниж.), Рай-дерево (Курск., Даль), Сиренье (въ древн. рук.), Сирень (повсюду), Трандахилъ (Подол.). Общеизвѣстный декоративный кустарникъ, выш. 1 саж. и болѣе, изъ семейства «масличныхъ» (*Oleaceae* Lindl.), родомъ изъ Придунайскихъ странъ, съ супротивными, черешковыми, сердцевидно-яйцевидными, заостренными, цѣльнокрайними листьями. Лилые или бѣлые душистые цвѣты въ густыхъ пирамидальныхъ метелкахъ. Чашечка маленькая, 4-зубчатая; вѣнчикъ ворончатый, съ длинною трубкой и 4-храздѣльнымъ отгибомъ. Тычинокъ 2, заключенныхъ въ трубочку вѣнчика. Завязь верхняя 2-хгнѣздная; столбикъ простой, съ головчатымъ рыльцемъ. Плодъ—коробочка, раскрывающаяся 2-мя створками. Цвѣтетъ весной. Разводится въ многочисленныхъ сортахъ въ садахъ и паркахъ. (Табл. XLII, фиг. 237.)

МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНІЕ сирени извѣстно только въ домашнемъ быту. Цвѣты сирени сушатъ и чай изъ сушеныхъ цвѣтовъ пьютъ отъ каменной болѣзни. Въ Тамбовской губерніи чай изъ сирени смѣшиваютъ съ липовымъ чаемъ и пьютъ отъ лихорадки. Отъ падучей болѣзни также предлагается сиреневый чай.

Сиротки, см. Брандушка (*Bulbocodium ruthenicum* Bunge).

Сиротки, см. Пролѣска двулистная (*Scilla bifolia* L.).

Сирпишникъ, см. Медовникъ (*Galeopsis Tetrabit* L.).

Сиртунъ, см. Хвощъ зимній (*Equisetum hyemale* L.).

Сисошникъ, см. Жимолость обыкновенная (*Lonicera Xylosteum* L.).

Сита } см. Камышъ озерной (*Scirpus lacustris* L.).
Ситникъ }

Ситникъ, см. Ожика полевая (*Luzula campestris* Cand.).

Ситникъ, см. Ситникъ развѣсистый (*Juncus effusus* L.).

Ситникъ блестящій (*Juncus lamprocarpus* Ehrh.). Многолѣтнее травянистое растеніе изъ семейства «ситниковыхъ» (*Juncaceae* Bartl.), распространенное во всей Европѣ и весьма обыкновенное въ Россіи. Корневище ползучее; стебель слегка сплю-

снутый, вып. 7—22½ верш. Стеблевые и прикорневые листья цилиндрические, немного сжатые съ боковъ, полые, внутри раздѣленные поперечными перегородками на гнѣзда. Цвѣты собраны по 3—10 пучками, расположенными рыхлою, раскидистою метелкой. Околоцвѣтникъ буроватый, 6-тилистный; наружные его листочки острые, внутренніе—тупые. Тычинокъ 3; завязь—3-хгнѣздная, съ 1 столбикомъ, несущимъ 3 рыльца. Плодь—яйцевидно-ланцетная коробочка, заостренная, блестящая, темно-бурая. Цвѣтеть лѣтомъ. Растетъ на влажныхъ болотистыхъ мѣстахъ. (Рис. 273.)

Ситникъ жабный (*Juncus bufonius* L.). Клоповникъ (Ряз.). Однолѣтнее травянистое растеніе изъ семейства «ситниковыхъ» (*Juncaceae* Bartl.), распространенное во всей Европѣ и почти во всей Россіи. Стебель вып. всего 11½ вершк., очень вѣтвистый, съ шиловидными, при основаніи желобчатыми листьями. Вѣтви соцвѣтія развѣсисто-вѣтвистыя, съ отдаленными другъ отъ друга мелкими зеленоватыми цвѣточками. Околоцвѣтникъ 6-тилистный; листочки его ланцетовидные зеленые, заостренные, болѣе длинныя, чѣмъ коробочка. Тычинокъ 6; завязь верхняя 3-хгнѣздная, съ однимъ столбикомъ, несущимъ 3 рыльца. Плодь—продолговатая коробочка. Цвѣтеть лѣтомъ. Растетъ на сырыхъ лугахъ, по берегамъ рѣкъ и около дорогъ. (Рис. 274.)

Медицинское употребленіе известно только въ народѣ. Въ Тамбовской губерніи чай изъ этого растенія принимаютъ отъ болей въ животѣ и отъ задержки мочи.

Ситникъ приморскій (*Juncus maritimus* L.). Многолѣтнее травянистое растеніе изъ семейства «ситниковыхъ» (*Juncaceae* Bartl.), распространенное въ средней и южной Европѣ, въ Херсонской губерніи, въ Крыму и въ Закавказьѣ. Корневище ползучее. Стебель жесткій, вып. 14—22½ вершк.; при основаніи его находятся 2—3 жесткихъ шиловидныхъ листа, снабженныхъ влагалищами. Цвѣты въ мелкихъ головчатыхъ пучкахъ, собранныхъ рыхлою метелкою. Листъ, сидящій при соцвѣтіи, продолженъ въ колючее остріе; околоцвѣтникъ 6-тилистный, блѣдный; наружные его листочки блѣдные, острые, внутренніе—туповатые. Тычинокъ 6; завязь верхняя 3-хгнѣздная, съ однимъ столбикомъ, несущимъ 3 рыльца. Плодь—эллиптическая коробочка, не превышающая околоцвѣтника. Цвѣтеть въ іюлѣ и августѣ. Растетъ на песчаныхъ и морскихъ берегахъ. (Рис. 275.)

Ситникъ развѣсистый (*Juncus effusus* L.). Рогозь (Слав.), Ситникъ. Многолѣтнее травянистое растеніе изъ семейства «ситниковыхъ» (*Juncaceae* Bartl.), распространенное во всей Европѣ и обыкновенное почти во всей Россіи. Отъ ползучаго корневища отходятъ многочисленные цилиндрические стебли, вып. 7—14 вершк., съ рыхлою сплосною сердцевиной. Внизу стебель окруженъ буроватыми листовыми влагалищами, а на верхушкѣ несетъ развѣсистое метельчатое соцвѣтіе, при основаніи котораго сидитъ единственный зеленый листъ, составляющій какъ-бы продолженіе зеленого стебля и смѣщающій со-

цвѣтѣ въ сторону, вслѣдствіе чего оно кажется боковымъ. Цвѣты мелкіе, буровато-зеленые. Околочцвѣтникъ 6-тилистный. Тычинокъ 3. Завязь верхняя 3-хгнѣздная, съ однимъ столбикомъ, несущимъ 3 рыльца. Плодъ—обратно-яйцевидная, сверху вдавленная коробочка съ маленькимъ бугоркомъ (основаніе столбика) Цвѣтетъ лѣтомъ. Растетъ на влажныхъ мѣстахъ.

Ситникъ сизый (*Juncus glaucus* Ehrh.). Многолѣтнее травянистое растение изъ семейства «ситниковыхъ» (*Juncaceae* Bartl.), распространенное въ средней и южной Европѣ, въ средней и южной Россіи, въ Туркестанѣ и Алтаѣ обыкновенное. Стебель глубоко-бороздчатый, сизый, выш. 14—22½ вершковъ; сердцевина его раздѣлена поперечными перегородками на гнѣзда. Метелка рыхлая, маловѣтвистая. Цвѣты зеленовато-бурые, крупнѣе, чѣмъ у ситника развѣсистаго. Тычинокъ 6; завязь верхняя 3-хгнѣздная, съ замѣтно длиннымъ столбикомъ, несущимъ 3 рыльца. Плодъ—эллиптическая бурая, блестящая, сверху не вдавленная коробочка, съ острымъ кончикомъ. Цвѣтетъ лѣтомъ. Растетъ на влажныхъ мѣстахъ. (Рис. 276.)

Ситнокъ, см. Камышъ озерной (*Scirpus lacustris* L.).

Ситный цвѣтъ } см. Сусакъ зонтичный (*Butomus umbellatus* L.).

Ситовецъ } *tus* L.).

Ситовецъ, см. Костенецъ зонтичный (*Holosteum umbellatum* L.).

Сито волчье, см. Колючникъ безстебельный (*Carlina subacaulis* Dc.).

Ситовица, см. Випьвица болотная (*Pedicularis palustris* L.).

Ситоглякъ съѣдобный, см. Циперусъ съѣдобный (*Cyperus esculentus* L.).

Ситовье бѣлое, см. Сусакъ зонтичный (*Butomus umbellatus* L.).

Сидачъ, см. Посконникъ конопляный (*Eupatorium cannabinum* L.).

Сидачъ, см. Девясилъ шершавый (*Inula hirta* L.).

Сіре-зилле, см. Клеверъ бѣлый ползучій (*Trifolium repens* L.).

Сіряки, см. Пастушья сумка (*Capsella Bursa pastoris* Moench.).

Сіялуха, см. Вероника лекарственная (*Veronica officinalis* L.).

Скабоза } см. Короставникъ полевой (*Scabiosa arvensis* L.).

Скабіоза дикая }

Скабіоза голубиная (*Scabiosa columbaria* L.). Фармацевтическое названіе: *Scabiosa minor*. Скабіоза желтая. Многолѣтнее или двулѣтнее травянистое растение изъ семейства «ворсянковыхъ» (*Dipsaceae* Dc.), распространенное въ средней и южной Европѣ, въ Привислянскомъ краѣ и юго-западныхъ губерніяхъ. Стебель голый, выш. 7—15 вершк. Листья супротивные. Нижніе листья продолговатые, тупые, цѣльные или лировидные, верхніе—перисто-раздѣльные, съ узкими долями. Головки цвѣтовъ шаровидныя, въ числѣ отъ 1—5, сидящія, на длинныхъ ножкахъ. Краевые цвѣты болѣе крупныя. Общее цвѣтоложе головки усажено чешуйчатыми неколючими прицвѣтниками. Каждый цвѣтокъ снабженъ какъ-бы двумя чашечками—наружною и внутренней. Наружная чашечка прикреплена подъ завязью и образуетъ оберточку, тогда какъ вну-

твенная (настоящая) чашечка сидитъ на завязи. Вѣнчикъ 5-тилопастный, голубой или лиловый, рѣдко бѣлый. Тычинокъ 4. Завязь нижняя одногнѣздная, съ однимъ столбикомъ. Плодь—сѣмянка. Цвѣтъ во второй половинѣ лѣта; растетъ на лугахъ и между кустарниками.

Скабіоза желтая, см. Скабіоза голубиная (*Scabiosa columbata* L.).

Скабіоза лѣсная, см. Букашникъ горный (*Jasione montana* L.).

Сказанякъ, см. Орлякъ обыкновенный (*Pteris aquilina* L.).

Сказитникъ, см. Колокольчикъ сборный (*Campanula glomerata* L.).

Скакунъ, см. Ленъ полевной (*Linum usitatissimum* L.).

Скала

Скалка-трава } см. Острица лежащая (*Asperugo procumbens* L.).

Скалозубъ, см. Ласточникъ лекарственный (*Vincetoxicum officinale* Moench.).

Снарбариха, см. Куманика (*Rubus caesius* L.).

Скачекъ великій, см. Клецевина обыкновенная (*Ricinus communis* L.).

Скелдра

Скелдра } см. Скерда кровельная (*Crepis tectorum* L.).

Скерда вонючая (*Crepis foetida* L.). Однолѣтнее травянистое растение изъ семейства «сложноцвѣтныхъ» (*Compositae* Adans.), распространенное въ средней и южной Европѣ. Стебель выпш. 4—7 вершк., вѣтвистый, покрытый мягкими волосками. Листья пушистые, нижне—выемчато-надрѣзные или раздѣльные. Корзинки цвѣтовъ немногочисленныя, на длинныхъ ножкахъ, до цвѣтенія повислыя. Листья обертки сѣровато-пушистые, усаженные простыми и железистыми волосками. Вѣнчикъ желтый, у краевыхъ цвѣтовъ снизу красный. Всѣ цвѣты язычковые. Тычинокъ 5. Завязь нижняя, одногнѣздная, односѣмянная, съ однимъ столбикомъ и раздвоеннымъ рыльцемъ. Плодь—сѣмянки, изъ которыхъ срединныя—съ длиннымъ носикомъ, крайнія же—безъ носика. Цвѣтъ лѣтомъ. Въ Россіи распространена разновидность скерды вонючей, отличающаяся стеблемъ и листьями, покрытыми жесткими волосками и отсутствіемъ железистыхъ волосковъ на листьяхъ обертки; эта разновидность (*Crepis foetida* L., var. *rhoeadifolia* M. B.) произрастаетъ въ юго-западныхъ губерніяхъ, въ Крыму и на Кавказѣ, на песчаныхъ мѣстахъ, въ степяхъ и на холмахъ. (Рис. 277.)

Скерда двулѣтняя (*Crepis biennis* L.). Скрипуха (Сит.), Свицукъ (Гор.). Двулѣтнее травянистое растение изъ семейства «сложноцвѣтныхъ» (*Compositae* Adans.), распространенное почти во всей Европѣ и въ большей части Европейской Россіи. Стебель вѣтвистый, выпш. 14—130 вершк. Листья болѣе или менѣе шершаво-волосисты; струговидные, перисто-раздѣльные или крупно-зубчатые: стеблевые—сидячіе, плоскіе, зубчатые, при основаніи съ ушками. Крупныя желтыя корзинки цвѣтовъ собраны щитковидной метелкой; наружныя листья обертки—от-

стояще. Всѣ цвѣты язычковые. Тычинокъ 5. Завязь нижняя одногнѣздная, односѣмянная, съ однимъ столбикомъ и 2-х-раздѣльнымъ рыльцемъ. Плодъ—сѣмянки, на верхушкѣ суженныя. Цвѣтетъ лѣтомъ. Встрѣчается на лугахъ и между кустарниками. (Рис. 278.)

Скерда зеленая (*Sceris virens* Vill.). Однолѣтнее и двулѣтнее травянистое растение изъ семейства «сложноцвѣтныхъ» (*Compositae* Adans.), распространенное въ средней и южной Европѣ, въ привислянскихъ губерніяхъ и на югѣ Россіи. Стебель вѣтвистый, почти голый, выш. $3\frac{1}{2}$ —7 вершк. Листья линейно-ланцетные, выемчато-зубчатые или перисто-раздѣльные, по краямъ плоскіе; прикорневые — черешковые, верхніе—сидячіе, стебле-объемлющіе, при основаніи стрѣловидные. Мелкія желтыя корзинки собраны рыхлою метелкой; наружныя листья обертки прижаты къ внутреннимъ. Всѣ цвѣты язычковые. Тычинокъ 5; завязь нижняя одногнѣздная, съ однимъ столбикомъ и 2-х-раздѣльнымъ рыльцемъ. Плодъ—сѣмянки съ хохолкомъ изъ мягкихъ бѣлыхъ волосковъ. Цвѣтетъ лѣтомъ. Растетъ на лугахъ и поляхъ. (Рис. 279.)

Скерда кровельная (*Sceris tectorum* L.). Бузульникъ (Собол.), Бѣлоголовецъ (Костр.), Бѣлопушица (Ист., Хар.), Желтушка (Олон.), Желтый цвѣтъ (Екат.), Кузь-баба (Малор.), Молочай (Могил.), Молочай дикой (Полт.), Пушникъ (Вят.), Рашпоръ (Екат.), Скерда (Могил.), Скедра (Волог.), Скрипуха кровельная (Собол.), Синюга (Олон.), Хмелюкъ дикій (Тамб.), Кошачья трава (Курск.). Однолѣтнее травянистое растение изъ семейства «сложноцвѣтныхъ» (*Compositae* Adans.), распространенное во всей Европѣ и почти во всей Россіи; походитъ очень на скерду зеленую (оп. см. выше), отъ которой отличается тѣмъ, что стебель и листья покрыты у нея пушкомъ, края верхнихъ листьевъ заворочены, наружныя листья обертки отстающіе. Цвѣтетъ лѣтомъ. Растетъ на поляхъ, около дорогъ и на сорныхъ мѣстахъ.

МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНІЕ. Оба растенія: скерда двулѣтняя и скерда кровельная употребляются въ народѣ. Свѣже-выжатый сокъ растенія смѣшиваютъ съ уксусомъ и медомъ и принимаютъ его, какъ слабительное. Толченую траву прикладываютъ на опухоли, какъ припарку.

Скипетръ царскій, см. Кнафликъ (*Verbascum Blattaria* L.).

Скипетръ царскій, см. Коровякъ бѣлоцвѣтный (*Verbascum Lychitis* L.).

Скипетръ царскій, см. Медвѣжье ухо (*Verbascum Thapsus* L.).

Скип тръ царскій черный, см. Коровякъ черный (*Verbascum nigrum* L.).

Скипидарная трава, см. Копытень европейскій (*Asarum europaeum* L.).

Скипидарникъ, см. Бѣлоусъ обыкновенный (*Nardus stricta* L.).

Скипидарникъ, см. Копытень европейскій (*Asarum europaeum* L.).

Скипидарное дерево (*Pistacia Terebinthus* L.). Терпентинное дерево. Дерево, произрастающее въ сѣверной Африкѣ и южной Европѣ. Изъ разрѣзовъ ствола и изъ плодовъ вытекаетъ терпентинъ, лучший сортъ котораго получается отъ особаго сорта, культивируемаго на островѣ Хіосѣ и ближайшихъ къ нему островахъ; получаемый здѣсь терпентинъ извѣстенъ въ торговлѣ подъ названіемъ кипрскаго или хіосскаго. На вѣтвяхъ и листьяхъ дерева отъ укула насѣкомаго «*Aphis Pistaciae*» образуются чернильные орѣшкіи «*Gallae pistaciae v. Terebinthi*».

МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНІЕ. Смола, вытекающая изъ дерева, служитъ для приготовления лучшаго скипидарнаго масла.

Чернильные орѣшкіи съ этого растенія въ настоящее время почти не употребляются въ медицину. На востокъ они служатъ для окрашиванія различныхъ тканей въ красный цвѣтъ; въ Венгріи ими окрашиваютъ вино.

Склизь, см. Укропъ конскій (*Oenanthe Phellandrium* L.).

Сковородка, см. Травянка (*Dianthus deltoides* L.).

Скокъ заячій, см. Солнцеглядъ (*Euphorbia Helioscopia* L.).

Скомпія (*Rhus Cotinus* L.). Дерево дивное (Кондр.), Желтница, Желтинникъ, Желтникъ красильный, Желтое деревцо, Кожевненное деревцо (Кален., Карел.), Дерево красильничье, Скумпія (Бесс.), Сумахъ, Шевское деревцо, Балга. Ядовитый вѣтвистый кустарникъ изъ семейства «сумаховыхъ» (*Anacardiaceae* Lindl.), распространенный на югѣ Европы, въ южныхъ губерніяхъ Россіи, въ Крыму, на Кавказѣ и въ Малой Азій. Листья спиральныя, овальныя, цѣльныя, сверху голыя, снизу обыкновенно пушистыя, голубоватыя. Зеленоватыя цвѣтки обоюполые, въ раскидистой метелкѣ. Долей чашечки, лепестковъ и тычинокъ по 5. Цвѣтоножки тычиночныхъ цвѣтовъ послѣ цвѣтенія удлиненыя и усаженыя длинными оттопыренными волосками. Завязь одногнѣздная, съ 3-мя столбиками. Плодъ костянкoвый, обратно-яйцевидный, голый, потомъ черноватый, съ треугольной косточкой. Цвѣтетъ въ началѣ лѣта. Растетъ между кустарниками. Часто встрѣчается въ паркахъ и садахъ. Древесина употребляется на желтую краску для кож, идущей на ремни, обувь, и т. п.; кора и листья — для дубленія.

МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНІЕ. Кора растенія въ прежнее время употреблялась, какъ суррогатъ хинной корки: отварами изъ листьевъ полоскали ротъ и горло отъ хроническаго катарра слизистой оболочки. Теперь растеніе это совсѣмъ оставлено.

Скорби животныхъ, см. Вехъ ядовитый (*Cicuta virosa* L.).

Скордія } см. Дубровникъ чесночный (*Teucrium Scordium* L.).

Скорода, см. Осока мохнатая (*Carex hirta* L.).

Скорода, см. Рѣзанецъ (*Allium Schoenoprasum* L.).

Скороспѣлка, см. Первоцвѣтъ лекарственный (*Primula officinalis* Jacq.).

Скороспѣлки-цвѣты, см. Маргаритка многолѣтняя (*Bellis perennis* L.).

- Скотскій кормъ, см. Иванъ да Марья (*Melampyrum nemorosum* L.).
- Скочки, см. Кошачьи лапки (*Antennaria dioica* Gärtn.).
- Скочки, см. Молодиль кровельный (*Sempervivus tectorum* L.).
- Скрипелъ, см. Иванъ-чай (*Epilobium angustifolium* L.).
- Скрипель, см. Чистецъ болотный (*Stachys palustris* L.).
- Скрипенъ } см. Иванъ-чай (*Epilobium angustifolium* L.).
- Скрипенъ }
- Скрипица }
- Скрипнякъ, см. Плакунъ-трава (*Lythrum Salicaria* L.).
- Скриптъ } см. Иванъ-чай (*Epilobium angustifolium* L.).
- Скрипунъ }
- Скрипунъ, см. Плакунъ-трава (*Lythrum Salicaria* L.).
- Скрипунъ, см. Заячья капуста (*Sedum Telephium* L.).
- Скрипуха, см. Скерда двулѣтная (*Crepis biennis* L.).
- Скрипуха кровельная, см. Скерда кровельная (*Crepis tectorum* L.).
- Скрипушка, см. Хлопушка (*Silene inflata* Smith.).
- Скрупунецъ, см. Тайникъ овальный (*Listera ovala* R. Br.).
- Скрыпей, см. Иванъ-чай (*Epilobium angustifolium* L.).
- Скрыпѣй, см. Медунца (*Spiraea ulmaria* L.).
- Скрыпій водяной, см. Плакунъ-трава (*Lythrum Salicaria* L.).
- Скрыпій лѣсной, см. Иванъ-чай (*Epilobium angustifolium* L.).
- Скрыпунъ, см. Очитокъ бобовый (*Sedum Fabaria* Koch.).
- Скудолистникъ, см. Крупка весенняя (*Draba verna* L.).
- Скулатникъ, см. Норичникъ узловатый (*Scrophularia nodosa* L.).
- Скулочникъ, см. Просвирникъ курчавый (*Malva crispa* L.).
- Скупія, см. Скомія (*Rhus Cotinus* L.).
- Скупія, см. Купена лекарственная (*Convallaria Polygonatum* L.).
- Скучень } см. Колокольчикъ сборный (*Campanula glome-*
- Скучникъ } *gata* L.).
- Слзбина, см. Подмаренникъ мареновидный (*Galium rubroides* L.).
- Славикъ, см. Многоножка обыкновенная (*Polypodium vulgare* L.).
- Сладкая трава, см. Борщевикъ сибирскій (*Heracleum sibiricum* L.).
- Сладкій духъ, см. Эспарсеть кормовой (*Onobrychis sativa* Lam.).
- Сладкій корень, см. Солодковый корень (*Glycyrrhiza echinata* L.).
- Сладкій корень, см. Многоножка обыкновенная (*Polypodium vulgare* L.).
- Сладкій корень (*Scorzonera hispanica* L.). Змѣдупникъ, Козелецъ, Сахарные корни, Овсяные корни, Куфельки (Влад. Симб.), Мохнатка (Даль.), Ужовки (Влад. Симб.). Двулѣтное травянистое растение изъ семейства «сложноцвѣтныхъ» (*Compositae* Adans.), распространенное въ средней и южной Европѣ, встречающееся въ средней и южной Россіи и въ Туркестанѣ.

Стебель выш. 14—28 вершк., наверху вѣтвистый; каждая вѣтвь несетъ по одной желтой корзинкѣ цвѣтовъ. Листья линейно-ланцетные, заостренные, голые или слегка паутинисто-шерстистые, цѣлюкрайніе или слегка зубчатые. Обертка корзинки многolistная черепчатая. Всѣ цвѣты язычковые. Тычинокъ 5; завязь нижняя, одногнѣздная, одноствянная, съ однимъ столбикомъ и 2-храздѣльнымъ рыльцемъ. Плодь—ствянка съ перистымъ хохолкомъ. Цвѣтеть лѣтомъ. Растетъ на лугахъ и въ степяхъ. Форма съ крупными листьями разводится на огородахъ ради съдобныхъ корней.

Сладкогорькая трава, см. Пасленъ сладкогорькій (*Solanum dulcamara* L.).

Сладкогорькъ, см. Пасленъ сладкогорькій (*Solanum dulcamara* L.).

Сладкое зелье, см. Девясилъ шершавый (*Inula hirta* L.).

Сладколистная стручковая трава, см. Астрагалъ солодколистный (*Astragalus glycyphyllos* L.).

Сланецъ, см. Береза-сланецъ (*Betula nana* L.).

Сланецъ, см. Ленъ посѣвной (*Linum usitatissimum* L.).

Сланецъ березовый, см. Береза-сланецъ (*Betula nana* L.).

Сластиха, см. Пасленъ сладкогорькій (*Solanum dulcamara* L.).

Слата, см. Макъ снотворный (*Papaver somniferum* L.).

Слаща, см. Брюква (*Brassica Napus* L.).

Слезъ, см. Просвирникъ лѣсной (*Malva silvestris* L.).

Слези зозулины, см. Тайникъ овальный (*Listera ovata* R. Br.).

Слезки, см. Трясунка средняя (*Briza media* L.).

Слезки, см. Травянка (*Dianthus deltoides* L.).

Слезки, см. Грушанка круглолистная (*Pirola rotundifolia* L.).

Слезки Божьи, см. Травянка (*Dianthus deltoides* L.).

Слезки зозулины, см. Кокушникъ (*Gymnadenia conopsea* Rich.).

Слезки зозулины, см. Тайникъ овальный (*Listera ovata* L.).

Слезки зозулины, см. Ятрышникъ шлемовидный (*Orchis militaris* L.).

Слезки кукушкины, см. Ятрышникъ широколистный (*Orchis latifolia* L.).

Слезки кукушкины, см. Кукушкины слезки (*Orchis masculata* L.).

Слезки кукушкины, см. Ятрышникъ шлемовидный (*Orchis militaris* L.).

Слезки кукушкины, см. Ятрышникъ мужской (*Orchis mascula* L.).

Слезки кукушкины, см. Трясунка средняя (*Briza media* L.).

Слезки кукушкины, см. Дрема кукушкинъ цвѣтъ (*Lychnis flos cuculi* L.).

Слезки кукушкины, см. Фиалка ночная (*Platanthera bifolia* Rich.).

Слезки кукушки, см. Клеверъ средний (*Trifolium medium* L.).

Слезки полевые, см. Травянка (*Dianthus deltoides* L.).

- Слезки пречистыя**, см. Купена лекарственная (*Convallaria Polygonatum* L.).
- Слезы вороны**, см. Очанка лекарственная (*Euphrasia officinalis* L.).
- Слезы зезюлины**, см. Ятрышник-дремликъ (*Orchis Morio* L.).
- Слезы коровьи**, см. Первоцвѣтъ лекарственный (*Primula officinalis* Jacq.).
- Слезы кукушкины**, см. Левъ дикій (*Linaria vulgaris* Mill.).
- Слезы кукушкины**, см. Кукушкины слезки (*Orchis maculata* L.).
- Слезы кукушкины**, см. Вороній глазъ (*Paris quadrifolia* L.).
- Слезы Матери Божіей**, см. Звѣробой обыкновенный (*Hypericum perforatum* L.).
- Слезы сорочьи**, см. Очанка лекарственная (*Euphrasia officinalis* Jacq.).
- Слива**, см. Слива обыкновенная (*Prunus domestica* L.).
- Слива-венгерка**, см. Слива обыкновенная (*Prunus domestica* L.).
- Слива жидовская**, см. Кучина (*Prunus Mahaleb* L.).
- Слива каменная**, см. Абрикосъ черный сибирскій (*Armeniaca sibirica* Pers.).
- Слива лавролистная**, см. Лавровишневое дерево (*Prunus Laurocerasus* L.).
- Слива мелкоплодная**, см. Тернослива (*Prunus insititia* L.).
- Слива обыкновенная** (*Prunus domestica* L.). Слива, Слыва (Малор.), Слива-венгерка, Слива-угорка, Цвечки (Хар.), Валчуга (Хар.), Терносливъ, Черносливъ; въ Радомысльскомъ уѣздѣ, Киевск. губ., есть сорты тернослива: Гадланъ, Бардакъ, въ другихъ мѣстностяхъ той-же губ. Кобылехи. Дерево, вышиною отъ 1 сажени и выше, изъ семейства «мяндальныхъ» (*Amygdalesae*), отечество его полагаютъ въ Малой Азіи, Персіи и Закавказьѣ. Вѣтви голыя, неясныя, съ эллиптическими, городчатыми листьями. Зеленовато-бѣлые пѣты сидятъ на пушистыхъ цвѣтоножкахъ и расположены обыкновенно попарно. Чашечка увядающая, опадающая, глубоко-5-тираздѣльная. Лепестковъ 5; тычинокъ 15—20, съ нитевидными нитями, прикрѣпленными вмѣстѣ съ лепестками къ краю вогнутого цвѣтоложа. Завязь свободная (не сросшаяся съ цвѣтоложемъ), съ столбикомъ и головчатымъ рыльцемъ. Плоды—сочныя висячія костянки, съ гладкою поверхностью, темно-синіе, рѣже красные или золотисто-желтые продолговатые (сливы) или шаровидные (рейноклыды и мирабели). Разводится дерево въ многочисленныхъ сортахъ, изъ которыхъ многіе произошли путемъ постепенной культуры. Въ Россіи воздѣлывается въ среднихъ и южныхъ губерніяхъ. Цвѣтеть въ апрѣлѣ. (Табл. XLII, фиг. 242.)

МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНІЕ. Изъ мякоти свѣжихъ сливъ отваривается муссъ, который дѣйствуетъ, какъ слабительное. Сушенныя отваренныя сливы въ компотъ или протертые сквозь сито и образующія видъ кашки, служатъ приятно, слегка послаб-

ляющею, питательною пищею для больныхъ. Горькія косточки сливъ содержатъ вмѣстѣ съ нѣжнымъ масломъ такія-же вещества, какъ косточки миндаля и персиковъ. Изъ надрѣзовъ ствола вытекаетъ смола, имѣющая тѣ-же свойства, какъ и вишневая.

Слива сибирская, см. Абрикосъ черный сибирскій (*Armeniaca sibirica* Pers.).

Слива тернистая, см. Терновникъ (*Prunus spinosa* L.).

Слива-угорка, см. Слива обыкновенная (*Prunus domestica* L.).

Слизочная трава, см. Очитокъ бобовый (*Sedum Fabaria* Koch.).

Слизъ синій, см. Хатьма тюрингенская (*Lavatera thuringiaca* L.).

Слизъ } см. Алтей лекарственный (*Althaea officina-*
Слизъ великій } *lis* L.).

Слизъ дикий, см. Хатьма тюрингенская (*Lavatera thuringiaca* L.).

Слизъ меньшій } см. Просвирникъ обыкновенный (*Malva rotun-*
Слизъ трава } *difolia* L.).

Сличныясы, см. Астрagalъ солодколистный (*Astragalus glycyphyl-lus* L.).

Слипакъ, см. Дрема кукушкинъ цвѣтъ (*Lychnis flos cuculi* L.).

Слѣпота куряча, см. Лютикъ ползучій (*Ranunculus repens* L.).

Слѣпота куряча, см. Чернокорень обыкновенный (*Cynoglossum officinale* L.).

Сладкій корень, см. Солодковый корень (*Glycyrrhiza echi-nata* L.).

Солнечникъ, см. Солнечникъ однолѣтній (*Helianthus annuus* L.).

Слоновая вошь вѣсть-индская, см. Анакардъ вѣсть-индскій (*Anacardium occidentale* L.).

Слива, см. Слива обыкновенная (*Prunus domestica* L.).

Слѣпецъ, см. Льнъ посѣвной (*Linum usitatissimum* L.).

Слѣпецъ, см. Смолевка повислая (*Silene nutans* L.).

Слѣпнякъ степной, см. Чернокорень обыкновенный (*Cynoglos-sum officinale* L.).

Слѣпокуръ, см. Калужница болотная (*Caltha palustris* L.).

Слѣпокурникъ, см. Бересклетъ европейскій (*Evonymus euro-paeus* L.).

Слѣпокурникъ, см. Лютикъ ядовитый (*Ranunculus sceleratus* L.).

Слѣпокурникъ, см. Свидина (*Cornus sanguinea* L.).

Слѣпота, см. Румянка лекарственная (*Anchusa officinalis* L.).

Слѣпота куриная, см. Просо воробьиное (*Anagallis arven-sis* L.).

Слѣпота куриная, см. Калужница болотная (*Caltha palustris* L.).

Слѣпота куриная, см. Колокольчикъ сборный (*Campanula glo-merata* L.).

Слѣпота куриная, см. Чистотѣль большой (*Chelidonium majus* L.).

Слѣпота куриная, см. Свидина (*Cornus sanguinea* L.).

Слѣпота куриная, см. Чернокорень обыкновенный (*Cynoglos-sum officinale* L.).

- Слѣпота куриная, см. Сиякъ обыкновенный (*Echium vulgare* L.).
- Слѣп та куриная, см. Липучка репейчатая (*Echinospermum Lappula* Lam.).
- Слѣпота куриная, см. Зеленчукъ желтый (*Galeobdolon luteum* Sm.).
- Слѣпота куриная, см. Ястребинка зонтичная (*Hieracium umbellatum* L.).
- Слѣпота куриная, см. Воробейникъ полевой (*Lithospermum arvense* L.).
- Слѣпота куриная, см. Смолка (*Lychnis Viscaria* L.).
- Слѣпота куриная, см. Лютикъ ѣдкій (*Ranunculus acer* L.).
- Слѣпота куриная, см. Кушальница европейская (*Trollius europaeus* L.).
- Слѣпота куричья, см. Вѣтреница лютиковая (*Anemone ranunculoides* L.).
- Слѣпота куричья, см. Селезеночникъ очереднолистный (*Chrysosplenium alternifolium* L.).
- Слѣпота куричья, см. Горечавка крупная (*Gentiana Pneumonanthe* L.).
- Слѣпота куричья, см. Бѣлена черная (*Hiosciamus niger* L.).
- Слѣпота куричья, см. Пасленъ сладко-горькій (*Solanum dulcamara* L.).
- Слѣпота куричья, см. Фіалка песчаная (*Viola arenaria* L.).
- Слѣпота куричья, см. Аютины глазки (*Viola tricolor* L.).
- Слѣпота курья, см. Вѣтреница лютиковая (*Anemone ranunculoides* L.).
- Слѣпота курья или куричья, см. Звѣздчатка злачная (*Stellaria graminea* L.).
- Слѣпота курячья, см. Калужница болотная (*Caltha palustris* L.).
- Слѣпота курячья, см. Просо воробьиное (*Anagallis arvensis* L.).
- Слюгонъ } см. Зубная трава (*Anacyclus Pyre-*
Слюногонный корень } *thrum* De.).
- Слязь, см. Просвирикъ обыкновенный (*Malva rotundifolia* L.).
- Слязь, см. Просвирикъ лѣсной (*Malva silvestris* L.).
- Слязь простой, см. Просвирикъ обыкновенный (*Malva rotundifolia* L.).
- Слясь, см. Просвирикъ сѣверный (*Malva borealis* Wallm.).
- Смертоблшная, см. Ромашка персидская (*Pyrethrum carneum* Bbrst.).
- Смерть собачья, см. Зимовникъ осенній (*Colchicum autumnale* L.).
- Смертьелникъ, см. Золотая розга (*Solidago virgaurea* L.).
- Смерть свечья, см. Ковыль волосистый (*Stipa capillata* L.).
- Сметанникъ, см. Репашокъ обыкновенный (*Agrimonia Eupatorium* L.).
- Смирна, см. Подмаренникъ мягкій (*Gallium Mollugo* L.).
- Смирна, см. Жеруха лѣсная (*Nasturtium silvestre* R. Br.).
- Смовдь, см. Кушрь лѣсной (*Anthriscus silvestris* Hoffm.).

Смовдъ, см. Горичникъ лекарственный (*Peucedanum officinale* L.).

Смовдъ, см. Петрушка горная (*Peucedanum Oreoselinum* Moench.).

Смовдъ, см. Поричникъ узловатый (*Scrofularia nodosa* L.).

Смовдъ, см. Морковникъ луговой (*Silvaus pratensis* Bess.).

Смогъ, см. Перечникъ широколистный (*Lepidium latifolium* L.).

Смогранецъ, см. Мятликъ луговой (*Poa pratensis* L.).

Смоква, см. Смоковница обыкновенная (*Ficus Carica* L.).

Смоква адамова, см. Бананъ (*Musa paradisiaca* L.).

Смоква индѣйская (*Opuntia Ficus indica* Mill.). Фига индѣйская, Ракъ-трава. Растеніе изъ семейства «кактусовыхъ» (*Cactaceae*), съ мясистымъ стволomъ и многочисленными короткими шипами, родомъ изъ Вестъ-Индіи. Культивируется въ различныхъ странахъ въ Италіи, преимущественно въ Сициліи, ради цѣнныхъ плодовъ, напоминающихъ по виду смокву обыкновенную.

Смоковница, см. Смоковница обыкновенная (*Ficus Carica* L.).

Смоковница каучуковая (*Ficus elastica* Roxb.). Резинное дерево. Красивое тонкоствольное густо-облиственное, достигающее нѣсколькихъ саженъ вышины, дерево, родомъ изъ Остѣ-Индіи, съ очень крупными, до 10 вершковъ длиною, кожистыми, блестяще-зелеными листьями. Сокъ, вытекающій изъ дерева, въ отвердѣвшемъ видѣ извѣстенъ подъ названіемъ каучука. Смоковница принадлежитъ къ числу любимѣйшихъ комнатныхъ растений.

Смоковница обыкновенная (*Ficus Carica* L.). Фармацевтическое названіе: *Fractus Fici*, *Caricae*, *Pyranthodia Caricae*, *Fici*, *Ficus passae*. Дынное дерево, Дерево винноплодное, Дерево лѣсносмоковное, Смоква, Смоковница, Винныя ягоды (вездѣ), Смоквы (плодъ), Фига, Фиги, Хвига (Малор.), Инжиръ (въ Малор.). Кустарникъ или дерево выш. отъ 2 саженъ и выше, изъ семейства «крапивныхъ» (*Urticaceae*), родомъ съ Востока, но въ настоящее время встрѣчающееся одичалымъ въ южной Европѣ и въ сѣверной Африкѣ. Листья очередные, обыкновенно 3—5-тилопастные, снизу пушистые. Цвѣты мелкіе, зеленоватые, тычиночные и пестичные, сидятъ на внутренней сторонѣ грушевиднаго цвѣтоложка. Околоцвѣтникъ о 4—5-ти доляхъ; тычиночекъ столько-же. Завязь верхняя одногнѣздная, съ однимъ яичкомъ и 2-мя рыльцами. Соплодія смоковницы, извѣстныя подъ именемъ винныхъ ягодъ, или фигъ и составляющія важный предметъ торговли, состоятъ изъ мелкихъ односемянныхъ плодовъ, заключенныхъ въ разросшемся мясистомъ цвѣтоложкѣ. При благоприятныхъ условіяхъ дерево приноситъ плоды 2—3 раза въ годъ, такъ что одно дерево можетъ доставлять ежегодно отъ 6—9 пудовъ свѣжихъ винныхъ ягодъ. Разводится въ Россіи въ Крыму и на Кавказѣ. Плоды, смотря по сортамъ, болѣе или менѣе сладкіе, считаются весьма здоровыми и употребляются въ пищу, сырые и сушеные. Листья, незрѣлые плоды и губчатая древесина содержатъ острый, горькій молочный сокъ. Древесина употребляется въ столярномъ и токарномъ производствѣхъ, а молодыя вѣтви для плетенія корзинъ. (Рис. 280.)

МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ. Плоды смоквы въ большомъ употребленіи; главнымъ образомъ, они идутъ въ пищу. Не всѣ сорта одинаково хорошо сохраняются, лучше тѣ, которые собираются осенью. Высушенные смоквы, или, какъ ихъ въ обществѣ называютъ, «винныя ягоды», хорошо сохраняются въ коробкахъ, выстланныхъ свинцомъ. Сухія винныя ягоды для придачіи имъ свѣжести вымачиваютъ въ теченіе двухъ дней въ водѣ съ сахаромъ: на 2 части воды берутъ 1 часть сахара; затѣмъ ягоды обсушиваютъ, обтираютъ молочнымъ сахаромъ, чтобы снять покрывающую ихъ при высушиваніи бѣловатую пленку. Такимъ способомъ продавцы иногда придаютъ сушенымъ ягодамъ свѣжій видъ и продаютъ ихъ за свѣжія. Въ медицинѣ винныя ягоды не употребляются, въ домашнемъ-же быту онѣ имѣютъ весьма обширное примѣненіе.

Изъ нихъ варятъ чай, разрѣзавъ ягоды на кусочки и заливъ ихъ кипяткомъ. Чай этотъ считается полезнымъ средствомъ отъ кашля, раздраженія слизистой оболочки желудка и кишечника, и мочевыхъ органовъ. Отваромъ винныхъ ягодъ съ молокомъ полощатъ горло при катаррѣ глотки и воспаленіи миндалинныхъ железъ. Разваренныя въ молокѣ винныя ягоды кладутъ на больной зубъ, если образуется флюсъ. На востокѣ винныя ягоды считаются средствомъ отъ кроваваго поноса. Кофе изъ винныхъ ягодъ, иначе называемый кофе для здоровья, 80 лѣтъ тому назадъ вошелъ въ продажу, какъ суррогатъ настоящаго кофе. Сушенныя винныя ягоды поджариваются, какъ зерна кофе, и толкутся въ ступкѣ. Кофе изъ винныхъ ягодъ считается полезнымъ отъ болѣзней легкихъ, брюхвальныхъ катарровъ и коклюша. Вообще-же кофе этотъ можетъ быть употребляемъ, какъ вполне безвредный напитокъ. Зернышки изъ сушеныхъ винныхъ ягодъ считаются полезными отъ слюнотеченія, для чего берутъ въ ротъ горсточку зернышекъ и жуютъ ихъ.

Смоковница священная (*Ficus religiosa* L.). Бо-гао (Бекет.). Дерево, произрастающее въ Остѣ-Индіи. Считается у индійцевъ священнымъ, откуда и названіе «священной» смоковницы. Млечный сокъ его доставляетъ каучукъ. Употребляется туземцами отъ укушенія члѣстковыхъ. Ягоды могутъ быть употребляемы такъ-же, какъ и ягоды другихъ сортовъ смоквы.

Смола баккаутговая, см. Гваяковое дерево (*Guajacum officinale* L.).

Смола вонючая, см. Асса-фетида (*Ferula Assafoetida* L.).

Смолевка, см. Смолка (*Lychnis Viscaria* L.).

Смолевка зеленая (*Silene chlorantha* Ehrh.). Кукалица. Многолѣтнее травянистое растение изъ семейства «гвоздичныхъ» (*Caryophyllaceae* Juss.), распространенное въ средней и южной Европѣ, въ средней и южной Россіи. Стебель прямой, гладкій, листья супротивные; нижніе—лопатчато-ланцетные, при основаніи суженные въ длинный черешокъ; стеблевые—отдаленные другъ отъ друга, линейные; всѣ по краямъ мелко-пильчатые, л. роховатые, соцветіе кистеобразное, одностороннее.

Цвѣты, въ супротивныхъ 1—3-цвѣтковыхъ полузонтикахъ, на длинныхъ ножкахъ, поникающіе; чашечка голая, съ малозамѣтными жилками, 5-тизубчатая, при плодахъ булавовидная; лепестковъ 5; ноготки всѣ выдаются изъ чашечки; пластинки ихъ двураздѣльныя, съ линейними долями, желтовато-зеленоватыя; тычинокъ 10; завязь при основаніи 3-хгнѣздная. Плодь—продолговатая коробочка. Цвѣтетъ лѣтомъ. Растетъ на лугахъ и въ сосновыхъ лѣсахъ.

Смолевка ночецвѣтная (*Silene noctiflora* L.). Куколица, Натягачъ луговой, Натягачъ луговой (Малор.), Пикульникъ (Яросл.), Щелкунецъ большой (Нижег.). Однолѣтнее травянистое растение изъ семейства «гвоздичныхъ» (*Caryophyllaceae* Juss.), распространенное въ средней и южной Европѣ, въ западной, средней и южной Россіи и въ Сибиріи. Стебель выпш. 7—14 вершк., мохнато-волосистый и клейкій, простой или вѣлообразно-вѣтвистый. Нижніе листья обратно-яйцевидные, черешковые; верхніе—ланцетные, сидячіе. Бѣлые или розовые цвѣты расположены полузонтикомъ съ супротивными вѣточками. Чашечка трубчатая, съ 10 жилками. Вѣнчикъ 4—5-тилепестный; тычинокъ вдвое болѣе. Завязь несетъ три столбика. Цвѣты раскрываются ночью. Плодь—одногнѣздная коробочка на очень короткой плодоножкѣ. Цвѣтетъ съ іюня по сентябрь. Растетъ между кустарниками и на поляхъ. (Рис. 281.)

Смолевка повислая (*Silene nutans* L.). Зубъ-зелье (Под.), Комаръ, Остецъ (Волын.), Потоскуйка (Перм., Крыл.), Слѣпецъ (Тамб.), Смолянка бѣлая (Кунг.), Смоленка, Смолянка бѣлая. Смилка, Смілка біла (Малор.), Смілка бѣлая (Полт.), Шавель воробыный (Ворон., Тар.). Многолѣтнее травянистое растение изъ семейства «гвоздичныхъ» (*Caryophyllaceae* Juss.), распространенное почти во всей Европѣ и по всей Россіи, выпш. 7—14 вершк. Стебель покрытъ мягкими волосками, наверху железисто-клейкій. Вѣточки пирамидальной однобокой метелки супротивныя, трехраздѣльныя; повислые цвѣты скучены по 3—5. Чашечка трубчатая, съ 5-ю острыми зубчиками. Вѣнчикъ 5-тилепестный; лепестки бѣлые, снаружи зеленоватые. Тычинокъ 10; завязь 3-хгнѣздная, съ 3-мя столбиками. Плодь—яйцевидная коробочка. Цвѣтетъ лѣтомъ. Растетъ на опушкѣ лѣсовъ, на лугахъ и на холмахъ. (Рис. 282.)

МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНІЕ. Въ Черниговской губерніи отваръ растенія употребляется отъ укушенія бѣшеной собакой, въ Подольской губерніи изъ него дѣлають полосканіе отъ зубной боли.

Смолевка-хлопушка, см. Хлопушка (*Silene inflata* Smith.).

Смоленка, см. Смолевка повислая (*Silene nutans* L.).

Смолина, см. Подмаренникъ желтый (*Galium verum* L.).

Смолка, см. Осока цѣпкая (*Asperula Aparine* Bieb.).

Смолка, см. Подмаренникъ цѣпкій (*Galium Aparine* L.).

Смолка (*Lychnis Viscaria* L., нынѣ: *Viscaria vulgaris* Moench).

Вайсъ, Визовица болотная (Моск.), Горіцвѣтъ (Дв.), Гори-

цвѣтъ (Малор.). Дегтарка (Воронеж., Курск.), Деготярникъ, Дрема (Гвер. и друг.), Дремучка (Тамб.), Дрема смолистая, Клей сорочий (Уфимск., Вятск.), Кунальница (Волог.), Куриная слѣпота (Вятск.), Кровавникъ (Могил.), Линки (Полт.), Линица красная (Полт.), Линиякъ (Хар.), Линица (Подол.), Лѣпокъ, Цвѣтъ лѣпокъ, Прилинь (Курск.), Калмыцкое мыло (Тамб.), Мухоловъ, Огонекъ (Яросл., Петр.), Самоцвѣтка (Перм.), Смѣлка, Смѣлка червона (Малор.), Смолянка (Малор., Могил.), Смоловка, Смолевка (Могил.), Смольникъ (Пек.), Смольчугъ, Смольчугъ, Смольчакъ (Сл. Акад.), Сонъ, Сонъ-трава (Кал., Смол.), Сонъ дремота (Могил.), Сонъ дрема, Сонула, Сондаръ, Сондаръ красный, Сиячка (Кал.), Сорочаль (Тамб.), Уразная (Олон.). Многолѣтнее травянистое растеніе изъ семейства «гвоздичныхъ» (*Caryophyllaceae* Juss.), разпространенное въ сѣверной и средней Европѣ и почти во всей Россіи, выш. 3½—7 вершк. Стебель голый, наверху подъ узлами очень линкій. Листья длинныя, узкіе, супротивные. Красныя цвѣты собраны кистевидной метелкой. Чашечка 5-тираздѣльная, трубчатая, съ 10 ребрышками. Лепестковъ 5, немного выемчатыхъ. Тычинокъ 10. Завязь при основаніи 5-тичлѣзная, съ 5 столбиками. Плодъ—коробочка, раскрывающаяся 5-ю зубцами. Цвѣтеть съ мая до июля. Растетъ на лугахъ, разводится въ садахъ съ махровыми цвѣтками.

МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНІЕ извѣстно только въ народѣ. Настоя сущеныхъ листьевъ въ Калужской губерніи пьютъ отъ колики въ животѣ, въ Калужской-же губерніи его употребляютъ, какъ спотворное средство, а также отваромъ поломають ротъ отъ зубной боли.

Смолка благовонная, см. Яеминникъ душистый (*Asperula odorata* L.).

Смолка
Смолка болотная } см. Дрема кукушникъ цвѣтъ (*Lychnis flos*
Смолка боровая } *cusculi* L.).

Смолка трава, см. Иванъ-чай (*Erpobium angustifolium* L.).

Смолквица, см. Язвенникъ обыкновенный (*Antyllis Vulneria* L.).

Смоловка, см. Смолка (*Lychnis Viscaria* L.).

Смольданиникъ, см. Подмаренникъ мареповидный (*Galium rubioides* L.).

Смольная трава, см. Подмаренникъ цѣпкій (*Galium Aparine* L.).

Смольная трава, см. Осока цѣпкая (*Asperula Aparine* Bieb.).

Смольникъ, см. Смолка (*Lychnis Viscaria* L.).

Смольникъ, см. Кирказонъ обыкновенный (*Aristolochia Clematitis* L.).

Смольнякъ, см. Кирказонъ обыкновенный (*Aristolochia Clematitis* L.).

Смольчакъ }
Смольчугъ } см. Смолка (*Lychnis Viscaria* L.).
Смольчукъ }

Смоляная трава, см. Подмаренникъ цѣлительный (*Galium Aparine* L.).

Смолянка, см. Сердечникъ полевой (*Cardamine pratensis* L.).

Смолянка, см. Смолка (*Lychnis Viscaria* L.).

Смолянка бѣлая, см. Смолевка повислая (*Silene nutans* L.).

Сморжъ, см. Сморчокъ (*Morchella esculenta* Pers.).

Сморода, см. Смородина черная (*Ribes nigrum* L.).

Смородина бѣлая, см. Смородина красная (*Ribes rubrum* L.).

Смородина глухая (*Ribes alpinum* L.). Смородина горная, Проснянка, Пржеслинка (Грод.), Толокнянка, Толокняшка. Невысокій кустарникъ изъ семейства «смородиновыхъ» (*Crassulaceae* DC.), распространенный почти по всей Европѣ, въ западныхъ и юго-западныхъ губерніяхъ Россіи, встрѣчается рѣдко въ сѣверныхъ и среднихъ губерніяхъ. Листья очередные, глубоко-3—5-тилопастные, съ надрѣзано-городчатыми лопастями, при основаніи тупые или немного сердцевидные, сверху блестящіе, съ железисто-рѣсничатыми черешками. Цвѣтки однополые, двудомные, въ верхъ-стоящихъ кистяхъ; женскія кисти обыкновенно многоцвѣтковые, мужскія—длинные. Кроющіе прицвѣтники ланцетные, длиннѣе цвѣтоножки; цвѣтоножки железисто-пушисты. Чашечка блюдцеобразная, голая, съ 5-ю яйцевидными долями. Вѣнчикъ 5-тилепестный; лепестки лопатчатые въ 4 раза меньше долей чашечки, зеленовато-желтоватые. Тычинокъ 5. Завязь нижняя одногнѣздная, многосѣмянная, съ 2-мя столбиками. Плодъ—красныя ягоды. Ягоды съдобны. Цвѣтетъ весной. Растетъ между кустарниками, на опушкѣ лѣсовъ.

Смородина горная, см. Смородина глухая (*Ribes alpinum* L.).

Смородина дикая, см. Майникъ двулистный (*Majanthemum bifolium* L.).

Смородина красная (*Ribes rubrum* L.). Жостыль (Влад.), Катиль (Влад.), Киселица (Арх.), Киселеница (Сиб.), Киселиница, Кислянка (Том.), Кислица (Вост. Росс.), Княженика (Вят.), Княженичка (Вят.), Княжника, Княжница (Яросл.), Княжиха, Княжика (Влад.), Княжаика (Новг.), Княжина, Мядуница (Твер.), Порѣчка, Порички (Малор.), Поречка (Могил., Тар.), Паречка (Базин.), Поричка, Парѣчка (Бѣлор.), Парѣчь, Паречиникъ (Вил.), Старички (Малор.), Сестреница (Олон.), Самородина (Твер. и др.), Смородина бѣлая, Тюхтя (Новг., Воровч.). Общеизвѣстный кустарникъ изъ семейства «смородиновыхъ» (*Crassulaceae* DC.), выш. 1½ до 1¾ арш., распространенный въ сѣверной и средней Европѣ, въ сѣверной и западной Россіи, на Кавказѣ, въ Сибири и Туркестанѣ, въ средней Россіи встрѣчается одиночный. Шиповъ на вѣтвяхъ нѣтъ. Листья очередные, черешковые, съ 3—5 крупнозубчатыми лопастями, снизу пушистые. Зеленовато-бѣлые цвѣты въ повислыхъ кистяхъ; кроющіе прицвѣтники яйцевидные, короче цвѣтоножки. Чашечка блюдцеобразная, голая, съ 5-ю лопатчатыми, отстоящими долями; вѣнчикъ изъ 5-ти клиновидныхъ лепестковъ, значи-

тельно меньшихъ долей чашечки. Тычинокъ 5; завязь нижняя одногнѣздная, многосѣмянная, съ 2-мя столбиками. Плодъ—красныя ягоды. У смородины бѣлой, представляющей разнообразность красной, ягоды желтовато-бѣлаго цвѣта. Цвѣтетъ весной. Дико произростаеъ между кустарниками и въ лѣсахъ. Въ садахъ разводится въ многочисленныхъ сортахъ. Ягоды смородины красной и бѣлой съѣдобны; ихъ употребляютъ въ пищу сырыми, варятъ варенье, готовятъ сиропъ, желе, ликеры, наливки и проч. (Табл. XLII, фиг. 238 и 239.)

Смородина черная (*Ribes nigrum* L.). Моховка (Даль), Порѣчка (съ пол. въ Югозап. Росс.), Порычки (Подол.) Самородина (Твер. и др.), Смородъ, Сморода. Кустарникъ изъ семейства «смородиновыхъ» (*Crassulariaceae* De.), распространенный въ сѣверной и средней Европѣ и почти во всей Россіи. Листья очередные, глубоко-3—5-тилопастные, при основаніи болѣе или менѣе сердцевидные, съ крупно-зубчатыми лопастями, почти голые, нахуче отъ мелкихъ почечныхъ железокъ, разбѣянныхъ на нижней поверхности листьевъ. Цвѣты въ длинныхъ повислыхъ кистяхъ. Кроющіе прицвѣтники шиловидные, короче цвѣтоножки. Цвѣтоножки пушистыя. Чашечка колокольчатая, пушистая, съ 5-ю продолговатыми, отогнутыми назадъ, долями, покрытая точечными железками. Вѣнчикъ изъ 5-ти продолговатыхъ красноватыхъ лепестковъ, короче долей чашечки. Тычинокъ 5; завязь нижняя одногнѣздная, многосѣмянная. Плодъ—черныя ягоды. Цвѣтетъ весной. Растетъ на влажныхъ мѣстахъ между кустарниками. Разводится въ садахъ и огородахъ. Ягоды употребляются въ пищу, подобно ягодамъ красной и бѣлой смородины. Изъ нихъ также готовятъ варенья, наливки, вино, ликеры, пастилу, шипучій напитокъ «погоре» и проч. Листья кладутъ въ огуры при соленіи и въ маринады. (Рис. 234.)

МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНІЕ. Листья черной смородины считаются въ народѣ полезными отъ ревматизма и подагры. Ихъ собираютъ лѣтомъ, высушиваютъ и изъ сушеныхъ листьевъ готовятъ отваръ. На свѣжихъ листьяхъ настаиваютъ водку и пьютъ передъ ѣдой, какъ средство, возбуждающее аппетитъ. Сушеные листья черной смородины въ продажѣ служатъ для фальсификаціи чая. Сушеные листья размачиваютъ и снова высушиваютъ, послѣ чего листочки сморщиваются и принимаютъ форму, близкую къ китайскому чаю.

Смородъ, см. Смородина черная (*Ribes nigrum* L.).

Сморчки, см. Хвощъ полевой (*Equisetum arvense* L.).

Сморчокъ (*Morchella esculenta* Pers.). Сморжъ (Херс.), Грибъ изъ семейства «дискомицетовъ» (*Discomycetes*), состоящій изъ пеньки и конической желто-бурой шляпки съ сѣтчато-морщинистой поверхностью, одѣтой спороноснымъ слоемъ. Встрѣчается весной въ лѣсахъ, преимущественно на песчаной почвѣ. Употребляется въ пищу. (Табл. XLII, фиг. 240.)

Сморчокъ, см. Строчокъ (*Helvella esculenta* Pers.).

- Смоченикъ, см. Василистникъ желтый (*Thalicttrum flavum* L.).
 Смоченикъ, см. Медунца (*Spiraea ulmaria* L.).
 Смочная трава, см. Подмаренникъ цыпкій (*Galium Aparine* L.).
 Смутникъ, см. Земляныя орѣшки (*Spiraea Filipendula* L.).
 Смѣлка бѣлая, см. Смолевка повислая (*Silene nutans* L.).
 Снитка, см. Сныть обыкновенная (*Aegopodium Podagraria* L.).
 Снитка, см. Бедренецъ большой (*Pimpinella magna* L.).
 Снитка, см. Первоцвѣтъ лекарственный (*Primula officinalis* Jacq.).
 Снитка, см. Легочница лекарственная (*Pulmonaria officinalis* L.).
 Снитка Сѣлая } см. Брандушка (*Bulbocodium ruthenicum*
 Снитокъ } Bunge).
 Снить, см. Сныть обыкновенная (*Aegopodium Podagraria* L.).
 Снить, см. Дягиль лѣсной (*Angelica silvestris* L.).
 Снить, см. Борщевикъ обыкновенный (*Heracleum Sphondylium* L.).
 Снить луговая } см. Сныть обыкновенная (*Aegopodium Podagraria* L.).
 Снить лѣсная }
 Снить трава }
 Снитька, см. Сныть обыкновенная (*Aegopodium Podagraria* L.).
 Снурокъ, см. Кровохлебка лекарственная (*Sanguisorba officinalis* L.).
 Сныдъ, см. Сныть обыкновенная (*Aegopodium Podagraria* L.).
 Снытки } см. Сныть обыкновенная (*Aegopodium Podagraria* L.).
 Сныть }
 Сныть боровая, см. Марь обыкновенная (*Chenopodium album* Moqu.).
 Сныть боярская, см. Володушка золотистая (*Bupleorum aureum* Fisch.).
 Сныть обыкновенная (*Aegopodium Podagraria* L.). Фармацевтическое названіе: *Herba Podagrariae s. Gerardi*. Сныть съдобная, Бодка (Олон.), Бурчевашникъ (Нижег.), Дѣдильница (Сиб.), Дѣдильникъ (Даль), Снить-трава, Снитька, Сныть, Снитка. Снить, Сныдъ, Снѣдь, Снытки (въ бол. ч. Рос.), Снить лѣсная (Влад.), Снить луговая (Нижег.), Тонсъ (Пск.), Яглица, Яглиця, (Малор., Умань), Дяглиця (Мог.), Снять, Шнить, Шнитка (Пет., Пск.), Козья нога трава (съ лат.), Вехъ (Нижег.), Кунырь болотный (Тамб.), Укропъ дикий (Пенз.). Многолѣтнее травянистое растение изъ семейства «зонтичныхъ» (*Umbelliferae* Juss.), распространенное почти во всей Европѣ и во всей Россіи. Корневище ползучес. Стебель прямостоящій, достигающій 1½ арш. вышины, полый, бороздчатый. Нижніе листья длинно-черешковые, двояко-тройчатые, съ крупными яйцевидными, пальчатыми долями, верхніе—тройчатые. Бѣлые мелкіе цвѣты въ сложныхъ, крупныхъ зонтикахъ о 12—20 главныхъ лучахъ, безъ обертокъ и обверточекъ. Чашечка о 5 зубчикахъ. Лепестковъ и тычинокъ по 5. Завязь нижняя двугнѣзная; на верхушкѣ завязь несетъ железистый дискъ; столбикъ 2. Плодъ продолговатый—двуствѣнка, распадающаяся при созрѣваніи на 2 плодика,

несущихъ на спинкѣ по 5 нитевидныхъ реберъ. Цвѣтетъ лѣтомъ. Произрастаетъ въ лѣсахъ и между кустарниками. Въ нашихъ садахъ это—очень обременительная и трудноискоренная трава, такъ какъ легко размножается ползучими корневищами. Молодые листья употребляются иногда для щей. Въ прежнее время растение употреблялось отъ подагры, теперь оставлено (Рис. 285.)

Сныть съѣдобная, см. Сныть обыкновенная (*Aegorodium Podagraria* L.).

Снѣдокъ, см. Брандушка (*Bulbosodium ruthenicum* Bunge).

Снѣдокъ, см. Кервель обыкновенный (*Anthriscus Cerefolium* Hoffm.).

Снѣдокъ лѣсной, см. Купырь лѣсной (*Anthriscus silvestris* Hoffm.).

Снѣдъ, см. Сныть обыкновенная (*Aegorodium Podagraria* L.).

Снѣжное дерево (*Chionanthus virginica* L.). Северо-американскій декоративный кустарникъ съ овальными листьями и снѣжно-бѣлыми кистями цвѣтовъ. Кора корней обладаетъ острыми наркотическими свойствами.

Снѣжное дерево, см. Ягода снѣжная (*Symphoricarpos racemosus* Mich.).

Снѣжокъ, см. Сушеница болотная (*Gnaphallium uliginosum* L.).

Снятъ, см. Сныть обыкновенная (*Aegorodium Podagraria* L.).

Снятъ, см. Порремокъ обыкновенный (*Rhinanthus Crista Galli* L.).

Собаки, см. Подмаренникъ цыкій (*Galium Aparine* L.).

Собаки, см. Гравилатъ водяной (*Geum rivale* L.).

Собаки, см. Лопушникъ большой (*Lappa major* Gaertn.).

Собачиха, см. Гравилатъ водяной (*Geum rivale* L.).

Собачій зубъ (*Erythronium Dens Canis* L.). Беесъ, Беесъ, Кандыкъ, Коренья гнилые (на Алт.), Кровяница, Зубъ-трава, Собачки. Многолѣтнее луковичное травянистое растение, произрастающее въ южной Европѣ, Сибири и Монголіи. Луковичы его употребляются въ пищу татарамъ, а въ Кузнецкомъ уѣздѣ черные татары приготавлиютъ изъ нихъ опьяняющій напитокъ, называемый «абартка», въ большомъ количествѣ замѣняющій пиво на праздникахъ. Замѣчено, что оно вредно для ко-ровъ.

МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНІЕ. Въ медицинѣ это растение прежде употреблялось отъ глистовъ, коликъ и падучей болѣзни, теперь оставлено.

Собачій корень, см. Чернокорень лекарственный (*Cynoglossum officinale* L.).

Собачка, см. Чернокорень обыкновенный (*Cynoglossum officinale* L.).

Собачка, см. Липучка репейчатая (*Echinospermum Lappula* Lehm.).

Собачка, см. Липучка серебристая (*Potentilla argentea* L.).

Собачки, см. Репяхокъ обыкновенный (*Agrimonia Eupatorium* L.).

Собачки, см. Череда трехраздѣльная (*Bidens tripartita* L.).

Собачки, см. Липучка репейчатая (*Echinospermum Lappula* Lehm.).

- Собачки, см. Собачій зубъ (*Erythronium Dens Canis* L.).
- Собачки, см. Гравилатъ городской (*Geum urbanum* L.).
- Собачки, см. Сусеница болотная (*Gnaphalium uliginosum* L.).
- Собачки, см. Ленъ дикій (*Linaria vulgaris* Mill.).
- Собачки, см. Незабудка болотная (*Myosotis palustris* With.).
- Собачки, см. Коростовникъ полевой (*Scabiosa arvensis* L.).
- Собачки, см. Дурнишникъ обыкновенный (*Xanthium Strumarium* L.).
- Собачки водяныя, см. Посконникъ конопляный (*Eupatorium cannabinum* L.).
- Собачникъ, см. Череда трехраздѣльная (*Bidens tripartita* L.).
- Собачникъ, см. Чернокорень лекарственный (*Cynoglossum officinale* L.).
- Собачникъ, см. Лопушникъ большой (*Lappa major* Gärtn.).
- Собачникъ, см. Просо колосистое (*Panicum Crus Galli* L.).
- Собачникъ аптечный, см. Чернокорень лекарственный (*Cynoglossum officinale* L.).
- Собачница петрушечья, см. Петрушка собачья (*Aethusa Cy-narium* L.).
- Собачья трава, см. Володушка золотистая (*Bupleurum aureum* Tisch.).
- Собачья трава, см. Медунца (*Spiraea ulmaria* L.).
- Сойвида трава, см. Василекъ синий (*Centaurea cyanus* L.).
- Сокирка, см. Ленъ дикій (*Linaria vulgaris* Mill.).
- Сокирки, см. Горошекъ заборный (*Vicia sepium* L.).
- Сокирки, см. Фиалка собачья (*Viola canina* L.).
- Сокирки, см. Анютины глазки (*Viola tricolor* L.).
- Сокирки голубые, } см. Васильки рогаые (*Delphinium Con-*
 Сокирки полеві } solida L.).
- Сокирки полевые }
- Сокирки, см. Шалфей луговой (*Salvia pratensis* L.).
- Соколій перелетъ (*Gentiana cruciata* L.). Фармацевтическое название: *Gentiana cruciata s. minor*. Василца (Вят.), Денная (Каз.), Живучка (Ворон.), Живущая (Курск.), Звѣробой бѣлый, Змѣевикъ, Исконять (Вят.), Казакъ (Перм., Вят.), Крестовый корень, Лиходѣй (Орл., Тамб.), Лихоманникъ (Укр.), Матерянка (Кіев.), Петровъ крестъ (Тамб.), Петрова трава (Исвз.), Подворникъ (Полт.), Порѣзникъ (Вор.), Пятналошникъ (Ворон.), Рашникъ (Курск.), Семиродникъ (Вятск.). Соколій перелетъ. Соколій полетъ, Сердечная трава (Вят., Ниж.), Перелетъ соколій др. Сильнѣ вѣтвисты. Селяникъ (Вор.), Семиродникъ (1 лт.), Тирличъ (Полт.), Тирличъ (Волин.) и изм. Тирличъ, Тирличъ (Курск.), Таралишникъ (Хар.), Товстуха (Малор.), Толстунка (Кіев.), Уразная (Вят.). Многолѣтнее травянистое растеніе изъ семейства «горечавковыхъ» (*Gentianaceae* Juss.), распространенное въ средней Европѣ, въ Италіи, Испаніи, Малой Азій, въ южной Россіи, Крыму, Кавказѣ и въ Сибири до Алтая. Корнище укороченное, дающее ежегодно розетку изъ красныхъ листьевъ и изъ пазухъ послѣднихъ—нѣсколько приподнимающихся олиствен-

ныхъ цвѣточныхъ стеблей. Листья продолговато-ланцетные, туповатые, снабженные 3—5 жилками; стеблевые—при основаніи сросшіеся во влагалища; голубоватые цвѣтки средней величины на короткихъ цвѣтоножкахъ расположены пучками въ углахъ верхнихъ листьевъ и на концѣ стебля. Чашечка перепончатая, съ 4-мя неравными линейно-ланцетными долями; вѣнчикъ булавовидно-трубчатый, съ 4-мя яйцевидными долями и 4-мя ланцетными зубчатыми промежуточными лопастями, Тычинокъ 4; завязь верхняя одногнѣздная, съ двулопастнымъ, почти сидячимъ рыльцемъ. Плодъ—продолговато-ланцетная коробочка, раскрывающаяся по швамъ на 2 створки. Цвѣтетъ лѣтомъ. Растетъ на лугахъ, холмахъ и между кустарниками.

МИДИЙСКОЕ УПОТРЕБЛЕНІЕ. Все растеніе обладаетъ весьма торькимъ вкусомъ и употреблялось прежде отъ перемежающихся лихорадокъ, гливотъ и даже отъ чумы. Въ послѣднее время его предлагали отъ водобоязни. Также оно славилось, какъ средство, способствующее заживленію ранъ. Теперь оно врачами совсѣмъ оставлено. Въ народѣ оно въ видѣ настоя употребляется отъ ранъ, отъ порѣзовъ, отъ боли въ спинѣ и подъ ложечкою. Народные вѣтеринары даютъ настой растенія лошадямъ отъ кашля и рога-тому скоту—отъ падежа.

Соколій перелетъ, см. Горечавка крупная (*Gentiana Pneumonanthe* L.).

Соколій перелетъ, см. Острокильникъ волосистый (*Oxytropis pilosa* Dc.).

Соколій перелетъ, см. Мыльнянка лекарственная (*Saponaria officinalis* L.).

Соколій перелетъ дикій, см. Хлопунка (*Silene inflata* Smith.).

Соколій полетъ, см. Соколій перелетъ (*Gentiana cruciata* L.).

Сокольникъ, см. Ястребинка волосистая (*Hieracium pilosella* L.).

Сокольникъ, см. Ястребинка зонтичная (*Hieracium umbellatum* L.).

Соко́ра } см. Осокорь (*Populus nigra* L.).

Соко́рина }

Соко́рки, см. Рѣзакъ степной (*Falcaria Rivini* Host.).

Соленая трава, см. Зольникъ калийный (*Salsola Kali* L.).

Солеросъ (*Salicornia herbacea* L.). Вирюгонъ, Мокрединникъ, Солецъ трава, Солонецъ, Сольникъ (Сл. Церк.), Солянка, Сольникъ травянистый. Ярко-зеленая однолѣтняя трава, выш. въ $3\frac{1}{2}$ —7 вершк., изъ семейства «маревыхъ» (*Chenopodiaceae* Hook et Benth.), распространенная въ средней южной Европѣ, встрѣчающаяся въ средней и южной Россіи, въ Туркестанѣ и Сибири. Стебель вѣтвистый, сочный, членистый, съ недоразвитыми супротивными листьями въ видѣ небольшихъ чешуекъ, въ углахъ которыхъ сидятъ по 3 вмѣстѣ невзрачные цвѣты. Околоцвѣтникъ 5-тираздѣльный; тычинокъ 5; завязь одногнѣздная, съ однимъ яичкомъ; столбиковъ 2. Цвѣтетъ осенью. Растетъ на солончакахъ и морскихъ берегахъ. Изъ растенія добываются сода и натръ. Оно разводится искусственно во Франціи. Прежде употреб-

лялось въ видѣ салата, какъ противоцинготное средство, теперь оставлено. (Рис. 286.)

Солецъ-трава, см. Солеросъ (*Salicornia herbacea* L.).

Солнечникъ, см. Подсолнечникъ однолѣтн. (*Helianthus annuus* L.).

Солнечникъ, см. Солнечникъ обыкновенный (*Helianthemum vulgare* Gärtn.).

Солнечникъ, см. Пасленъ черный (*Solanum nigrum* L.).

Солнечникъ обыкновенный (*Helianthemum vulgare* Gärtn.).

Фармацевтическое названіе: *Helianthemum* s. *Chamaecistus vulgaris*. Будра, Золотая трава, Каменная роза, Нѣтникъ (Черн.), Нѣтникъ (Малор.), Солнечникъ, Солнцецвѣтникъ, Солнцевъ цвѣтъ, Подсолнечникъ, Полущечная трава, Ладанное дерево, Болячникъ (Гродн.), Мавротъ. Стелющійся полукустарничекъ изъ семейства «ладанниковыхъ» (*Cistaceae* Juss.), распространенный почти во всей Европѣ, въ средней и западной Россіи, въ Крыму и на Кавказѣ, съ короткимъ, вѣтвистымъ, деревеняющимъ стеблемъ, отъ котораго отходятъ однолѣтнія лежація или приподнимающіяся вѣтви, длиною 5—7 вершковъ. Листья овальные или ланцетовидные, съ прилистниками. Цвѣты золотистожелтые, расположенные кистеобразнымъ полузонтикомъ. Чашечка 5-тилистная; лепестковъ 5, въ 4 раза длиннѣе чашелистиковъ. Завязь одногнѣздная, съ простымъ столбикомъ, съ головчатымъ рыльцемъ. Плодъ—коробочка, раскрывающаяся тремя створками. Цвѣтетъ съ мая до августа. Растетъ въ рощахъ, на опушкѣ лѣсовъ, на лѣсныхъ полянахъ.

Солнечникъ чешуйчатый, см. Петровъ крестъ (*Lathraea Squamaria* L.).

Солнечное золото, см. Цминъ (*Helychrisum arenarium* Dc.).

Солнечный корень, см. Заразиха красноватая (*Orobancherubens* L.).

Солнешникъ, см. Поповникъ обыкновенный (*Chrysanthemum Leucanthemum* L.).

Солновертъ } см. Подсолнечникъ однолѣтній (*Helianthus annuus* L.).

Солнце золотистое, см. Цминъ (*Helychrisum arenarium* Dc.).

Солнцева трава, см. Цикорій обыкновен. (*Cichorium Intybus* L.).

Солнцевъ корень, см. Заразиха красноватая (*Orobancherubens* L.).

Солнцевъ цвѣтъ, см. Солнечникъ обыкновенный (*Helianthemum vulgare* L.).

Солнцеглядъ (*Euphorbia Helioscopia* L.). Фармацевтическое названіе: *Esula*, v. *Tithymalus*. Заячій скокъ (Мог.). Однолѣтнее травянистое растеніе изъ семейства «молочайниковыхъ» (*Euphorbiaceae* Juss.), распространенное почти по всей Европѣ, въ сѣверной, средней и юго-западной Россіи, въ Крыму, на Кавказѣ и въ Туркестанѣ. Стебель выш. 3½—7 вершк., простой или при основаніи съ немногими восходящими вѣтвями. Листья очередные, обратно-яйцевидные, суженные въ короткій черешокъ, спереди шильчатые. Общее соцвѣтіе зонтикообразное о 5-ти

главныхъ лучахъ, вѣлообразно развѣтвляющихся 1 или 2 раза; при каждомъ развѣтвленіи находятся 2 прицвѣтника. Цвѣты однодомные: тычиночные состоятъ всего изъ одной тычинки, а пестичные — изъ одного пестика, сидящаго на длинной ножкѣ. Нѣсколько тычиночныхъ цвѣтковъ и одинъ пестичный собраны вмѣстѣ и окружены спайнолистною оберткой, образуя такимъ образомъ маленькое соцвѣтіе, напоминающее обоеполюй цвѣтокъ. Обертка колокольчатая, съ 4—5 лопастями, чередующимися съ отогнутыми наружу, округлыми медниковыми железками, выделяющими сладкій сокъ. Плодъ—3-хгнѣздная гладкая коробочка. Сорная трава, произрастающая на обработанныхъ мѣстахъ. Цвѣтетъ лѣтомъ. Сокъ растенія острый, какъ и всѣхъ мотыльковыхъ. Въ прежнее время онъ употреблялся противъ сифилиса. (Рис. 287.)

Солнцедвѣтникъ, см. Солнечникъ обыкновенный (*Helianthemum vulgare* L.).

Соловка малая трава, см. Многоножка обыкновенная (*Polypodium vulgare* L.).

Солодець
Солодика
Солодикъ
Солодина
Солодка } см. Солодковый корень (*Glycyrrhiza echinata* L.).

Солодна, см. Пасленъ сладко-горькій (*Solanum dulcamara* L.).

Солодка, см. Клеверъ луговой (*Trifolium pratense* L.).

Солодкая трава, см. Борщевикъ обыкновенный (*Heracleum Sphondylium* L.).

Солодкій дедикъ, см. Буквица лекарственная (*Betonica vulgaris* L.).

Солодкій корень, см. Солодковый корень (*Glycyrrhiza echinata* L.).

Солодковое донное дерево, см. Крапивное дерево (*Celtis australis* L.).

Солодковый дубъ, см. Солодковый корень (*Glycyrrhiza echinata* L.).

Солодковый корень (*Glycyrrhiza echinata* L.). Корень въ торговлѣ извѣстенъ подъ именемъ «русская лакрица», «русскій солодковый корень» (*Radix Liquiritiae russicae*). Бурлякъ (Ставр.), Выхри (Екат.), Вербець солодкій, Осолотка трава, Сладкій корень, Солодкій корень, Солодка, Солодикъ, Сладкій корень, Дубецъ (Донъ), Солодковый дубъ, Солодець (Екат.), Солодика, Солодскій корень (Урал.), Солодина, Солодыжники, Буя (Даль), Лакричникъ, а сокъ — Лакрица, по Май. — Лякорыца. Многолѣтнее прижато-пушистое травянистое растеніе изъ семейства «мотыльковыхъ» (*Papilionaceae* L.), распространенное въ средней и южной Европѣ, встрѣчающееся изрѣдка въ южной и юго-восточной Россіи. Листья непарно-перистые, съ ланцетными прилистниками. Листочки эллиптическіе, продолговатые, остроконечные, усаженные точечными железками. Бѣловато-фіолетовые

цвѣты въ густыхъ головчатыхъ кистяхъ, на весьма короткихъ ножкахъ, въ нѣсколько разъ короче листьевъ. Чашечка трубчатая, 5-тизубчатая; вѣнчикъ мотыльковый, состоящій изъ 5-ти лепестковъ. Тычинокъ 10; верхняя свободная; гнѣзда пыльниковъ наверху сливаются. Завязь одногнѣздная, съ нитевиднымъ голымъ столбикомъ. Плодъ—продолговато-эллиптическое 2-хѣмянное бобы, усаженные длинными шипами. Цвѣтетъ лѣтомъ. Растетъ на лугахъ. Сокъ корня даетъ лакрицу.

МЕДИЦИННОЕ УПОТРЕБЛЕНІЕ. Солодковый корень употребляется въ медицинѣ въ тѣхъ-же случаяхъ, какъ и корень лакрицы (*Glycyrrhiza glabra*, см. 554 стр.).

Солодкогорькая трава, см. Пасленъ сладкогорькій (*Solanum dulcamara* L.).

Солодке зелье, см. Блошница проносная (*Inula disenterica* L.).

Солодкій корень } см. Солодковый корень (*Glycyrrhiza echi-*
Солодыжникъ } *pata* L.).

Солодянка, см. Брюква (*Brassica Napus* L.).

Соломоничка, см. Щавель малый (*Rumex Acetosella* L.).

Солоней, см. Катранъ красный, или кермекъ (*Statice Gmelini* Will.).

Солонецъ, см. Подорожникъ ланцетный (*Plantago lanceolata* L.).

Солонецъ, см. Солеросъ (*Salicornia herbacea* L.).

Солонечникъ, см. Катранъ красный (*Statice Gmelini* Willd.).

Солоники, см. Кислица обыкновенная (*Oxalis Acetosella* L.).

Соль заячья, см. Ландышъ майскій (*Convallaria majalis* L.).

Соль заячья, см. Кислица обыкновенная (*Oxalis Acetosella* L.).

Соль заячья, см. Грушанка однобокая (*Pirola secunda* L.).

Соль соколя трава, см. Макъ мексиканскій (*Argemone mexicana* L.).

Сольданелла, см. Сольданелла альпійская (*Soldanella alpina* L.).

Сольданелла альпійская (*Soldanella alpina* L.). Многолетняя маленькая альпійская травка, встречающаяся въ Альпахъ, изъ семейства «первоцвѣтныхъ» (*Primulaceae* Hook et Benth.), съ прикорневыми, черешковыми, округло-почковидными листьями, расположенными розеткой. Цвѣточная стрѣлка, выпш. въ нѣсколько вершковъ, несетъ 2—3 полныхъ фиолетовыхъ цвѣтка; вѣнчикъ колокольчатый, раздѣленный до половины на 5-ть бахромчато-надрѣзанныхъ лопастей; тычинокъ 5; завязь верхняя одногнѣздная, съ однимъ столбикомъ, одинаковой длины съ вѣнчикомъ. Плодъ—коробочка. Цвѣтетъ въ юль и августъ. Растетъ въ травянистыхъ мѣстахъ и между камнями.

Сольникъ, см. Извѣнникъ обыкновенный (*Anthyllis Vulneraria* L.).

Сольникъ, см. Солеросъ (*Salicornia herbacea* L.).

Сольное зелье, см. Извѣнникъ обыкновенный (*Anthyllis Vulneraria* L.).

Солянка, см. Солеросъ (*Salicornia herbacea* L.).

Солянка, см. Сольникъ калийный (*Salsola Kali* L.).

Сонбаръ } см. Лютиль ѣдкій (*Ranunculus acer* L.).
Сондаръ }

Сондарь } см. Смолка (*Lychnis Viscaria* L.).
Сондарь красный }
Сонечка, см. Поповникъ обыкновенный (*Chrysanthemum Leucanthemum* L.).
Сонечникъ, см. Подсолнечникъ однолѣтній (*Helianthus annuus* L.).
Сонишникъ, см. Очанка лекарственная (*Euphrasia officinalis* L.).
Сонишныкъ, см. Подсолнечникъ однолѣтній (*Helianthus annuus* L.).
Сонная одурь, см. Белладонна (*Atropa Belladonna* L.).
Сонная одурь } см. Вишня ядовитая (*Physalis Alkekengi* L.).
Сонная трава }
Сонная трава, см. Белладонна (*Atropa Belladonna* L.).
Сонникъ, см. Сонъ-трава (*Anemone patens* L.).
Совникъ, см. Блошница обыкновенная (*Inula Pulicaria* L.).
Сонное зелье, см. Белладонна (*Atropa Belladonna* L.).
Сонула, см. Смолка (*Lychnis Viscaria* L.).
Сончикъ, см. Сонъ-трава (*Anemone patens* L.).
Сончикъ, см. Сонъ (*Anemone Pulsatilla* L.).
Сонъ, см. Сонъ-трава (*Anemone patens* L.).
Сонъ (*Anemone Pulsatilla* L.). Фармацевтическое названіе: *Pulsatilla vulgaris* s. *coerulea*, *Herba Venti*, *Nola Cullinaria*. Булдовникъ (Мог.), Вѣтренница (Даль, съ лат.). Горлушки (Черн.), Котелки, Котелочки, Котельчики (Даль), Курчаникъ (Могил.), Козиное масло (Мог.), Лютикъ (Коз.), Одолень боровой (Волог.), Огурешникъ (Ниж.), Однолѣтній цвѣтъ (Сарат.), Перелѣска (Мог.), Подсѣжникъ (Тамб.), Прострѣлъ, Прострѣлъ (Малор.), Сонъ-зелье (Малор.), Сонъ-дрема (Даль), Сонъ-трава (Екат.), Сончикъ (Гродн.), Сосновка (Коз.). Многолѣтнее травянистое растеніе изъ семейства «лютиковыхъ» (*Ranunculaceae* Juss.), распространенное въ большей части Европы, въ западной и южной Россіи, въ Сибирѣ и Туркестанѣ, выш. 3½—7 вершк. Листья очередные, яйцевидные, тройко-перисто-разсѣченные. Цвѣты свѣтло-лиловые крупныя, прямостоящія. Лепестковъ вѣнчиковиднаго околоцвѣтника 6, вдвое превышающихъ тычинки. Плодь состоитъ изъ стѣмянокъ, несущихъ длинныя, пушистыя столбикъ. Цвѣтетъ весной. Растетъ на открытыхъ холмахъ, въ степяхъ и рощахъ. Употребляется на краску для окрашиванія нитокъ и различной пряжи.

МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНІЕ. Вкусъ листьевъ растенія «сонъ» острый, немного горькій. Острота вкуса пропадаетъ при высушиваніи. Цвѣтетъ растеніе въ апрѣлѣ и маѣ, сборъ производится въ маѣ. Дѣйствующимъ веществомъ пульсатиллы считается вещество, извѣстное подъ названіемъ пульсатилловой камфоры, или анемонины. При высушиваніи растеніе теряетъ почти всѣ свои дѣйствующія вещества и врачамъ въ чистомъ видѣ почти не прописывается. Изъ свѣжаго растенія готовятъ въ аптекахъ экстрактъ и спиртную настойку. Ихъ предлагаютъ принимать отъ паралича зрительнаго нерва, головокруженія, коклюша, меланхолии, при задержкѣ регулы и боляхъ при нихъ, при сердцѣбіи, бо-

ляхъ въ животѣ; кромѣ того, экстрактъ и настойку назначаютъ отъ сифилитическихъ раздраженій на кожѣ, также подагры и водянки. Экстрактъ пульсатиллы дается отъ 0,03—0,06—0,1—0,15 граммъ (5 гранъ, 10 гр., 16 гр., 24 грана) нѣсколько разъ въ день. Настойка пульсатиллы принадлежитъ къ числу сильнодѣйствующихъ средствъ. Ее употребляютъ внутрь и снаружи отъ зубной боли. Ее даютъ отъ 10-ти до 30-ти капель 2—3 раза въ день. Въ народной медицинѣ отваръ пульсатиллы употребляется отъ расслабленія (въ Казанской губ.). Въ Черниговской дѣтей окуриваютъ ею отъ бессонницы, отъ лихорадки прикладываютъ къ пульсу.

Въ гомеопатіи пульсатилла имѣетъ примѣненіе при очень разнообразныхъ болѣзняхъ, какъ острыхъ, такъ и хроническихъ, внутреннихъ и нервныхъ. Изъ нервныхъ болѣзней пульсатиллой лечатся: манія, меланхолія и истерія; изъ внутреннихъ болѣзней: кашель, болѣзни почекъ и тазовыхъ органовъ, также катарральныя состоянія слизистой оболочки желудка и кишокъ, поносы, желтуха, малокровіе; кромѣ того, пульсатиллу даютъ отъ зубной боли, отъ отмораживанія и ревматизма. Настойку приготовляютъ изъ сока свѣже-выжататаго растенія, который смѣшиваютъ со спиртомъ. Даютъ 1—2 капли чистой настойки или же 1, 2, 3, 6, 12-го разведенія отъ одного до нѣсколькихъ разъ въ день. Наиболѣе дѣйствующимъ считается 2-е разведеніе.

Въ ветеринарной практикѣ пульсатилла дается также часто при воспаленіи глазъ, сопровождаемомъ слезотеченіемъ отъ совместнаго раздраженія слизистой оболочки вѣкъ, при катарральномъ раздраженіи слизистой оболочки желудочно-кишечнаго канала, въ особенности при припуханіи и заболѣваніи слизистой оболочки рта у животныхъ, при поносахъ у молодыхъ животныхъ, питающихся молокомъ, при сапѣ у лошадей, при катаррѣ слизистой оболочки бронхъ и коклюшѣ у собакъ, въ послѣродовомъ періодѣ многихъ животныхъ отъ сильныхъ болей, отъ неправильныхъ выдѣленій слизи или крови, при лихорадкѣ отъ сконченія молока или отъ заболѣванія матки и ея придатковъ, отъ жидкаго молока у коровъ. Также пульсатилла дается и отъ заболѣванія мочевыхъ путей, и отъ фистулезныхъ ходовъ на различныхъ частяхъ тѣла.

Сонъ, см. Белладонна (*Atropa Belladonna* L.).

Сонъ, см. Драма кукушкннъ (*Lychnis flos cuculi* L.).

Сонъ, см. Вишня жидовская (*Physalis Alkekengi* L.).

Сонъ блакитный, см. Сонъ трава (*Anemone patens* L.).

Сонъ Богородицы } см. Вѣтрянница лѣсная (*Anemone silve-*
Сонъ бѣлый } stris L.).

Сонъ дрема, см. Сонъ (*Anemone Pulsatilla* L.)

Сонъ дрема } см. Смолка (*Lychnis Viscaria* L.).
Сонъ дремота }

Сонъ зелье } см. Сонъ (*Anemone Pulsatilla* L.).
Сонъ-трава }

Сонъ-трава (*Anemone patens* L.). Однолѣсичникъ, Подсѣбжннкъ, Пострѣль (Вятск., Прпарт. кр.), Прострѣль (Вятск., Хар.), Про-

стрѣль боровой (Никол., Волог. губ.), Прострѣльная трава, Прострѣльникъ (Перм.), Стрѣльная. Разлапушникъ (Тамб.), Сонъ (Малор. и др.), Сонъ блажитый, Сонникъ, Сончикъ, Самсончикъ (Вор., Тар.), Сукъ, Овечья трава, Ургуй (Приарг. кр.). Многолѣтнее травянистое растеніе изъ семейства «лютиковыхъ» (Ranunculaceae), распространенное почти во всей Европѣ, въ Россіи и въ Сибиріи. Листья тройственно-разсѣченные, съ 2—3 раздѣльными сегментами и надрѣзанными, линейно-продолговатыми долями. Лилые крупныя цвѣточки—повикающіе, съ широкимъ колокольчатымъ покрываломъ. Листочковъ вѣничковиднаго околоцвѣтника 6; плодъ состоитъ изъ стѣмянокъ, несущихъ длинныя, пушистыя столбики. Цвѣтетъ рано весной. Растетъ въ сосновыхъ лѣсахъ, въ негустыхъ рощахъ и дугахъ.

МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНІЕ. Это растеніе употребляется только въ народѣ. Въ Пермской губ. изъ него дѣлаютъ ванны отъ разныхъ сыпей и сокомъ растенія натираютъ опѣкшвыя члены. Въ Вологодской губ., около Никольска, отваромъ или decoctumъ поятъ женщинъ во время родовъ, чтобы успокоить боли. Въ Витской губ. вода, перегнанная черезъ цвѣтки, известна подъ именемъ Мазырина спирта и употребляется отъ ревматическихъ болей для втиранія. Decoctъ изъ травы употребляется въ Малороссіи отъ конвульсій у дѣтей. Во многихъ мѣстахъ Россіи существуетъ повѣрье, что Богородица проклала это растеніе. Въ Якутской области трава употребляется отъ чесотки. Для этого ее кладутъ въ сметану и ставятъ дня на три въ теплое мѣсто, потомъ этой сметаной мажутъ тѣло. Въ Якутской-же области трава эта употребляется вмѣсто пшанекой муки: ее сунуть, толкутъ и потомъ ввидѣ порошка привязываютъ къ тѣлу.

Сонъ-трава, см. Горечавка крупная (*Gentiana Pneumonanthe* L.).

Сонъ-трава, см. Дрема кукушкинъ цвѣтъ (*Lychnis flos cuculi* L.).

Сонъ-трава, см. Смолка (*Lychnis Viscaria* L.).

Сонячникъ } см. Подсолнечникъ однолѣтній (*Helianthus an-*

Соняшникъ } *nus* L.).

Сорго вѣничное, см. Дурра (*Sorghum vulgare* Pers.).

Сорго сахарное (*Sorghum saccharatum* Poir.). Просо пштайское. Растеніе изъ «злаковыхъ» (Gramineae Juss.), родомъ изъ Остѣ-Индіи и Аравіи. Разводится преимущественно въ Северо-Американскихъ Штатахъ для добыванія сахарныхъ листьевъ. Въ западной Франціи также добывается изъ стеблей растенія сахаръ, а изъ зеренъ—спиртъ.

Сорока, см. Ландыш майскій (*Convallaria majalis* L.).

Сорока, см. Майникъ двулистный (*Majanthemum bifolium* L.).

Сорокобратовъ, см. Личка (*Tanacetum vulgare* L.).

Сорокозубъ, см. Вуковца лекарственная (*Betonica vulgaris* L.).

Сороконедужная, см. Будра плющевидная (*Glechoma hederacea* L.).

Сороконедужная, см. Грушавка круглолистная (*Pirola rotundifolia* L.).

Сороконедужная, см. Васелистикъ желт. (*Thalictrum flavum* L.).

- Сороконедужная, см. Анютины глазки (*Viola tricolor* L.).
- Сороконедужникъ, см. Реяшокъ обыкновенный (*Agrimonia eupatorium* L.).
- Сороконедужникъ, см. Норичникъ узловатый (*Scrophularia nodosa* L.).
- Сороконедужникъ, см. Мыльнянка лекарственная (*Saponaria officinalis* L.).
- Сорокоперникъ } см. Лея дикій (*Linaria vulgaris* Mill.).
- Сорокопитникъ }
- Сорокопритка, см. Синюха обыкновенная (*Polemonium coeruleum* L.).
- Сорокоприткая, см. Воронецъ колосистый (*Actaea spicata* L.).
- Сорокопритокъ, см. Синюха обыкновенная (*Polemonium coeruleum* L.).
- Сорокоприточка, см. Воронецъ колосистый (*Actaea spicata* L.).
- Сорокоприточная, см. Мавжетка обыкновенная (*Alchemilla vulgaris* L.).
- Сорокоприточная, см. Кошачьи лапки (*Antennaria dioica* Gaertn.).
- Сорокоприточная, см. Синюха обыкновенная (*Polemonia coeruleum* L.).
- Сорокоприточная, см. Пастушьи блуждающие (*Polygala vulgaris* L.).
- Сорокоприточная, см. Желтуха обыкновенная (*Senecio Jacobaea* L.).
- Сорокоприточная, см. Медуница (*Spiraea ulmaria* L.).
- Сорокоприточная, см. Валериана лекарственная (*Valeriana officinalis* L.).
- Сорокоприточникъ, см. Борецъ желтый (*Aconitum Lycoctonum* L.).
- Сорокопрочная, см. Жабникъ пашенный (*Filago arvensis* L.).
- Сорокопытникъ, см. Герань луговая (*Geranium pratense* L.).
- Сорокоцвѣточная, см. Синюха обыкновенная (*Polemonium coeruleum* L.).
- Сорочанъ, см. Смолка (*Lychnis Viscaria* L.).
- Сорочка, см. Ландышъ майскій (*Convallaria majalis* L.).
- Сорочка, см. Ценовикъ обыкновенный (*Chrysanthemum Leucanthemum* L.).
- Сорочки, см. Амарантъ колосистый (*Amaranthus retroflexus* L.).
- Сорочникъ, см. Ценовикъ обыкновенный (*Chrysanthemum Leucanthemum* L.).
- Сорочья пряжа, см. Плюнь обыкновенный (*Hedera Helix* L.).
- Сорочья трава, см. Ислетникъ сѣро-зеленый (*Berteroa incana* L.).
- Сорочья трава, см. Короставникъ полевой (*Scabiosa arvensis* L.).
- Сосенка, см. Горичекъ весенній (*Adonis vernalis* L.).
- Сосенка, см. Хвощъ полевой (*Equisetum arvense* L.).
- Сосенка, см. Подмаренникъ желтый (*Galium verum* L.).

- Сосенка** } см. Сосенка водяная (*Hippuris vulga-*
Сосенка болотная } *ris* L.).
- Сосенка водяная**, см. Хвощъ полевой (*Equisetum arvense* L.).
- Сосенка водяная** (*Hippuris vulgaris* L.). Конехвостъ, Острожка, Перильцы (Смол.). Сосенка болотная, Сосенка (Яросл., Петр., Укр., Кален.), Хвощъ водяной, Хвостъ конскій, Хвостникъ обыкновенный, Хвостнякъ. Водяное многолѣтнее растение изъ семейства «онагриковыхъ» (*Onagraceae* Juss.), распространенное почти во всей Европѣ и почти во всей Россіи. Корневище ползучее; простой прямостоящій стебель достигаетъ до 1 арш. въ длину. Верхняя цвѣтоносная часть стебля выступаетъ надъ поверхностью воды. Линейные, цѣлюкрайніе листья собраны кольцами по 8—12 въ каждомъ кольцѣ. Очень мелкіе пазушные цвѣты состоятъ изъ едва замѣтной чашечки, одной тычинки и одногнѣздной завязи съ однимъ столбикомъ; лепестковъ нѣтъ. Цвѣтетъ съ іюня до августа. Растетъ въ стоячихъ и медленно текущихъ водахъ. (Рис. 288.)
- Сосенникъ**, см. Хвощъ полевой (*Equisetum arvense* L.).
- Соска** } см. Ленъ дикій (*Linaria vulgaris* Mill.).
- Соски** }
- Соски**, см. Жимолость обыкновенная (*Lonicera Xylosteum* L.).
- Сосна**, см. Сосна обыкновенная (*Pinus sylvestris* L.).
- Сосна австрійская**, см. Сосна черная (*Pinus austriaca* Tratt.).
- Сосна Ваймутова** (*Pinus Strobus* L.). Дерево изъ семейства «хвойныхъ» (*Coniferae* Juss.), родомъ изъ сѣверной Америки, достигающее у насъ рѣдко болѣе 10 сажень вышины. Молодые побѣги голые. Хвои тонкія, мягкія, свѣтло-зеленыя, собранныя по 5 въ каждомъ пучкѣ. Шишки цилиндрическія, по созрѣваніи съ оттопыренными чешуями. Стѣмена крылатыя. Цвѣтетъ въ маѣ и въ іюнѣ. У насъ разводится въ паркахъ.
- Сосна виргинская черная**, см. Сосна ладанная (*Pinus Taeda* L.).
- Сосна горная** (*Pinus montana* Mill.). Сланецъ сосновый. Невысокій кустарникъ изъ семейства «хвойныхъ» (*Coniferae* Juss.), распространенный въ горахъ южной и средней Европы, встрѣчающійся, по нѣкоторымъ наблюденіямъ, на Кавказѣ, съ распростертыми, дугобразно-приподнимающимися вѣтвями. Почка смолистая. Хвои ярко-зеленыя, сидятъ попарно или по три вмѣстѣ. Шишки блестящія. Горная сосна служитъ хорошею преградой противъ снѣжныхъ обваловъ. Древесина употребляется для рѣзныхъ издѣлій. (Рис. 289.)
- Сосна итальянская**, см. Сосна каменная (*Pinus Pinea* L.).
- Сосна калифорнская сѣхърная** (*Pinus Lambertiana* Dngl.). Произрастаетъ на сѣверѣ Калифорніи. Отличается своимъ снѣжато-сѣрыми, на концахъ зазубренными, хвоями. Зажженная древесина выделяетъ сахаристое вещество, которое индѣйцы употребляютъ въ пищу, какъ сахаръ.
- Сосна каменная** (*Pinus Pinea* L.). Кедръ итальянскій, Пинія, Сосна итальянская. Дерево изъ семейства «хвойныхъ» (*Coni-*

ferae Juss.), достигающее нѣсколькихъ саженъ вышины, съ красивой кроной наверху. Шишки нѣсколько конусообразной формы, загнуты назадъ. Сѣмена крылатыя. Произрастаетъ на югѣ Европы, въ Греціи и Италіи образуетъ цѣлые лѣса. Крупныя сѣмена, очень пріятныя на вкусъ, напоминающій миндаль, употребляются въ пищу, какъ лакомство, и составляютъ доходный предметъ торговли жителей Италіи и Греціи. Изъ нихъ-же добывается также масло. Ради выгодъ, доставляемыхъ сѣменами и древесиной, дерево культивируется и въ южномъ Тиролѣ. Сѣмена въ продажѣ называются у насъ «орѣшки» и продаются уже разбитыми.

Сосна карпатская, см. Кедръ сибирскій (*Pinus Cembra* L.).

Сосна ладанная (*Pinus Taeda* L.). Сосна виргинская черная. Произрастаетъ въ болотистыхъ странахъ Виргиніи. Шишки продолговато-конусообразныя, съ жесткими иглами. Доставляетъ американскій терпентинъ и смолу, известную въ торговлѣ подъ названіемъ «галлиота американскаго», или «барраса». Древесина служитъ, какъ подѣлочный матеріалъ. У насъ встрѣчается въ паркахъ.

Сосна обыкновенная (*Pinus silvestris* L.). Сосна, Сосонникъ, Осохарникъ, Осохарница, Борина (Вѣлор.), Мянда (въ Арх. губ., Мезенск. уѣзд. молоденькая сосна или ель), Манда—верхніе слои сосны; лѣсъ (Гротъ), Конга—сосновый рудовый лѣсъ. Хонга—сухая сосна. Хоножикъ—сухой соснякъ (Арханг., съ финск.), Хвалка (Гродн.), Хвоя (Полѣсье), Сухощенка, Лутица (Черн., Конспект.). Распустившійся цвѣтъ сосны, употребляемый въ пищу, называется Круняки (Перм.). Вѣчно-зеленое дерево, выпш. до 15 саженъ, изъ семейства «хвойныхъ» (*Coniferae* Juss.), распространенное въ сѣверной и средней Европѣ, образующее большіе лѣса въ сѣверной и средней Европѣ и въ Сибири, на Кавказѣ растетъ на горахъ; съ широкимъ сводообразнымъ шатромъ и кольцообразно расположенными главными вѣтвями; кора при основаніи ствола темно-бурая, а выше—красноватая. Почки не смолисты. Хвоя парны, длиною отъ 4—6 см. длины, жесткія, сизоватыя, въ поперечномъ разрѣзѣ полукруглыя. Цвѣты однодомныя. Мужскія соцвѣтія собраны въ плотныя колосовидныя соцвѣтія, сѣрно-желтаго цвѣта. Мужской цвѣтокъ имѣетъ видъ шишечки и состоитъ изъ стерженька, на которомъ сидятъ тычинки. Женскія соцвѣтія сидятъ по-одиночкѣ или попарно на концахъ молодыхъ побѣговъ и, разрастаясь, даютъ деревянистую шишку. Каждый цвѣтокъ въ женскомъ соцвѣтіи состоитъ изъ сѣменной чешуи, сидящей въ углу прицвѣтника и несущей при основаніи 2 личка, обращенныхъ сѣмязходомъ внизъ. Шишки конусовидныя, почти сидячія, зоникшія, чешуи на верхушкѣ съ ромбическимъ утолщеніемъ. Сѣмена снабжены крылышками и созрѣваютъ на третій годъ послѣ цвѣтенія. Цвѣтетъ въ маѣ и въ началѣ юня. Сосна доставляетъ хорошій подѣлочный матеріалъ и топливо; изъ древесины добываютъ смолу, скипидаръ, варъ, каннфоль; сажу и

т. п., а изъ хвой получается душистое эфирное масло (терпентинъ) и готовится сосновая шерсть. Въ Якутской области заболонъ служитъ главною пищею для значительной части якутовъ. (Табл. XIII, фиг. 244 и 245.)

МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНІЕ. Сосновыя шишки собираютъ въ началѣ весны въ ясную погоду и высушиваютъ въ легкой температурѣ, затѣмъ ихъ складываютъ въ стеклянный или покрытый бѣлой жестию сосудъ, въ которомъ онѣ могутъ храниться до слѣдующей весны. Изъ этихъ шишекъ готовится сиертная настойка; очень рѣдко, и то въ домашнемъ быту, изъ шишекъ вывариваютъ отваръ, который принимаютъ внутрь, какъ противовоспалительное средство при застарѣлыхъ сыпяхъ, хроническихъ воспаленіяхъ бронхъ съ обильнымъ отдѣленіемъ мокроты, при водянкѣ и ревматизмѣ; спаружи отваръ употребляютъ для инхалцій. Свѣжія сосновыя шишки—клеятъ отъ вытекающей изъ нихъ смолы, онѣ содержатъ въ себѣ смолу вмѣстѣ съ эфирнымъ масломъ, вкусъ ихъ горьковатый, запахъ смолисто-бальзамическій. Свѣжія иглы смолы содержатъ тѣ-же вещества и также служатъ для добыванія изъ нихъ соснового масла и экстракта. Эти-же иглы употребляются для ваннъ, помогающихъ отъ всевозможнаго рода золотушныхъ сыпей, припуханій суставовъ и нехуданія у дѣтей. Отъ 500 до 1500 граммъ (отъ 1¼ фунта до 4 фунтовъ) сосновыхъ иглъ кипятятъ въ 3-хъ—4-хъ бутылкахъ воды въ хорошо закрытомъ сосудѣ и процеживаютъ этотъ отваръ въ ванну температуры въ 26—27° по Реомюру; въ началѣ леченія больной остается въ ваннѣ минутъ 8—10, потомъ можетъ оставаться и дольше, минутъ 15 и 20. Такія ванны можно дѣлать ежедневно передъ обѣдомъ или вечернимъ чаемъ. Для людей, страдающихъ ревматизмомъ, полезна т. наз. лѣсная шерсть. Для этого свѣжія иглы сосны вымачиваютъ въ водѣ, съ нихъ сходитъ наружный плотный слой, остаются внутреннія эластическія нити, которыя собираютъ и высушиваютъ. Эти-то нити и образуютъ лѣсную шерсть. Ею набиваются тюфики или маленькія подушечки, которыми покрываютъ больные члены. Въ особенности такія подушечки рекомендуются въ домашнемъ быту для ревматиковъ и для людей, страдающихъ подагрой.

Изъ сосновыхъ иглъ готовятъ спиртную настойку: на 3 части молодыхъ сосновыхъ размятыхъ въ ступкѣ иглъ наливаютъ отъ 10-ти до 12-ти частей спирта, настой остается стоять 14 часовъ, послѣ чего его выжимаютъ и процеживаютъ. Принимается такая настойка 2—3 раза въ день по 3—4 капли.

Изъ сосновыхъ хлопковъ, а также и изъ иглъ, вываривается въ аптекахъ густой темный экстрактъ, который также въ большомъ употребленіи для ваннъ. На ванну кладутъ отъ 200—300 до 600 грам. (7 унцъ—10 ун. — до 17-ти унцъ) экстракта. Сосновое масло спаружи употребляется въ тѣхъ-же случаяхъ, какъ и скипидаръ. Внутри сосновое масло не принимаютъ.

Въ гомеопатіи изъ сока свѣжихъ весеннихъ побѣговъ вмѣстѣ со спиртомъ готовятъ настойку, которую даютъ какъ

внутри, такъ и употребляютъ снаружи для втираний отъ болей и какъ средство, помогающее отъ золотухи.

Кромѣ медицинскаго употребленія, дерево сосны идетъ на постройку, на горючій матеріалъ—дрова; сухою перегонкою изъ сосноваго дерева добывается деготь. Употребленіе дегтя обширно въ общежитіи и вѣсьмъ извѣстно. Кромѣ того, деготь употребляется и въ медицинѣ. Онъ идетъ въ различныя мази отъ хроническихъ сыпей, внутри его прописываютъ врачи ввидѣ пилюль отъ хроническаго заболѣванія легкихъ съ увеличеннымъ отдѣленіемъ изъ нихъ слизи и отъ чахотки легинхъ. Послѣ выпариванія дегтя остается густая темная масса, которая носитъ названіе смолы; она также иногда идетъ въ мази.

При паярѣзѣ дерева изъ него вытекаетъ сокъ, который по своимъ свойствамъ близко походитъ къ терпентину. Чер.зъ дистиллированіе этого сока получается особый видъ терпентиноваго масла, которое служитъ для втираний, а также принимается внутри отъ гипсовъ. Отъ дистилляціи остается вещество, которое идетъ на обработку скрипичной смолы—каифоли. Послѣ продолжительной обработки смолы получается свѣтлая, густая жидкость съ сильнымъ запахомъ—«к р е з о т ѣ». Креозотъ раздражаетъ кожу, онъ дѣйствуетъ возбуждающимъ образомъ на ткани и въ большихъ приемахъ употребляемъ быть не можетъ, такъ какъ ядовитъ. Принятый внутри онъ выдѣляется изъ организма отчасти почками, отчасти-же выдыхается легкими вмѣстѣ съ воздухомъ. Эта его способность пропитывать воздухъ, заключающійся въ легкихъ, а вмѣстѣ съ тѣмъ и въю ткань легкаго, и дѣйствовать на легочную ткань подобно вѣсьмъ бальзамическимъ веществамъ антисептически и дало врачамъ мысль давать чахоточнымъ больнымъ внутри креозотъ. Даютъ креозотъ въ эластическихъ капсуляхъ, вниѣ или молоко обязательно послѣ еды, чтобы креозотъ не попадалъ прямо на стѣнки желудка и не раздражалъ ихъ. Первые приемы креозота—1—2 капли; постепенно увеличивая приемъ, доходить до 10-ти—15-ти капель на приемъ или въ сутки до 30-ти—45-ти капель.

Кромѣ чахотки легкихъ, креозотъ полезенъ отъ хроническаго гнойнаго бронита и затянувшихся случаевъ, какъ катаррального, такъ и круповаго воспаленія легкихъ. Какъ сильное дезинфицирующее средство, креозотъ дается внутри отъ холеры, при этомъ его смѣшиваютъ съ слезнотыми жидкостями, какъ-то: съ отваромъ салена, алтейнаго корня или съ гумми-арабикомъ. Во многія зубныя капли входитъ креозотъ, но онъ дѣйствуетъ на нихъ очень сильно: зубы скоро начинаютъ крошиться.

Сосна приморская (*Pinus Pinaster Soland.*). По вѣншему виду походить на сосну обыкновенную; произрастаетъ на морскихъ берегахъ въ южной Европѣ, преимущественно во Франціи и Испаніи. Доставляетъ французскій, или бордосскій терпентинъ.

Сосна черная, или австрийская (*Pinus austriaca Traut.*). Похожа на сосну обыкновенную, отъ которой отличается темно-сѣрою

корой и болѣе темно-зелеными хвоями. Шишки вѣтви относительно шире, почти сидячія. Распространена, главнымъ образомъ, въ нижней Австрій, гдѣ иногда образуетъ или цѣлые сосновые лѣса, или-же встрѣчается вмѣстѣ съ лиственными породами деревьевъ. Доставляетъ общензвѣстный и употребляемый въ медицинѣ терпентинъ, получаемый изъ надрѣзовъ, производимыхъ на корѣ дерева. Въ остальномъ-же употребляется такъ-же, какъ и сосна обыкновенная (см. выше).

Сосновка, см. Сонъ (*Anemone Pulsatilla* L.).

Сосновникъ, см. Ленъ дикій (*Linaria vulgaris* Mill.).

Сосонка, см. Горичѣвъ весенній (*Adonis vernalis* L.).

Сосонка, см. Портулакъ огородный (*Portulaca oleracea* L.).

Сосонка полевая, см. Хвощъ полевой (*Equisetum arvense* L.).

Сосонникъ, см. Сосна обыкновенная (*Pinus silvestris* L.).

Сосонька, см. Ромашка обыкновенная (*Matricaria Chamomilla* L.).

Сосочки, см. Клеверъ луговой (*Trifolium pratense* L.).

Сосочки сладкіе, см. Зябра (*Galeopsis versicolor* L.).

Сосунчикъ, см. Клеверъ луговой (*Trifolium pratense* L.).

Сохатинная трава, см. Хвощъ полевой (*Equisetum arvense* L.).

Сочевица, см. Люцерна серповидная (*Medicago falcata* L.).

Сочевица, см. Чина весенняя (*Orobus vernus* L.).

Сончевица болотная, см. Ряска маленькая (*Lemma minor* Schl.).

Сончевица лѣсная, см. Чечевица волосистая (*Ervum hirsutum* L.).

Сочевица полевая, см. Чечевица обыкновенная (*Ervum Lens* L.).

Сочевица

Сочевичникъ } см. Чина весенняя (*Orobus vernus* L.).

Сояшникъ, см. Подсолнечникъ однолѣтній (*Helianthus annuus* L.).

Спаржа, см. Спаржа обыкновенная (*Asparagus officinalis* L.).

Спаржа обыкновенная (*Asparagus officinalis* L.). Аспарагъ, Асенокъ, Бирюльникъ (Сар., Астр.), Адамова борода (Каз.), Чертова борода (Кондр.), Козья борода (Черниг.), Дедева борода (Нижег.), Заячьи глазки, Сорочьи глаза (Тамб.), Конская грива (Урал.), Какушка (Мейрѣ), Какорожникъ (Астр.), Медвѣдка (Уф.), Катиполе (Орл.), Перекатиполе (Вор., Астр., Екат.), Перекатичникъ, Пестикъ (Вор.), Покатулъ, Покатичникъ (Даль), Клоповникъ (Нижег.), Громовой корень, Метелка (Уф.), Мухоморъ (Уф., Сарат.), Мухоморникъ (Урал.), Подчосъ, Подчосъ громовой, Підчосъ (Малор.), Разумъ бабій (Сам., Козл.), Спаржа, Спаржія (Нижег.), Шиарагы (Умань, съ пол.), Волчье сѣмя (Каш., Приарг. кр.), Холодокъ (Малор.), Холодецъ, Холодецъ, Холодокъ заячій, Холодецъ заячій, Ягоды бирючьи (Урал.), Ягоды волчьи, Ягоды журавлинныя, Шпинатъ. Многолѣтнее травянистое растение изъ семейства «лилейныхъ» (*Liliaceae* Dc.), распространенное въ средней и южной Европѣ, въ средней и южной Россіи и въ Сибири, выш. около 1½ арш. Корневище выпускаетъ большое количество корней и нѣсколько подземныхъ вертикальныхъ мясистыхъ побѣговъ («спаржа»), снабженныхъ чешуйчатыми листьями: при дальнѣйшемъ ростѣ каждый побѣгъ развивается

въ сильно-вѣтвистый подземный стебель съ мелкими чешуйчатыми листьями, въ углахъ которыхъ сидятъ пучки мягкихъ иглообразныхъ зеленыхъ вѣточекъ. Цвѣты мелкіе, двудомные, Околоцвѣтникъ колокольчатый, 6-тираздѣльный, зеленовато-желтый. Тычинокъ 6; завязь 3-хгнѣздная. Плодъ — красныя ягоды. Растетъ на лугахъ и между кустарниками. Цвѣтетъ лѣтомъ. Разводился на огородахъ, ради молодыхъ побѣговъ, употребляемыхъ въ пищу. Въ Воронежской губ. ягоды употребляютъ на отвѣвъ мухъ. (Табл. XLIII, фиг. 249 и 250.)

МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНІЕ. Корни и молодые побѣги спаржи содержатъ въ себѣ желтую смолу, экстрактивные вещества, соли и бѣлокъ. Какъ корни, такъ и молодые побѣги, принятые съ пищею, увеличиваютъ дѣятельность почекъ и дѣйствуютъ успокоивающимъ образомъ на сердечную дѣятельность. Въ прежніе годы они давались врачами отъ различнаго рода сыпей, отъ водянки, параличнаго состоянія мочевого пузыря, болѣзней сердца и др. Въ настоящее время спаржа употребляется только въ пищу и дѣйствуетъ такъ-же, увеличивая отдѣленіе мочи и давая ей особый запахъ.

Спаржія, см. Спаржа обыкновенная (*Asparagus officinalis* L.).
Спирусъ (*Nisandra physaloides* Gärtn.). Адамова голова (Бердянск., Сред.), Лумпина (Полт.). Однолѣтнее травянистое растение изъ семейства «пасленовыхъ» (*Solanaceae* Juss.), родомъ изъ Перу въ Южной Америкѣ, встрѣчается иногда въ западной и юго-западной Россіи. Стебель вѣтвистый, съ гранистыми вѣтвями; листья спирально-расположенные, яйцевидные, выемчато-зубчатые; голубоватые цвѣты одиночные, въ развилкахъ стебля, поникающіе и супротивные листьямъ. Чашечка вздутъ-колокольчатая, 5-тигранная, до середины 5-тилопастная, съ острыми при основаніи стрѣловидными составными частями. Вѣнчикъ колокольчатый, неглубоко-5-лопастный, довольно крупный, голубоватый, при основаніи бѣловатый. Тычинокъ 5, прикрѣпленныхъ нитями къ трубчкѣ вѣнчика, почти параллельныхъ между собою; пыльники раскрываются продольными щелями. Завязь верхняя свободная, съ однимъ столбикомъ. Плодъ—сухая 3—5-тигнѣздная ягода, разрывающаяся неправильно и окруженная разросшеюся чашечкой. Цвѣтетъ лѣтомъ. Встрѣчается на сорныхъ мѣстахъ.

Сплавникъ, см. Гречиха земноводная (*Polygonum amphibium* L.).

Сплоень, см. Лисичка (*Cantharellus cibarius* Fr.).

Сплотникъ, см. Рута дикая (*Peganum Harmala* L.).

Сплюлиетъ, см. Астрagalъ солодколистный (*Astragalus glycyphylus* L.).

Спонка, см. Подмаренникъ цѣлкій (*Galium Aparine* L.).

Спорижъ, см. Гречиха птичья (*Polygonum aviculare* L.).

Спорина } см. Спорынья (*Sclerotium Clavus* Dc.).

Споринья }

Спорички, см. Смородина красная (*Ribes rubrum* L.).

Споръ, см. Спорынья (*Sclerotium Clavus* Dc.).

Спорышникъ, см. Гречиха птичья (*Polygonum aviculare* L.).

Спорышникъ, см. Клеверъ нашенный, или кошачій (*Trifolium arvense* L.).

Спорышъ, см. Гречиха птичья (*Polygonum aviculare* L.).

Спорышъ, см. Спорынья (*Sclerotium Clavus* De.).

Спорышъ береговой, см. Горчакъ (*Polygonum Persicaria* L.).

Спорышъ водяной, см. Вутерлакъ обыкновенный (*Portula* L.).

Спорынь, см. Спорынья (*Sclerotium Clavus* De.).

Спорынья (*Sclerotium Clavus* De.). Фармацевтическое название: *Fungus Secalis*, *Secale cormitum*, *Clavus secalinus*. *Secale clavatum* s. *corniculatum*, s. *luxurians*, *Mater Secalis*, *Orga*. Барашки ржаные (Кост.), Бодинки (Даль, I, 325.), Гиттушка ниврослей (Заг.), Кукушки (Каз.), Ржапець (Вор.), Ржица (Курск.), Рожки, Рожки житны (Волг., Подол.), Рожки черные (вездѣ) и изм. Овражекъ (Пск., Твер.), Пирожки черны (Малор.), Споръ (Умань), Спорынья (вездѣ), Споринья (Малор.), Спорина (Пск.), Спорынь (Вор.), Спорышъ (Малор.), Ужь (Вятск.). Грибъ изъ семейства «сумчатыхъ грибовъ» (*Ascomycetes*), извѣстный въ видѣ черныхъ рожковъ, образующихся нерѣдко, вмѣсто зеренъ, на колосьяхъ ржи и другихъ злаковъ. Грибъ появляется первоначально на молодой завязи, которую пронизываетъ своими нитями, не давая ей развиваться. На поверхности завязи грибныя нити выделяютъ въ большомъ числѣ мелкія споры, которыя отщипуровываются съ концовъ нитей (конидіи). Въ то-же время выделяется сладкій сокъ (медвяная роса), привлекающій жуковъ, которые переносятъ споры, а, слѣдовательно, и заразу на другіе колосья. Проникая глубже, грибныя нити постепенно совершенно разрушаютъ завязь, и, плотно сплетаясь между собою, порождаютъ на мѣстѣ зерна такъ называемый рожокъ (склеротій)—продолговатое черное тѣло. снаружи черного, внутри бѣлаго цвѣта, которое обыкновенно длиннѣе зеренъ и потому торчитъ изъ колоса. Рожокъ этотъ вовсе не плодъ гриба и не заключаетъ никакихъ споръ. Весной на сырой землѣ изъ рожка выростають красноватые грибочки въ видѣ ножекъ съ пуговкой на концѣ; пуговка покрыта мелкими отверстиями, и каждое ведетъ въ грушевидную полость, на днѣ которой сплѣтъ въ большомъ числѣ длинныхъ, узкихъ сумки, а въ каждой сумкѣ находится по восьми споръ нитевидной формы. Нитевидныя споры, выброшенныя изъ сумокъ и разносимыя вѣтромъ, заражаютъ молодые завязи злаковъ, порождая новую спорыню. Рожки ядовиты, и значительная примѣсь ихъ въ хлѣбъ вызываетъ болѣзнь.

МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНІЕ. Спорынья, или, какъ ее называютъ еще, маточныя рожки, содержитъ въ себѣ жирное масло и ядовитое вещество, извѣстное подъ именемъ эрготина. Эрготинъ обладаетъ свойствомъ, попадая черезъ кровь въ ткани, дѣйствовать на гладкія мышечныя волокна раздражающимъ образомъ, заставляя ихъ сокращаться. Въ особенности рѣзко влияніе

маточныхъ рожковъ сказывается на сокращеніи матки, почему они и назначаются врачами при простыхъ и послѣродовыхъ кровотеченияхъ изъ матки и при обильномъ отдѣленіи слизи изъ матки; кромѣ того, такъ какъ маточные рожки имѣютъ способность сжимать мышечныя волокна и въ сосудахъ, то ихъ даютъ и при кровотеченияхъ изъ другихъ органовъ, напр. при легочномъ кровотеченіи и при кишечномъ. Спорышью даютъ ввидѣ отвара или въ порошкѣ. Но ввиду того, что она ядовита, употребленіе ея можетъ быть разрѣшено только по совѣту и подъ наблюденіемъ врача.

Фармичнымъ путемъ добываемый эрготинъ, носящій различныя названія по имени его изобрѣтателя, дѣйствуетъ гораздо сильнѣе, потому принимается въ меньшемъ количествѣ. Во многихъ случаяхъ кровотеченій врачи употребляютъ эрготинъ для подкожныхъ впрыскиваній.

Если спорышъ произрастаетъ въ большомъ количествѣ на ржи, она можетъ отравить хлебъ. Хлебъ, отравленный спорышью, очень вреденъ. У людей появляются страшная слабость, языкъ сохнетъ, покрывается корой, въ животѣ дѣлаются сильныя боли, конечности холодѣютъ вследствие судорожнаго сокращенія периферическихъ сосудовъ, и это прекращеніе питанія сосудовъ конечностей можетъ повести за собою ихъ омертвѣніе, гангрену; въ произвольныхъ мышцахъ туловища дѣлаются судороги, и болѣзнь можетъ окончиться смертью.

Въ гомеопатіи маточные рожки употребляются не только послѣ родовъ, какъ кровоостанавливающее средство, но также при склонности къ такъ называемымъ привычнымъ выкидышамъ; кромѣ того, въ гомеопатіи даютъ спорышью отъ носовыхъ кровотеченій, отъ труднаго пользованія зубомъ и отъ п. носомъ.

Спотыказъ, см. Люцерна серповидная (*Medicago falcata* L.).

Спрыгъ, см. Иванъ-чай (*Epilobium angustifolium* L.).

Спрычъ, см. Суменица болотная (*Gnaphalium uliginosum* L.).

Сеиха, см. Еринкъ обыкновенный (*Empetrum nigrum* L.).

Сеъчъ конскій, см. Щавель рѣчной (*Rumex Hydrolapathum* Huds.).

Стагачка, см. Фіалка ночная (*Platanthera bifolia* L.).

Стагачка, см. Стагачка болотная (*Malaxis paludosa* Sw.).

Стагачка болотная (*Malaxis paludosa* Sw.). Нѣжная многолѣтняя травка изъ семейства «орхидныхъ» (*Orchideae* Juss.), распространенная въ сѣверной и средней Европѣ, въ сѣверной, средней и юго-западной Россіи. Корневникъ образуетъ надъ землею маленький клубень; стебель 5-ти гранный, съ 3—4 яйцевидными или продолговатыми прикорневыми листьями. Мелкіе, зеленоватые цвѣты собраны рыхлою кистью. Лепестковидный околоцвѣтникъ состоитъ изъ 3 наружныхъ продолговато-яйцевидныхъ, болѣе крупныхъ, и 3 внутреннихъ менѣе крупныхъ листочковъ. Одинъ изъ послѣднихъ, отличающійся своею формою, образуетъ вогнутую, яйцевидную, при основаніи сердце-

видную губу, обращенную вверхъ. Тычинокъ одна; нить ея сростается съ столбикомъ завязи въ одну колонку, образуя такъ называемый гиностелій. Завязь нижняя, одногнѣздная; рыльце находится на колонкѣ подъ пыльникомъ. Пыльникъ 2-гнѣздный, половинки его гнѣзды лежатъ одна надъ другой; пыльцевыя массы воскообразныя. Плодъ—коробочка. Цвѣтетъ во второй половинѣ лѣта. Растетъ на торфяныхъ болотахъ. (Рис. 290.)

Стаканчики, см. Ленъ дикій (*Linaria vulgaris* Mill.).

Стальникъ, см. Стальникъ пахучій (*Ononis hircina* Jacq.).

Стальникъ пахучій (*Ononis hircina* Jacq.). Бояръ-зелье (Под.), Волчугъ (Екат.), Вовчугъ (Малор.), Волчужникъ (Екат.), Бычачья трава или Воловья трава, Колосовая трава, Выхляникъ (Екат.), Ганяйденисъ, Денисникъ, Зеленица, Кельшиникъ, Кенишникъ, Хелишникъ, Кенишникъ, Козлишникъ вонючій Плугодержка, Рвотная трава, Стальникъ. Царь-зелье (Бесс.), Шелестунъ, Яглица (Полт.). Невысокій (выш. 7—14 вершк.) полукустарникъ изъ семейства «мотыльковыхъ» (*Papilionaceae* L.), распространенный почти во всей Европѣ, въ средней и южной Россіи, въ Сибири и Туркестанѣ. Стебель разветвленный, приподнимающийся, железисто-волосистый. Въ сухихъ мѣстностяхъ вѣтви часто оканчиваются колючкой. Листья тройчатые, верхніе—цѣльные, очередные. Цвѣты розовые, вонючіе, парные, въ углахъ листьевъ, собранные на концахъ стеблей и вѣтвей густыми колосообразными соцветіями. Чашечка глубоко-5-тинадѣзная, съ почти одинаковыми надѣвами. Вѣнчикъ мотыльковый, 5-тилепестный. Два сросшіеся лепестка образуютъ клювообразно-заостренную лодочку. Тычинокъ 10, однобратственныхъ (въ сросшіеся нитями). Пыльники поочередно одни короче и качающіеся, другіе—длинные, приросшіе къ расширеннымъ наверху нитямъ. Плодъ—железисто-мохнатыя, яйцевидныя бобы, короче чашечки, съ 2-4 мелкобугорчатыми сѣменами. Цвѣтетъ съ іюня до сентября. Растетъ на опушкѣ лѣсовъ, холмахъ и лугахъ. Въ молодомъ возрастѣ охотно поѣдается скотомъ. (Табл. XLIII, фиг. 248.)

МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНІЕ. Растеніе извѣстно только въ народной медицинѣ. Оно обладаетъ мочегоннымъ дѣйствіемъ. Отваръ корня и корки въ винѣ служитъ, какъ мочегонное средство, отъ водянки, также употребляется отъ катарра мочевого пузыря и каменной болѣзни, отъ ломоты, ревматизма, отъ головной боли и падучей болѣзни.

Становникъ, см. Зимолюбка зонтичная (*Chimaphila umbellata* Nutt.).

Становникъ, см. Вероника лекарственная (*Veronica officinalis* L.).

Старина, см. Желтуха (*Senecio Jacobea* L.).

Старина, см. Крестовникъ обыкновенный (*Senecio vulgaris* L.).

Старица, см. Боровикъ блѣдцвѣтный (*Verbascum Lychnitis* L.).

Старовина, см. Норичникъ узловатый (*Scrophularia nodosa* L.).

Старовина, см. Чистотѣль большой (*Chelidonium majus* L.).

Стародубка, см. Горечавка крупная (*Gentiana Parnassianthe* L.).

Стародубка, см. Морозникъ бѣлоцвѣтный (*Helleborus niger* L.).

Стародубка, см. Горипцвѣтъ весенній (*Adonis vernalis* L.).

Стародубка (*Gentiana Amarella* L.). Фармацевтическое названіе: *Gentianella* s. *Gentiana autumnalis*. Бѣлая душица (Новг.), Звѣробой женскій, Колтунникъ (Мог.), Конь-трава (Ниж.), Норичная трава, Норышная трава (Вятск.), Ноздря лазоревая или Ноздрякъ-трава, Тирличъ, Тирличъ трава, Тронникъ (Волог. губ., Никол. у., Пот.), Трава бѣшеная, Уразница (Волог.). Однолѣтнее травянистое растеніе ихъ семейства «горечавковыхъ» (*Gentianeae* Juss.), распространенное въ сѣверной и средней Европѣ, въ средней, юго-западной и сѣверной Россіи. Стебель прямой, вѣтвистый, съ вверху-обращенными вѣтвями; нижніе листья продолговато-обратно-яйцевидные, къ основанію суженные; стеблевые—ланцетные, сидячіе, съ широкимъ основаніемъ, верхніе—острые; лиловые, довольно мелкіе цвѣты, рѣдко одиночные, обыкновенно въ полусонтикахъ, собранныхъ на концахъ вѣтвей и стебля, а также въ углахъ листьевъ, узкимъ пирамидальнымъ соцвѣтіемъ; чашечка до середины 5-тираздѣльная; вѣнчикъ трубчато-ворончатый, съ 5-тираздѣльнымъ отгибомъ, лиловый, рѣдко желтоватый. Тычинокъ 5, прикрѣпленныхъ нитями къ трубчатымъ вѣнчика. Завязь верхняя, одногнѣздная, съ простымъ столбикомъ съ 2-хлопастнымъ, почти сидячимъ рыльцемъ. Плодъ—продолговато-ланцетная коробочка, раскрывающаяся по швамъ на 2 створки. Цвѣтетъ лѣтомъ. Растетъ на лугахъ, изрѣдка въ росяхъ.

МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНІЕ. Прежде растеніе употреблялось въ медицину, теперь оставлено. Въ народѣ изрѣдка употребляютъ. Такъ, въ Вологодской губ. крестьяне кладутъ его въ кормъ лошадамъ отъ кашля.

Стародубъ, см. Чистотѣль большой (*Chelidonium majus* L.).

Стародубъ, см. Дягиль лѣсной (*Angelica silvestris* L.)

Стародубъ, см. Гладышъ широколистный (*Laserpitium latifolium* L.).

Стародубъ, см. Горипцвѣтъ весенній (*Adonis vernalis* L.).

Старчикъ, см. Кокушникъ (*Gymnadenia conopsea* Rich.).

Статушки, см. Фалка ночная (*Platanthera bifolia* Peich.).

Стебловый цвѣтъ, см. Купырь лѣсной (*Anthriscus silvestris* Hoffm.).

Стебель сладкій, см. Дягиль лѣсной (*Angelica silvestris* L.).

Стебель } см. Пастернакъ огородный (*Pastinaca sativa* L.).

Стебельникъ, см. Дягиль лѣсной (*Angelica silvestris* L.)

Стебельникъ ядовитый, см. Болиголовъ крапчатый (*Conium maculatum* L.).

Стебля, см. Купырь лѣсной (*Anthriscus silvestris* Hoffm.).

Стеворомъ полевой, см. Подмаренникъ желтый (*Gallium verum* L.).

Стебель гусій, см. Волчокъ (*Phelipaea ramosa* C. A.).

Стебель гусья трава, см. Заразиха красноватая (*Orobanchе rubens* L.).

Стебель лѣтній, см. Волчокъ (*Phelypaea ramosa* С. А.).

Стебѣ

Стебѣ луговой } см. Тимофеевка (*Phleum pratense* L.).

Степанова трава, см. Колдунъ-трава (*Circaea lutetiana* L.).

Степельникъ, см. Колокольчикъ раскидистый (*Campanula patula* L.).

Степникъ, см. Иванъ-чай (*Epilobium angustifolium* L.).

Степчина, см. Ковыль перистый (*Stipa pennata* L.).

Степчина, см. Ковыль волосистый (*Stipa capillata* L.).

Степъ, см. Тимофеевка (*Phleum pratense* L.).

Стердюшка, см. Подмаренникъ сѣверный (*Galium boreale* L.).

Стецъ кобылій, см. Подорожникъ большой (*Plantago major* L.).

Стецъ кобылій, см. Подорожникъ ланцетный (*Plantago lanceolata* L.).

Стигнѣчки, см. Первоцвѣтъ лекарственный (*Primula officinalis* Jacq.).

Стикта, см. Мохъ легочный (*Sticta pulmonaria* Hoffm.).

Стиктина лѣная (*Stictina silvatica* Stein.). Лишай съ кожатымъ, листовиднымъ, развѣтвленнымъ росткомъ, сверху темно-зеленымъ, снизу темнымъ, покрытымъ густымъ войлокомъ и усѣяннымъ маленькими ямками. Встрѣчается на корѣ деревьей, рѣже на утесахъ, главнымъ образомъ—на горахъ.

Стираксовое дерево (*Styrax officinalis* L.). Высокое дерево, произрастающее на югѣ Европы у Средиземнаго моря, преимущественно въ Греціи и на Востокѣ. Посредствомъ надрѣзовъ на стволѣ получается смола «стиракса», составляющая предметъ торговли.

МЕДИЦИННОЕ УПОТРЕБЛЕНІЕ. Обыкновенный стираксъ представляется ввидѣ крупнаго порошка, слипающагося въ комки различной величины, пріятнаго запаха. Составныя части стиракса: смола, душистое масло и бензойная кислота. Стираксъ въ ряду другихъ бальзамическихъ веществъ дѣйствуетъ слегка раздражающимъ образомъ на слизистыя оболочки, прежними врачами давался внутрь, въ особенности при хроническихъ страданіяхъ легкихъ, въ настоящее время онъ употребляется только снаружи и то рѣдко. Онъ входитъ въ составъ разныхъ курительныхъ порошковъ и свѣчекъ.

Стишокъ, см. Горошекъ мышиный (*Vicia Cracca* L.).

Стогачка, см. Фіалка ночная (*Platanthera bifolia* Rich.).

Стоглавъ-трава, см. Синеголовникъ равнинный (*Eryngium campestre* L.).

Стоголовникъ, см. Кардобенедиктъ (*Cnicus benedictus* Gärtn.).

Стоголовникъ, см. Качимъ стѣнной (*Gypsophila paniculata* Led.).

Стоголовникъ, см. Тысячеголовъ (*Saponaria Vaccaria* L.).

Стоголовникъ, см. Короставникъ полевой (*Scabiosa arvensis* L.).

- Стоголовникъ**, см. Трава пурпуровая солнцевая (*Scorzonera purpurea* L.).
- Стоголовникъ**, см. Хлопушка (*Silene inflata* Smith.).
- Стожильникъ**, см. Жгунъ-корень ядовитый (*Cnidium venosum* Lach.).
- Стоколосникъ**, см. Костеръ ржаной (*Bromus secalinus* L.).
- Стоколосъ**, см. Костеръ ржаной (*Bromus secalinus* L.).
- Стоколосъ**, см. Костеръ мягкій (*Bromus mollis* L.).
- Стоколосъ**, см. Ежа сборная (*Dactylis glomerata* L.).
- Стоколѣнецъ**, см. Герань болотная (*Geranium palustre* L.).
- Стоколѣнникъ**, см. Герань кроваво-красная (*Geranium sanguineum* L.).
- Стократка**, см. Кошачьи лапки (*Antennaria dioica* Gaertn.).
- Стократка**
- Стократки** } см. Маргаритка многолѣтняя (*Bellis perennis* L.).
- Стократъ-трава** }
- Стократъ**
- Столбецъ болотный**, см. Хвощъ лѣсной (*Equisetum silvaticum* L.).
- Столбики**, см. Щавель обыкновенный, или кислый (*Rumex acetosa* L.).
- Столбики синіе**, см. Живучка ползучая (*Ajuga reptans* L.).
- Столбики собачьи**, см. Горлецъ, раковая шейка (*Polygonum Bistorta* L.).
- Столбичекъ**, см. Хвощъ полевой (*Equisetum arvense* L.).
- Столбунцы**, см. Щавель обыкновенный, или кислый (*Rumex acetosa* L.).
- Столбцы боробинные, или вороньи**, см. Лебеда татарская (*Atriplex patula* L.).
- Столиственница** } см. Синюха обыкновенная (*Polemonium*
- Столистникъ** } *coeruleum* L.).
- Столистникъ**, см. Гусиная лапка (*Potentilla anserina* L.).
- Столѣтникъ**, см. Агава (*Agave americana* L.).
- Стоновникъ**, см. Грушанка малая (*Pirola minor* L.).
- Стоноговецъ**, см. Стоножникъ обыкновенный (*Scolopendrium officinarum* Sw.).
- Стоногъ**, см. Мятликъ лѣсной (*Poa nemoralis* L.).
- Стоногъ**, см. Мятликъ обыкновенный (*Poa trivialis* L.).
- Стоногъ** } см. Стоножникъ обыкновенный (*Scolopendrium*
- Стоножникъ** } *officinarum* Sw.).
- Стоножникъ женскій**, см. Кочедыжникъ обыкновенный (*Aspidium Filix femina* Sw.).
- Стоножникъ обыкновенный** (*Scolopendrium officinarum* Sw.).
- Многолѣтнее папоротниковое растение изъ семейства «полиподіевыхъ» (*Polypodiaceae* R. Br.), распространенное, главнымъ образомъ, въ Крыму и на Кавказѣ, въ южной Европѣ, Алжирѣ, Азии и Сѣверной Америкѣ. Листья ланцетовидные, при основаніи сердцевидные, цѣльно-крайніе, 3—10 вершк. длины. Спорангіи (т.-е., вмѣстѣлища со спорами) въ продолговатыхъ кучкахъ,

расположенныхъ въ два ряда по обѣ стороны главнаго нерва и сближенныхъ попарно на соседнихъ боковыхъ нервахъ. Часто разводится въ садахъ, гдѣ образовалось нѣсколько разновидностей съ курчавыми листьями.

МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНІЕ. Прежде растеніе употреблялось въ медицинѣ, какъ хорошее средство отъ кашля, при страданіи селезенки и мочевого пузыря, какъ средство, дѣйствующее мочегонно. Въ Буковинѣ это—излюбленное народное средство отъ болѣзней легкихъ; изъ листьевъ его готовятъ отваръ на водѣ, или листья настаиваютъ на водкѣ.

Стопа медвѣжья, см. Борщевикъ обыкновенный (*Heracleum Sphondylium* L.).

Сторожникъ, см. Чертополохъ полевой (*Cirsium arvense* Scop.).

Сторчець смольный, см. Фиалка ночная (*Platanthera bifolia* Rich.).

Сторчикъ, см. Ласточникъ обыкновенный (*Vincetoxicum officinale* Moench.).

Стотонъ-трава, см. Дягиль лѣсной (*Angelica silvestris* L.).

Стоузелникъ, см. Хвойникъ обыкновенный (*Ephedra vulgaris* Rich.).

Стоцвѣтъ, см. Ромашка римская (*Anthemis nobilis* L.).

Стоцвѣтъ, см. Маргаритка обыкновенная (*Bellis perennis* L.).

Стоцвѣтъ, см. Поповникъ обыкновенный (*Chrysanthemum Leucanthemum* L.).

Стоянъ, см. Валеріана лекарственная (*Valeriana officinalis* L.).

Стракива, см. Крапива двудомная, или болыная (*Urtica dioica* L.).

Страхополохъ, см. Колокольчикъ сборный (*Campanula glomerata* L.).

Страхополохъ, см. Серпуха красильная (*Serratula tinctoria* L.).

Страхополохъ, см. Дурнишникъ колючій (*Xanthium spinosum* L.).

Стрежней, см. Полѣска многолѣтняя (*Mercurialis perennis* L.).

Стрекава, см. Крапива мелкая, или жгучая (*Urtica urens* L.).

Стрекава } см. Крапива двудомная (*Urtica dioica* L.).

Стрекавица } см. Крапива мелкая, или жгучая (*Urtica urens* L.).

Стрекавка } см. Крапива двудомная (*Urtica dioica* L.).

Стрекава } см. Крапива двудомная (*Urtica dioica* L.).

Стрекива } см. Крапива двудомная (*Urtica dioica* L.).

Стрекива, см. Крапива мелкая, или жгучая (*Urtica urens* L.).

Стрекунъ, см. Лужайникъ водяной (*Limosella aquatica* L.).

Стрекучка, см. Крапива двудомная (*Urtica dioica* L.).

Стрекучка, см. Крапива мелкая, или жгучая (*Urtica urens* L.).

Стрелина, см. Рута дикая (*Reganium Harmala* L.).

Стржемелина, см. Бересклетъ бородавчатый (*Evonymus verrucosus* L.).

Стрикунъ, см. Лужайникъ водяной (*Limosella aquatica* L.).

Стрикуша, см. Медовникъ (*Galeopsis Tetralix* L.).

- Стрѣла водяная** } см. Стрѣлолистъ обыкновенный (*Sagittaria*
Стрѣла водяна } *sagittaeifolia* L.).
Стрѣлица
Стрѣлки
Стрѣлки, см. Череда трехраздѣльная (*Bidens tripartita* L.).
Стройокъ, см. Бѣлый грибъ (*Boletus edulis* Bull.).
Стропета полевая, см. Василекъ луговой (*Centaurea Jacea* L.).
Строчокъ (*Helvella esculenta* Pers.). Бабура, Бабуръ, Сморчокъ (Собол.), Пестрина, Пестреничка, Торчокъ. Грибъ изъ семейства «дискомицетовъ» (*Discomicetes*), отличающійся отъ сморчка (опис. см. выше) тѣмъ, что шляпка темно-бураго цвѣта, неправильной, курчавой или лопастной формы. Встрѣчается въ лѣсахъ, главнымъ образомъ, на песчаной почвѣ. Считается нѣсколько ядовитымъ, но, промытый въ чистой водѣ, становится безвреднымъ и съѣдобнымъ. (Т а б л. XII, ф и г. 241.)
Стругъ, см. Эспарсетъ кормовой (*Onobrychis sativa* Lam.).
Струекъ, см. Желтушникъ левкойный (*Erysimum cheiranthoides* L.).
Струекъ, см. Гулявникъ струйчатый (*Sisymbrium Sophia* L.).
Струень } см. Бѣлый грибъ (*Boletus edulis* Bull.).
Струйокъ }
Струки, см. Хвощъ полевой (*Equisetum arvense* L.).
Стручекъ астраханскій, см. Перець стручковый (*Capsicum annuum* L.).
Стручечникъ, см. Желтоцвѣтъ пахучій (*Barbarea vulgaris* R. Br.).
Стручечникъ } см. Ласточникъ обыкновенный (*Vincetoxicum*
Стручки } *officinale* Moench.).
Стручки боровые, см. Люцерна серповидная (*Medicago falcata* L.).
Стручки воробьиные } см. Горошекъ мышиный (*Vicia Cracca*
Стручки галочки } *sa* L.).
Стручки горобячи, см. Истодъ хохлатый (*Polygala comosa* Schk.).
Стручки горькіе, см. Желтушникъ левкойный (*Erysimum cheiranthoides* L.).
Стручки лѣсовые, см. Горошекъ мышиный (*Vicia Cracca* L.).
Стручки молочные, см. Ласточникъ обыкновенный (*Vincetoxicum officinale* Moench.).
Стручки мышиные, см. Дрокъ красильный (*Genista tinctoria* L.).
Стручки мыши, см. Вязель разноцвѣтный (*Coronilla varia* L.).
Стручки сладкіе, см. Стручки цареградскіе (*Ceratonia siliqua* L.).
Стручки сороцьи, см. Дрокъ красильный (*Genista tinctoria* L.).
Стручки цареградскіе (*Ceratonia siliqua* L.). Хлѣбъ Ивановъ трава, Рожечникъ, Рожки, Рожки сахарные или Стручки сладкіе, Дивій медъ, Дивій хлѣбъ, Рожцы (Слав.), Рожки (Ев. Лук. XV, 16). Дерево съ парно-перистыми, вѣчно зелеными листьями, произрастающее у Средиземнаго моря. Плоды, имѣющіе видъ длинныхъ стручковъ, прежде употреблялись въ медицинѣ,

нынѣ-же только какъ лакомство. Они содержатъ большее количество сахарнаго вещества, которое получается при выжиманіи плодовъ видѣ сладкаго сока и употребляется, подобно меду и сахару, для обсахариванія фруктовъ. Выжимки употребляются на кормъ скоту. Сѣмена употребляются, какъ суррогатъ кофе; они-же прежде служили сдвигачей вѣса для драгоценныхъ камней, которая называлась каратомъ. (По-гречески плодъ наз. кератъ). Преданіе говорить, что св. Іоаннъ Предтеча питался въ пустынѣ плодами этого растенія, откуда и названіе «Хлѣбъ св. Іоанна», «Дивнѣ медъ».

МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНІЕ. Кожура, снятая съ сѣмянъ растенія, входитъ въ составъ многихъ грудныхъ сборовъ, какъ легкое мягчительное средство.

Стручковая трава } см. Ласточникъ обыкновенный (Vince-
Стручковатое зелье } toxicum officinale Moench.).
Стручная трава }

Стручья воробьиные, см. Ледвенецъ рогатый (Lotus corniculatus L.).

Стручья журавлиные, см. Девясилъ иволжистый (Inula salicina L.).

Стручья журавлиные, см. Чина луговая (Lathyrus pratensis L.).

Стрѣла, см. Вахта трилистная (Menyanthes trifoliata L.).

Стрѣла водяная } см. Стрѣлолистъ обыкновенный (Sagittaria

Стрѣла совиная } sagittaeifolia L.).

Стрѣла совиная, см. Кровохлебка лекарственная (Sanguisorba officinalis L.).

Стрѣла совыя, см. Бедренецъ большой (Pimpinella magna L.).

Стрѣла совыя, см. Черноголовникъ кровохлебковый (Poterium Sanguisorba L.).

Стрѣла совыя, см. Кровохлебка лекарственная (Sanguisorba officinalis L.).

Стрѣла трава } см. Стрѣлолистъ обыкновенный (Sa-

Стрѣла трава меньшая } gitaria sagittaeifolia L.).

Стрелебтая, см. Пузырникъ обыкновенный (Leonurus Cardiac L.).

Стрѣдецъ-трава, см. Чина луговая (Lathyrus pratensis L.).

Стрѣлешникъ, см. Лукъ обыкновенный (Allium Cepa L.).

Стрѣлица, см. Стрѣлолистъ обыкновенный (Sagittaria sagittaeifolia L.).

Стрѣлки, см. Череда трехраздѣльная (Bidens tripartita L.).

Стрѣлки, см. Пастушья сумка (Capsella Bursa pastoris Moench.).

Стрѣлки, см. Девясилъ иволжистый (Inula salicina L.).

Стрѣлолистъ, см. Стрѣлолистъ обыкновенный (Sagittaria sagittaeifolia L.).

Стрѣлолистъ обыкновенный (Sagittaria sagittaeifolia L.). Фармацевтическое назв.: Sagittaria, s. Plantago aquatica (Radix et Herba). Батланъ (южн. Рос.), Батланчикъ, Батлочки (Астрах.), Болотникъ (Тверск.), Гусятникъ (Сар.), Козлы, Козли (Малор.), Човникъ (Малор.), Стрѣла трава, Стрѣла меньшая трава, Стрѣла водяная, Стрѣла водина, Стрѣлица (Малор.), Стрѣлица, Стрѣль-

ница, Стрѣлка (Малор.), Стрѣла совиная, Стрѣлолистникъ, Щучная трава, Умница (назв. общ. съ *Alisma Plantago*, *Butomus umbell.* *Menyanthes trif.* вследствие некотораго сходства по мѣсту произростаіи:—Баттаникъ, Вахта, Вахта желтая, Ягушечникъ болотный (Нижег.), Ягушечья трава (Влад.), Шильникъ желтый (Новор.), Бабка водная, Жеруха (Гамб., Саратов.). Пчауль (Нижег.), Языкъ земельный). Многолѣтняя трава изъ семейства «частуховыхъ» (*Alismaceae* Juss.), распространенная почти во всей Европѣ и обыкновенная въ Россіи. Стебель безлиственный, выш. 7 верш. до 2 аршинъ, 3-хгранный. Листья прикорневые, длинно-черешковые. Выступающіе изъ воды листья стрѣловидные, а погруженные въ воду—узкіе, ланцетные. Цвѣты однодомные, расположены мутовчатой кистью; верхняя часть соцветія состоитъ изъ тычиночныхъ цвѣтвъ, нижняя—изъ пестичныхъ. Чашечка 3-хлиственная, остающаяся. Вѣнчикъ 3-хлепестный, бѣлый, при основаніи темно-пурпуровый; тычинки многочисленныя; пестикъ состоитъ изъ многихъ плодolistиковъ, а плодъ—изъ многочисленныхъ сѣмянокъ, собранныхъ шарообразными головками и снабженныхъ короткими носикомъ. Растетъ въ стоячихъ водахъ и при берегахъ. Цвѣтетъ лѣтомъ.

Стрѣлолистникъ, см. Стрѣлолистъ обыкновенный (*Sagittaria sagittaeifolia* L.).

Стрѣльная, см. Соль-трава (*Anemone patens* L.).

Стрѣльникъ, см. Золотая розга (*Solidago Vergaurea* L.).

Стрѣльница, см. Стрѣлолистъ обыкновенный (*Sagittaria sagittaeifolia* L.).

Стулигузъ, см. Тайникъ овальный (*Listera ovata* L.).

Стулиусе, см. Ласточкинъ обыкновенный (*Vincetoxicum officinale* Moench.).

Стуна вовча, см. Герань луговая (*Geranium pratense* L.).

Стѣпа волчья, см. Астрagalъ солодоклистный (*Astragalus glycyphyllus* L.).

Стѣтникъ, см. Хвойникъ обыкновенный (*Ephedra vulgaris* Rich.).

Стѣнница, см. Стѣнница лекарственная (*Parietaria officinalis* L.).

Стѣнница лекарственная (*Parietaria officinalis* L.). Иванъ да Марья, Повой подѣтвникъ, Помурная. Пристѣнная трава, Щитъ помурный, Колокольчики повилочные, Стѣнница. Многолѣтнее травянистое растеніе изъ семейства «крапивныхъ» (*Urticaceae* Juss.), распространенное въ средней и южной Европѣ, въ Привислянскомъ краѣ, въ юго-западной Россіи, въ Крыму и на Кавказѣ. Стебель прямо-стоящій, простой, выш. 7—22½ вершк. Листья очередные, черешковые, продолговато-ланцетные, цѣльно-крайніе, на верхушкѣ заостренныя, къ основанію суженныя. Мелкіе зеленоватые цвѣты сидятъ въ углахъ листьевъ пучками. Околоцвѣтничекъ тычиночныхъ цвѣтвъ 4-храздѣльный, а пестичныхъ—трубчатый, 4-хзубчатый. Тычинокъ 4, до распусканія цвѣтвъ загнутыхъ внутрь. Завязь верхняя, одногнѣздная. Плодъ—сѣмянка. Цвѣтетъ во второй половинѣ лѣта. Растетъ на

- известково-каменистыхъ мѣстахъ. Трава прежде употреблялась въ медицинѣ, теперь совсѣмъ оставлена. (Рис. 291.)
- Стѣнь ночная**, см. Пасленъ сладкогорькій (*Solanum dulcamara* L.).
- Стягачъ**, см. Наперстиянка крупноцвѣтная (*Digitalis grandiflora* L.).
- Стягачъ**, см. Подорожникъ ланцетный (*Plantago lanceolata* L.).
- Стягачъ**, см. Мыльнянка лекарственная (*Saponaria officinalis* L.).
- Субалевка**, см. Горечавка крупная (*Gentiana Pneumonanthe* L.).
- Суволока**, см. Конопля посѣвная, или обыкновенная (*Cannabis sativa* L.).
- Судапоръ**, см. Репляшокъ обыкновенный (*Agrimonia Eupatorium* L.).
- Судапоръ**, см. Золотая розга (*Solidago Virgaurea* L.).
- Судапоръ**, см. Репляшокъ обыкновенный (*Agrimonia Eupatorium* L.).
- Судорожная трава**, см. Гвоздика картузанская (*Dianthus carthusianorum* L.).
- Судочистъ**, см. Земляные орѣшки (*Spiraea Filipendula* L.).
- Судра**, см. Будра плющевидная (*Glechoma hederacea* L.).
- Сузыкъ**, см. Тысячелистникъ обыкновенный (*Achillea Millefolium* L.).
- Сузыкъ**, см. Василекъ луговой (*Centaurea Jacea* L.).
- Сузыкъ**, см. Морковь обыкновенная (*Daucus Carotta* L.).
- Сузыкъ**, см. Рѣзакъ степной (*Falcaria Rivini* Host.).
- Сузыкъ**, см. Герань луговая (*Geranium pratense* L.).
- Сузыкъ**, см. Ленъ дикій (*Linaria vulgaris* Mill.).
- Сузыкъ**, см. Пижма (*Tanacetum vulgare* L.).
- Сузыкъ**, см. Василетникъ желтый (*Thalictrum flavum* L.).
- Сукно**, см. Медвѣжье ухо (*Verbascum Thapsus* L.).
- Суколѣвка**, см. Герань луговая (*Geranium pratense* L.).
- Сукоѣнникъ** } см. Медвѣжье ухо (*Verbascum Thapsus* L.).
- Суконце** }
- Суконце**, см. Легочница лекарственная (*Pulmonaria officinalis* L.).
- Сукъ**, см. Сонъ-трава (*Anemone patens* L.).
- Сулейникъ**, см. Анона (*Anona Adans.*).
- Султанчикъ**, см. Горлець, раковыя шейки (*Polygonum Bistorta* L.).
- Султанчикъ**, см. Рогоза узколистная (*Typha angustifolia* L.).
- Султанчикъ**, см. Рогоза широколистная (*Typha latifolia* L.).
- Султанчикъ муровой**, см. Лисохвостъ колѣнчатый (*Alopecurus geniculatus* L.).
- Султанчикъ полевой**, см. Горлець, раковыя шейки (*Polygonum Bistorta* L.).
- Султанчики синіе**, см. Плакунъ-трава (*Lythrum Salicaria* L.).
- Султанъ**, см. Рогоза широколистная (*Typha latifolia* L.).
- Султаны**, см. Горлець, раковыя шейки (*Polygonum Bistorta* L.).
- Сумахъ**, см. Сумахъ красильный (*Rhus Coriaria* L.).
- Сумахъ**, см. Скопнія (*Rhus Cotinus* L.).



Рис. 195. Облиинха
обыкновенная.



Рис. 196. Овесь живой.



Рис. 197. Ожика волосистая.



Рис. 198 Орѣхъ грецкій.



Рис. 199. Осока бѣдная



Рис. 200. Осока лѣсная.



Рис. 201. Осокорь обыкновенный




Рис. 202. Осотъ полевой.



Рис. 203. Острица лежачая.



Рис. 204. Острокильникъ полевой.



Рис. 205. Очанка желтая.



Рис. 206. Очитокъ бѣлый.



Рис. 207. Падубъ обыкновенный.



Рис. 208. Пазникъ гладкій.



Рис. 209. Пастернакъ огородный



Рис. 210. Переступъ обыкновенный.



Рис. 211. Перець водяной.



Рис. 212. Перловникъ поникшій



Рис. 213. Персикъ.




Рис. 214. Песчанка тонколистная.



Рис. 215. Песчанка трехнервная.



Рис. 216. Петрушка собачья.



Рис. 217. Пикульникъ длинноцвѣтный.



Рис. 218. Плавунъ нимфейный.



Рис. 219. Плауиъ булавистый




Рис. 220. Плауиъ живородящій.



Рис. 221. Плевель одурияющій.



Рис. 222. Подбѣлъ.



Рис. 223. Подмареникъ европейскій.



Рис. 224. Подмареникъ болотный.



Рис. 225. Подмареникъ крестовидный.




Рис. 226. Подмареникъ мягкій.



Рис. 227. Подмареникъ цѣпкій.



Рис. 228 Подорожникъ большой.



Рис 229. Подорожникъ ланцетный



Рис 230. Полевица бѣлая.



Рис. 231. Полынь горькая.



Рис. 232. Полынь полевая.



Рис. 233. Полѣска многолѣтняя



Рис. 234. Просирникъ обыкновенный.



Рис. 235. Просо колосистое, или
гребнистое.



Рис. 236. Птицемлечник,
поникий.



Рис. 237. Пузырчатка
обыкновенная.



Рис. 238. Пушкортан,
полевая.



Рис. 239. Пузыринокъ обыкновенный.



Рис. 240. Пузыринокъ обыкновенный.



Рис 241. Пшеница обыкновенная.



Рис. 242. Пыльцеголовникъ красный.



Рис. 243 Разнолепестка
горькая.



Рис. 244. Рдесть блестящий.



Рис. 245. Рдесть курчавый.



Рис. 246. Рдесть маленький



Рис. 247. Рдесть плаваючий



Рис. 248. Рдесть сквознолистий.



Рис. 249. Роза кирицная



Рис. 250. Роза мелколистная



Рис. 251. Роза пушистая.



Рис. 252. Ромашка собачья



Рис. 253. Росичка
червоная.



Рис. 254. Рупня морская.



Рис. 255. Рута горная.



Рис. 256. Рута пахучая.



Рис. 257. Рыжи́к по́левой.



Рис. 258. Ръзалецъ.



Фигуры: 137) Лебеда татарская. 138) Ленъ посѣвной. 139) Легочница лекар-
ственная. 140) Лимонтъ обыкновенный. 141) Лилія пестрая.



Фигуры: 142) Липа. 143) Лисичка. 144) Лисохвостъ луговой. 145 и 146) Ломо-
 шость цѣпкій. 147) Лютикъ ѣдкій.



Фигуры: 148) Лопушиникъ (репейникъ). 149) Макъ-самосѣйка. 150) Люцерна. 151) Лутикъ желтый. 152) Маргаритка.

153

154

155

156

157

Фигуры: 153 и 154) Малина обыкновенная. 155) Марьянникъ полевой. 156) Ма-
хорка. 157) Мать и мачиха.



Фигуры: 158) Мелисса, или мята лимонная. 159) Можжевельникъ обыкновенный. 160) Молочай обыкновенный. 161 и 162) Миндаль. 163) Медвяное ухо



Фигуры: 164 и 165) Морковь. 166 и 167) Мушкетер. 168) Мухоморъ. 169) Морозникъ блѣднѣйшій.



Фигуры: 170) Мыльнянка лекарственная. 171) Мята перечная, или английская. 172) Мята красная. 173) Мятлик обыкновенный. 174) Незабудка средняя. 175) Незабудка болотная.



Фигуры: 176) Наперстянка пурпуровая. 177) Овесъ венгерскій, или одностолбчатый. 178) Огуречная трава. 179) Овесъ обыкновенный. 180) Ноготки. 181) Овсяница высокая.



Фигуры: 182 и 183) Огурецъ. 184) Олъха черная. 185) Одуванчикъ. 186) Ожопникъ лекарственный (живокость).



Фигуры: 187) Осина. 188) Оледа. 189) Опенокъ. 190) Ослинникъ двулистный.
191) Орѣхъ лѣсной.



Фигуры: 192) Оливковое дерево. 193) Осокорь. 194) Осотъ огородный. 195) Очитокъ острый. 196) Осока обыкновенная.



Фигуры: 197) Очанка лекарственная. 198, 199 и 200) Пихта европейская.
 201) Плевель многолетний (райграсъ английский). 202) Первоцвітъ лекар-
 ственный. 203 и 204) Петрушка огородная.



Фигуры: 205) Пионъ обыкновенный. 206) Погремокъ обыкновенный.
207) Плющъ. 208) Полба. 209) Модорожникъ средній.



Фигуры: 210) Посконникъ конопляный. 211) Пасленъ черный. 212) Пионовникъ обыкновенный. 213) Подсѣжникъ обыкновенный. 214) Пасленъ сладкогорый.



Фиг. 215. Птицемлечникъ зонтичный. Фиг. 216. Ракитникъ (золотой дождь).
 Фиг. 217. Просо настоящее. Фиг. 218. Пшеница обыкновенная. Фиг. 219. Ре-
 веда желтая. Фиг. 220. Рахунцель. Фиг. 221 и 222. Пушица



Фигуры: 223) Ристъ. 224) Рожь. 225) Роза ползучая. 226) Ромашка обыкновенная. 227) Ромашка римская.

Залесова, Е. Н.
с 221-120

1898 а

Полный рус.
ил. сл.-травник Т. 3
СПБ 1900

книжномъ складѣ журнала

С.-Петербургъ, Лиговская ул., собств. д.

ПРОДАЕТСЯ

ИЗДАНИЕ А. А. КАСПАРІИ

ПОЛНЫЙ РУССКІЙ ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ

СЛОВАРЬ-ТРАВНИКЪ

И

ЦВѢТНИКЪ

составленный по новѣйшимъ ботаническимъ и медицинскимъ сочиненіямъ

врач. Е. Н. Залесовой и О. В. Петровской

Т. I-й (первый), вышедшій при „РОДИНѢ“ въ 1898 г.
содержащій въ себѣ описаніе растений на буквы **А—Ж**,
съ указаніемъ ихъ врачебнаго дѣйствія на человѣка и
животныхъ, съ **145** иллюстраціями и **92** рисунками
въ краскахъ.

Т. II-й (второй), вышедшій при „РОДИНѢ“ въ 1899
г. содержащій въ себѣ описаніе растений на буквы
З—Н, съ указаніемъ ихъ врачебнаго дѣйствія на че-
ловѣка и животныхъ, съ **128** иллюстраціями и **44** ри-
сунками въ краскахъ.

Цѣна для гг. подписчиковъ „РОДИНЫ“

за оба тома **1 р. 50 коп.**

каждый томъ отдѣльно—**80** коп. съ перес.